重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

艾叶

Aiye

ARTEMISIAE ARGYI FOLIUM

本品为菊科植物艾 *Artemisia argyi* Levl.et Vant. 的干燥叶。夏季花未开时采摘，除去杂质，晒干。

【药材收载标准】《中国药典》2020 年版一部

艾绒

Airong

本品为艾叶的炮制加工品。

【炮制】取净艾叶，捣或碾成绒状，除去叶脉及粗梗，筛去细末。

【性状】本品呈细绒状，灰绿色，质柔软。具艾叶香气，无叶脉、粗梗。

【鉴别】(1)本品粉末灰绿色。非腺毛有两种：一种为 T 形毛，顶端细胞长而弯曲，两臂不等长，柄 2~4 细胞；另一种为单列性非腺毛，3~5 细胞，顶端细胞特长而扭曲，常断落。腺毛表面观鞋底形，由 4 或 6 细胞相对叠合而成，无柄。草酸钙簇晶，直径 3~7 μ m，存在于叶肉细胞中。

(2)取本品粉末 2g，加石油醚(60~90 $^{\circ}$ C)25ml，加热回流 30 分钟，滤过，滤液挥干，残渣加环己烷 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取艾叶对照药材 1g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(《中国药典》通则 0502)试验，吸取上述两种溶液各 5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以石油醚(60~90 $^{\circ}$ C)-甲苯-丙酮(10:8:0.5)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 1%香草醛硫酸溶液，在 105 $^{\circ}$ C 加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的主斑点。

【检查】水分 不得过 13.0% (《中国药典》通则 0832 第四法)。

总灰分 不得过 12.0% (《中国药典》通则 2302)。

酸不溶性灰分 不得过 3.5% (《中国药典》通则 2302)。

【含量测定】照气相色谱法(《中国药典》通则 0521)测定。

色谱条件与系统适用性试验 以甲基硅橡胶(SE-30)为固定相，涂布浓度为 10%；柱温为 110 $^{\circ}$ C，理论板数按桉油精峰计算应不低于 1000。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

对照品溶液的制备 取桉油精对照品适量，精密称定，加正己烷制成每 1ml 含 0.15mg 的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品粉末(过三号筛)约 2.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入正己烷 25ml，称定重量，加热回流 1 小时，放冷，再称定重量，用正己烷补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各 2 μ l，注入气相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含桉油精不得少于 0.020%。

【性味与归经】辛、苦，温；有小毒。归肝、脾、肾经。

【功能与主治】温经散寒，止痛，通血脉。多供针灸用。

【用法与用量】外用适量，供灸治或熏洗用。

【贮藏】置阴凉干燥处。

艾叶

Aiye

ARTEMISIAE ARGYI FOLIUM

本品为菊科植物艾 *Artemisia argyi* Levl.et Vant. 的干燥叶。夏季花未开时采摘，除去杂质，晒干。

【药材收载标准】《中国药典》2020 年版一部。

醋艾叶

Cuaiye

本品为艾叶的炮制加工品。

【炮制】取生艾叶，加醋拌匀，稍闷，置锅内用文火炒至焦黄，取出，放凉。每 100Kg 艾叶，用米醋 15Kg。

【性状】形同艾叶，微有焦斑，略有醋香气。

【鉴别】(1)本品粉末灰绿色。非腺毛有两种：一种为 T 形毛，顶端细胞长而弯曲，两臂不等长，柄 2~4 细胞；另一种为单列性非腺毛，3~5 细胞，顶端细胞特长而扭曲，常断落。腺毛表面观鞋底形，由 4 或 6 细胞相对叠合而成，无柄。草酸钙簇晶，直径 3~7 μ m，存在于叶肉细胞中。

(2)取本品粉末 2g，加石油醚(60~90 $^{\circ}$ C)25ml，加热回流 30 分钟，滤过，滤液挥干，残渣加环己烷 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取艾叶对照药材 1g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(《中国药典》通则 0502)试验，吸取上述两种溶液各 5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以石油醚(60~90 $^{\circ}$ C)-甲苯-丙酮(10:8:0.5)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 1%香草醛硫酸溶液，在 105 $^{\circ}$ C 加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的主斑点。

【检查】水分 不得过 12.0% (《中国药典》通则 0832 第四法)。

总灰分 不得过 13.0% (《中国药典》通则 2302)。

酸不溶性灰分 不得过 3.0% (《中国药典》通则 2302)。

【性味与归经】辛、苦，温；有小毒。归肝、脾、肾经。

【功能与主治】温经止血，散寒止痛。用于少腹冷痛，经寒不调，宫冷不孕，

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

吐血,衄血,崩漏,月经过多,妊娠下血。

【用法与用量】 3~9g。外用适量。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

桉 叶

Anye

EUCALYPTI FOLIUM

本品为桃金娘科植物桉 *Eucalyptus robusta* Smith 或蓝桉 *Eucalyptus globulus* Labill 的干燥叶。全年均可采集，阴干。

【药材收载标准】《重庆市中药材标准》

桉 叶

Anye

本品为桉叶的炮制加工品。

【炮制】除去杂质，喷淋清水，略润，切丝，干燥。

【性状】桉 呈丝条状，完整者呈卵状披针形或狭卵形。上表面灰绿色，有光泽，下表面绿白色。革质，较脆。气芳香，味辛。

蓝桉 完整者呈镰刀状披针形，全缘，表面黄绿色，光滑无毛，有多数红棕色木栓斑点，对光透视，可见无数腺点，革质而厚。全缘揉之微有香气，味稍苦而凉。

【鉴别】粉末淡绿色。表皮细胞多角形，壁颇厚，外被极厚的角质层。上下表皮均有气孔，副卫细胞6个以上，深陷于表面之下。油室众多，直径120~260 μ m。草酸钙簇晶众多，直径至 25 μ m，并有方晶，有时形成晶纤维。

【检查】水分 不得过 13.0%（《中国药典》通则 0832 第四法）。

总灰分 不得过 8.0%（《中国药典》通则 2302）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法项下（《中国药典》通则 2201）热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于 20.0%。

【性味与归经】苦、辛，凉。归肺、胃、脾、肝经。

【功能与主治】清热解毒，祛风降火。用于感冒、流感、鼻炎、喉炎、咽喉干痛等。

【用法与用量】9~15g。

【贮藏】置干燥阴凉处。

白花蛇舌草

Baihuasheshecao

HEDYOTIS DIFFUSAE HERBA

本品为茜草科植物白花蛇舌草 *Hedyotis diffusa* Willd. 的干燥全草。夏、秋二季采收，除去杂质，干燥。

【药材收载标准】《重庆市中药材标准》

白花蛇舌草

Baihuasheshecao

本品为白花蛇舌草的炮制加工品。

【炮制】除去杂质，切段，干燥。

【性状】本品为茎、叶、花、果混合的段，灰绿色或灰褐色。茎纤细，具纵棱，淡棕色。叶对生，无柄，叶片多卷缩，完整叶片呈条形或线状披针形。花偶见，单生或双生于叶腋，具短柄。蒴果扁球形，直茎 2~3mm，两侧各有一条纵沟，花萼宿存，顶端 4 齿裂，边缘具短刺毛。种子细小，黄棕色。气微，味淡。

【鉴别】（1）本品粉末灰棕色至灰绿色。茎表皮细胞多角形或长角形。有时可见微下陷的气孔。气孔平轴式，长圆形。非腺毛单细胞，壁厚。草酸钙针晶多见，成束或散在，长 75~135 μ m。草酸钙簇晶散在或存在于叶肉组织中，直径 10~15 μ m。导管多为环纹，螺旋，梯纹，直径 15~30 μ m。

（2）取本品粉末 2g，加甲醇 20ml，超声处理 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取齐墩果酸对照品，加甲醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 2 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-冰醋酸（24:4:1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 10% 硫酸乙醇溶液，在 105 $^{\circ}$ C 加热至斑点显色清晰，分别置日光和紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应位置上，显相同颜色的斑点及荧光斑点。

【检查】水分 不得过 12.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 12.0%（《中国药典》通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 4.5%（《中国药典》通则 2302）。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》通则2201）项下的热浸法测定，用60%乙醇作溶剂，不得少于10.0%。

【性味与归经】苦、甘，寒。归胃、大肠、小肠经。

【功能与主治】清热解毒，利湿消痈，活血止痛。用于肠痈，咽喉肿痛，湿热黄疸，小便不利，疮疖肿毒，毒蛇咬伤。

【用法与用量】15~60g；外用适量。

【贮藏】置干燥处。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

莲 子

Lianzi

NELUMBINIS SEMEN

本品为睡莲科植物莲 *Nelumbo nucifera* Gaertn. 的干燥成熟种子。秋季果实成熟时采割莲房，取出果实，除去果皮，干燥。

【药材收载标准】《中国药典》2020年版一部

白莲米

Bailianmi

本品为莲子的炮制加工品。

【炮制】取莲子，除去杂质、莲子心及种皮。

【性状】本品略呈椭圆形或类球形。表面黄白色，偶见未去净的残留种皮。一端中心呈乳头状突起，多有裂口，其周边略下陷，下陷处大多残留一圈未去尽的种皮。质硬，中有空隙。气微，味甘、微涩。

【鉴别】（1）本品粉末类白色。主为淀粉粒，单粒长圆形、类圆形、卵圆形或类三角形，有的具小尖突，直径4~25 μm ，脐点少数可见，裂缝状或点状；复粒稀少，由2~3分粒组成。子叶细胞呈长圆形，壁稍厚，有的呈连珠状，隐约可见纹孔域。

（2）取本品粉末少许，加水适量，混匀，加碘试液数滴，呈蓝紫色，加热后逐渐褪色，放冷，蓝紫色复现。

（3）取本品粉末0.5g，加水5ml，浸泡，滤过，滤液置试管中，加 α -萘酚试液数滴，摇匀，沿管壁缓缓滴加硫酸1ml，两液交界处出现紫色环。

（4）取本品粗粉5g，加三氯甲烷30ml，振摇，放置过夜，滤过，滤液蒸干，残渣加乙酸乙酯2ml使溶解，作为供试品溶液。另取莲子对照药材5g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则0502）试验，吸取两种溶液各2 μl ，分别点于同一硅胶G薄层板上，以正己烷-丙酮（7:2）为展开剂，展

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

开，取出，晾干，喷以 5%香草醛的 10%硫酸乙醇溶液，在 105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】总灰分 不得过 5.0%（《中国药典》通则 2302）。

黄曲霉毒素 照黄曲霉毒素测定法（《中国药典》通则 2351）测定。

本品每 1000g 含黄曲霉毒素 B₁不得过 5μg，黄曲霉毒素 G₂、黄曲霉毒素 G₁、黄曲霉毒素 B₂和黄曲霉毒素 B₁总量不得过 10μg。

【性味与归经】甘、涩，平。归脾、肾、心经。

【功能与主治】补脾止泻，止带，益肾涩精，养心安神。用于脾虚泄泻，带下，遗精，心悸失眠。

【用法与用量】6~15g。

【贮藏】置干燥处，防蛀。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

白芍

Baishao

PAEONIAE RADIX ALBA

本品为毛茛科植物芍药 *Paeonia lactiflora* Pall. 的干燥根。夏、秋二季采挖，洗净，除去头尾和细根，置沸水中煮后除去外皮或去皮后再煮，晒干。

【药材收载标准】《中国药典》2020年版一部

麸炒白芍

Fuchaobaishao

本品为白芍的炮制加工品。

【炮制】取净白芍片，照麸炒法（《中国药典》通则 0213）炒至表面颜色黄色时，取出，筛去麸皮，放凉。

每 100kg 净白芍，用麸皮 10kg。

【性状】本品为类圆形、椭圆形或不规则形薄片。表面微黄色至黄色，切面形成层明显，射线放射状。质坚实。具焦麸香气。

【鉴别】取本品粉末 0.5g，加乙醇 10ml，振摇 5 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加乙醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取芍药苷对照品，加乙醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 10 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-乙酸乙酯-甲醇-甲酸（40:5:10:0.2）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 5% 香草醛硫酸溶液，加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同的蓝紫色斑点。

【检查】水分 不得过 13.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 4.0%（《中国药典》通则 2302）。

【浸出物】照水溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 18.0%。

【含量测定】照高效液相色谱法（《中国药典》通则 0512）测定。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-0.1%磷酸溶液（14:86）为流动相；检测波长为 230nm。理论板数按芍药苷峰计算应不低于 2000。

对照品溶液的制备 取芍药苷对照品适量，精密称定，加甲醇制成每 1ml 含 60 μ g 的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品中粉约 0.1g，精密称定，置 50ml 量瓶中，加稀乙醇 35ml，超声处理（功率 240W，频率 45kHz）30 分钟，放冷，加稀乙醇至刻度，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各 10 μ l，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含芍药苷（ $C_{23}H_{28}O_{11}$ ）不得少于 1.2%。

【性味与归经】苦、酸，微寒。归肝、脾经。

【功能与主治】养血调经，敛阴止汗，柔肝止痛，平抑肝阳。用于血虚萎黄，月经不调，自汗，盗汗，胁痛，腹痛，四肢挛痛，头痛眩晕。

【用法与用量】6~15g。

【贮藏】置干燥处，防蛀。

【注意】不宜与藜芦同用。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

白芍

Baishao

PAEONIAE RADIX ALBA

本品为毛茛科植物芍药 *Paeonia lactiflora* Pall. 的干燥根。夏、秋二季采挖，洗净，除去头尾和细根，置沸水中煮后除去外皮或去皮后再煮，晒干。

【药材收载标准】《中国药典》2020年版一部

蜜麸炒白芍

Mifuchaobaishao

本品为白芍的炮制加工品。

【炮制】取净白芍片，用蜜炙麸皮照麸炒法（《中国药典》通则 0213）炒至表面颜色微黄色时，取出，筛去蜜炙麸皮，放凉。

每 100kg 净白芍，用蜜炙麸皮 10kg。

【性状】本品为类圆形、椭圆形或不规则形薄片。表皮暗棕色至暗褐色，切面淡棕黄色至棕黄色，略具焦香气。

【鉴别】取本品粉末 0.5g，加乙醇 10ml，振摇 5 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加乙醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取芍药苷对照品，加乙醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 10 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-乙酸乙酯-甲醇-甲酸（40:5:10:0.2）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 5% 香草醛硫酸溶液，加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同的蓝紫色斑点。

【检查】水分 不得过 13.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 4.0%（《中国药典》通则 2302）。

【浸出物】照水溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 18.0%。

【含量测定】照高效液相色谱法（《中国药典》通则 0512）测定。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-0.1%磷酸溶液（14:86）为流动相；检测波长为 230nm。理论板数按芍药苷峰计算应不低于 2000。

对照品溶液的制备 取芍药苷对照品适量，精密称定，加甲醇制成每 1ml 含 60 μ g 的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品中粉约 0.1g，精密称定，置 50ml 量瓶中，加稀乙醇 35ml，超声处理（功率 240W，频率 45kHz）30 分钟，放冷，加稀乙醇至刻度，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各 10 μ l，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含芍药苷（ $C_{23}H_{28}O_{11}$ ）不得少于 1.2%。

【性味与归经】苦、酸，微寒。归肝、脾经。

【功能与主治】养血调经，敛阴止汗，柔肝止痛，平抑肝阳。用于血虚萎黄，月经不调，自汗，盗汗，胁痛，腹痛，四肢挛痛，头痛眩晕。

【用法与用量】6~15g。

【贮藏】置干燥处，防蛀。

【注意】不宜与藜芦同用。

白土苓

Baituling

HETEROSMILACIS RHIZOMA

本品为百合科植物短柱肖菝葜 *Heterosmilax yunnanensis* Gagnep. 或华肖菝葜 *Heterosmilax chinensis* Wang 的干燥根茎。秋、冬二季采挖，除去须根及泥沙，洗净，趁鲜切片或块，干燥。

【药材收载标准】《四川省中药材标准》2010 年版

白土苓

Baituling

本品为白土苓的炮制加工品。

【炮制】 除去杂质或除去杂质，润透，切片或块，干燥。

【性状】 本品为不规则片或块状，外皮灰褐色，凸凹不平，表皮脱落处呈黄褐色或类白色，可见裂隙。有时可见粗壮坚硬的须根，在厚片中最为明显。切面白色、淡棕色或淡黄色。质地致密，略显粉性。气微，味淡。

【鉴别】(1)本品粉末灰白色至黄白色。淀粉粒极多，单粒类圆形、半圆形或多角形，直径 15~40 μm ，脐点明显，为裂缝状，人字形或星状，复粒由 2~3 分粒组成。木栓细胞多角形，直径 80~115 μm 。导管多为螺纹，亦可见具缘纹孔导管，直径 40~75 μm 。有黄色团块状物。草酸钙针晶束长约 110 μm 。

(2)取本品粉末 2.5g，加乙醇 50ml，超声处理 30 分钟，滤过，滤液加盐酸 5ml，加热回流 2 小时，放冷，用 40%氢氧化钠溶液调至中性，蒸至无醇味，残渣加热水 40ml 使溶解，用二氯甲烷振摇提取 2 次，合并提取液，蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取白土苓对照药材 2.5g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 10 μl ，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以环己烷-乙酸乙酯（4:1）为展开剂，展开，取出，晾

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

干，喷以 10%硫酸乙醇溶液，在 105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】总灰分 不得过 3.0%(《中国药典》通则 2302)。

酸不溶性灰分 不得过 1.5%(《中国药典》通则 2302)。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法(《中国药典》通则 2201)项下的热浸法测定，用 70%乙醇作溶剂，不得少于 10.0%。

【性味与归经】甘、淡，平。归肝、胃经。

【功能与主治】清热除湿，解毒。用于杨梅毒疮，筋骨挛痛，瘰疬痈肿，钩端螺旋体病。

【用法与用量】15~60g。钩端螺旋体病可用 250g。

【贮藏】置通风干燥处，防霉，防蛀。

百 部

Baibu

STEMONAE RADIX

本品为百部科植物直立百部 *Stemona sessilifolia* (Miq.) Miq.、蔓生百部 *Stemona japonica* (BL.)Miq. 或对叶百部 *Stemona tuberosa* Lour. 的干燥块根。春、秋二季采挖，除去须根，洗净，置沸水中略烫或蒸至无白心，取出，晒干。

【药材收载标准】《中国药典》2020 年版一部

百 部

Baibu

本品为百部的炮制加工品。

【炮制】除去杂质，分开大小，洗净，润透，切段，干燥。

【性状】本品呈不规则的段。表面灰白色至棕黄色，有深纵皱纹或深纵沟。切面灰白色、淡黄棕色或黄白色，角质样，皮部较厚，中柱扁缩，色较浅，质韧。气微，味甘、苦。

【鉴别】取本品粉末 5g，加 70%乙醇 50ml，加热回流 1 小时，滤过，滤液蒸去乙醇，残渣加浓氨试液调节 pH 值至 10~11，再加三氯甲烷 5ml 振摇提取，分取三氯甲烷层，蒸干，残渣加 1%盐酸溶液 5ml 使溶解，滤过，滤液分为两份：一份中滴加碘化铋钾试液，生成橙红色沉淀；另一份中滴加硅钨酸试液，生成乳白色沉淀。

【检查】水分 不得过 13.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 10.0%（《中国药典》通则 2302）。

【浸出物】照水溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下热浸法测定，不得少于 50.0%。

【性味与归经】甘、苦，微温。归肺经。

【功能与主治】润肺下气止咳，杀虫灭虱。用于新久咳嗽，肺癆咳嗽，顿咳；外用于头虱，体虱，蛲虫病，阴痒。

【用法与用量】3~9g。外用适量，水煎或酒浸。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

【贮藏】置通风干燥处，防潮。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

百 部

Baibu

STEMONAE RADIX

本品为百部科植物直立百部 *Stemona sessilifolia* (Miq.) Miq.、蔓生百部 *Stemona japonica* (BL.) Miq. 或对叶百部 *Stemona tuberosa* Lour. 的干燥块根。春、秋二季采挖，除去须根，洗净，置沸水中略烫或蒸至无白心，取出，晒干。

【药材收载标准】《中国药典》2020年版一部

蜜炙百部

Mizhibaibu

本品为百部的炮制加工品。

【炮制】取净百部（段），用蜜水拌匀，闷润至蜜水吸尽、透心，照蜜炙法（《中国药典》通则 0213）炒至颜色加深，不粘手。

每 100kg 百部，用炼蜜 12.5kg。

【性状】本品呈不规则段。表面灰棕色、棕黄色或褐棕色，有深纵皱纹，略带焦斑，稍有黏性。切面黄棕色至棕褐色，皮部较厚，中柱扁缩。质韧，软或硬。气微，味甘、苦。

【鉴别】取本品粉末 5g，加 70%乙醇 50ml，加热回流 1 小时，滤过，滤液蒸去乙醇，残渣加浓氨试液调节 pH 值至 10~11，再加三氯甲烷 5ml 振摇提取，分取三氯甲烷层，蒸干，残渣加 1%盐酸溶液 5ml 使溶解，滤过，滤液分为两份：一份中滴加碘化铋钾试液，生成橙红色沉淀；另一份中滴加硅钨酸试液，生成乳白色沉淀。

【检查】水分 不得过 13.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

【浸出物】照水溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下热浸法测定，不得少于 58.0%。

【性味与归经】甘、苦，微温。归肺经。

【功能与主治】润肺止咳。用于阴虚劳嗽。

【用法与用量】3~9g。

【贮藏】密闭，置通风干燥处，防潮。

百草霜

Baicaoshuang

FULIGO E HERBIS

本品为草木经燃烧后附于锅底或烟囱中之余烟残存物(烟灰)。全年可采，扫下或刮下，过细筛，去除杂质。

【药材收载标准】《重庆市中药材标准》

百草霜

Baicaoshuang

本品为百草霜的炮制加工品。

【炮制】用细筛筛除杂质，碾磨成细粉。

【性状】本品为黑色粉末或小颗粒，手捻即为细粉并染手。质轻，入水则漂浮分散，有轻微沉淀，无油腻感。有烟草气，味淡微辛。

【性味与归经】辛，温。归肝、肺、胃经。

【功能与主治】消肿敛疮，止血，止泻。用于喉咙肿痛，口舌生疮，咯血，吐血，便血，外伤出血，食积泻痢。

【用法与用量】0.9~1.2g。外用适量，掺敷患处。

【贮藏】置干燥处。

败酱草

Baijiangcao

PATRINIAE HERBA

本品为败酱科植物黄花败酱 *Patrinia scabiosaefolia* Fisch. 或白花败酱 *Patrinia villosa* Juss. 的干燥全草。前者习称“黄花败酱”，后者习称“白花败酱”。夏季花开前采收，晒至半干，扎成束，再阴干。

【药材收载标准】《中国药典》1977年版一部

败酱草

Baijiangcao

【炮制】除去杂质，喷淋清水，稍润，切段，晒干。

【性状】黄花败酱 本品为根茎、茎、叶混合的段。根茎圆柱形，表面暗棕色至紫棕色。茎圆柱形，有明显的节，表面黄绿色至黄棕色，常有倒生的粗毛，切面中部有髓或细小空洞。叶片薄，多卷缩或破碎，两面疏生白毛。气特异，味微苦。

白花败酱 本品为根茎、茎、叶混合的段。茎表面有倒生的白色长毛及纵向纹理；断面中空。

【鉴别】（1）本品粉末棕褐色。表皮细胞多角形。非腺毛多为单细胞，长200~1250 μm ，壁厚，表面有细小颗粒状突起。导管螺旋，网纹导管少见。草酸钙簇晶直径约30 μm 。薄壁细胞长方形。

（2）取本品粉末2g，加甲醇20ml，超声处理30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加无水乙醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取齐墩果酸对照品，加乙醇制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则0502）试验，吸取上述供试品溶液10 μl ，对照品溶液5 μl ，分别点于同一硅胶G薄层板上，以环己烷-丙酮-乙酸乙酯（5:2:1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10%硫酸乙醇溶液，在105 $^{\circ}\text{C}$ 加热至斑点显色清晰。置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【性味与归经】辛、苦，凉。归脾、大肠经。

【功能与主治】清热解毒，祛瘀排脓。用于肠痈腹痛，肺痈吐脓，痈肿疮毒，

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

产后瘀血腹痛。

【用法与用量】 9~15g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

板蓝根

Banlangen

ISATIDIS RADIX

本品为十字花科植物菘蓝 *Isatis indigotica* Fort. 的干燥根。秋季采挖，除去泥沙，晒干。

【药材收载标准】《中国药典》2020 年版一部

板蓝根

Banlangen

ISATIDIS RADIX

本品为板蓝根的加工炮制品。

【炮制】除去杂质，洗净，润透，切段，干燥。

【性状】本品呈圆柱形的段。外表皮灰黄色至淡棕黄色，有纵皱纹。切面皮部黄白色，木部黄色。气微，味微甜后苦涩。

【鉴别】（1）取本品粉末 0.5g，加稀乙醇 20ml，超声处理 20 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加稀乙醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取板蓝根对照药材 0.5g，同法制成对照药材溶液。再取精氨酸对照品，加稀乙醇制成每 1ml 含 0.5mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取上述三种溶液各 1~2 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以正丁醇-冰醋酸-水（19:5:5）为展开剂，展开，取出，热风吹干，喷以茚三酮试液，在 105 $^{\circ}$ C 加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

（2）取本品粉末 1g，加 80% 甲醇 20ml，超声处理 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取板蓝根对照药材 1g，同法制成对照药材溶液。再取（R,S）-告依春对照品，加甲醇制成每 1ml 含 0.5mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取上述三种溶液各 5~10 μ l，分别点于同一硅胶 GF₂₅₄ 薄层板上，以石油醚（60~90 $^{\circ}$ C）-乙酸乙酯（1:1）为展开剂，展开，取出，置紫外光灯（254nm）下检视。供

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

试品色谱中，在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】水分 不得过 13.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 8.0%（《中国药典》通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 2.0%（《中国药典》通则 2302）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，用 45%乙醇作溶剂，不得少于 25.0%。

【含量测定】照高效液相色谱法（《中国药典》通则 0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-0.02%磷酸溶液（7:93）为流动相；检测波长为 245nm。理论板数按（R,S）-告依春峰计算应不低于 5000。

对照品溶液的制备 取（R,S）-告依春对照品适量，精密称定，加甲醇制成每 1ml 含 40 μ g 的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品粉末（过四号筛）约 1g，精密称定，置圆底烧瓶中，精密加入水 50ml，称定重量，煎煮 2 小时，放冷，再称定重量，用水补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各 10~20 μ l，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含（R,S）-告依春（C₃H₇NOS）不得少于 0.030%。

【性味与归经】苦，寒。归心、胃经。

【功能与主治】清热解毒，凉血利咽。用于温疫时毒，发热咽痛，温毒发斑，疔腮，烂喉丹痧，大头瘟疫，丹毒，痈肿。

【用法与用量】9~15g。

【贮藏】置干燥处，防霉，防蛀。

壁 虎

Bihu

GEKKO

本品为壁虎科动物无蹼壁虎*Gekko swinhoana* Gunther、多疣壁虎*G. japonicum* Doumeril et Bibron或壁虎*G. chinensis* Gray的干燥全体。夏、秋两季捕捉，捕后处死，晒干或烘干。

【药材收载标准】《湖南省中药材标准》2009年版

壁 虎

Bihu

本品为壁虎的炮制加工品。

【炮制】除去杂质。

【性状】本品为扁平条状。头椭圆形而扁，头、体的背面灰棕色或棕褐色，被以细鳞；胸腹面黄白色，被较大的鳞。脊椎骨隆起，肋骨斜向排列整齐，尾几与体等长，易折断。气腥，味微咸。

【性味与归经】咸，寒。小毒。归肝经。

【功能与主治】祛风定惊，散结解毒。用于中风瘫痪，历节风痛，风痰惊痫，瘰疬恶疮。

【用法与用量】3~6g，焙研入丸散。外用研末调敷。

【处方应付】写守宫、壁虎均付壁虎。

【贮藏】置干燥处，防霉，防蛀。

扁枝槲寄生

Bianzhihujisheng

VISCI LIQUIDARICOLI HERBA

本品为桑寄生科槲寄生属植物扁枝槲寄生 *Viscum articulatum* Burm.f.或枫香槲寄生 *Viscum Liquidambaricolum* Hayata.的干燥带叶茎枝。冬季至次春采割，除去粗茎，切段，干燥。

【药材收载标准】《四川省中药材标准》2010年版

扁枝槲寄生

Bianzhihujisheng

本品为扁枝槲寄生的炮制加工品。

【炮制】除去杂质，洗净，润透，切段，干燥。

【性状】本品为不规则的段。茎外皮绿黄色、黄棕色或棕褐色，切面皮部黄色，木部浅黄色，髓部常呈狭缝状。气微，味微苦。

【鉴别】本品粉末淡黄色。表皮细胞碎片黄绿色，细胞类长方形，可见气孔。纤维成束或散在，直径8~25 μ m，壁较厚，胞腔狭小，微木化，有的纤维束旁的薄壁细胞中可见草酸钙方晶，形成晶纤维。石细胞类圆形、类方形或类多角形，直径35~86 μ m，壁厚，孔沟及纹孔均明显。导管多为碎片，梯纹或网纹，直径18~45 μ m。草酸钙簇晶直径23~58 μ m。

【检查】总灰分 不得过10.0%(《中国药典》通则2302)。

酸不溶性灰分 不得过3.0%(《中国药典》通则2302)。

【性味与归经】苦，平。归肝、肾经。

【功能与主治】祛风湿，补肝肾，强筋骨，安胎。用于风湿痹痛，腰膝酸软，胎动不安。

【用法与用量】9~15g。

【贮藏】置干燥处，防蛀。

陈 皮

Chenpi

CITRI RETICULATAE PERICARPIUM

本品为芸香科植物橘 *Citrus reticulata* Blanco 及其栽培变种的干燥成熟果皮。药材分为“陈皮”和“广陈皮”。采摘成熟果实，剥取果皮，晒干或低温干燥。

【药材收载标准】《中国药典》2020 年版一部

炒陈皮

Chaochenpi

本品为陈皮的炮制加工品。

【炮制】取净陈皮丝，照麸炒法（《中国药典》通则 0213）炒至颜色变深，取出，筛去麸皮，放凉。

每 100kg 陈皮丝，用麸皮 10kg。

【性状】本品呈不规则条状或丝状，外表面橙棕色或橙褐色，有细皱纹和凹下的点状油室，质脆易碎。气芳香，味苦。

【鉴别】取本品粉末 0.3g，加甲醇 10ml，加热回流 20 分钟，滤过，取滤液 5ml，浓缩至 1ml，作为供试品溶液。另取橙皮苷对照品，加甲醇制成饱和溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 2 μ l，分别点于同一用 0.5%氢氧化钠溶液制备的硅胶 G 薄层板上，以乙酸乙酯-甲醇-水（100:17:13）为展开剂，展至约 3cm，取出，晾干，再以甲苯-乙酸乙酯-甲酸-水（20:10:1:1）的上层溶液为展开剂，展至约 8cm，取出，晾干，喷以三氯化铝试液，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】水分 不得过 13.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 6.0%（《中国药典》通则 2302）。

黄曲霉毒素 照黄曲霉毒素测定法（《中国药典》通则 2351）测定。

取本品粉末（过二号筛）约 5g，精密称定，加入氯化钠 3g，照黄曲霉毒素测定法项下供试品的制备方法测定，计算，即得。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

本品每 1000g 含黄曲霉毒素 B₁ 不得过 5 μ g，黄曲霉毒素 G₂、黄曲霉毒素 G₁、黄曲霉毒素 B₂ 和黄曲霉毒素 B₁ 的总量不得过 10 μ g。

【浸出物】 照水溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 45.0%。

【性味与归经】 苦、辛，温。归肺、脾经。

【功能与主治】 理气健脾，燥湿化痰。用于脘腹胀满，食少吐泻，咳嗽痰多。

【用法与用量】 3~10g

【贮藏】 置阴凉干燥处，防霉，防蛀。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

陈皮

Chenpi

CITRI RETICULATAE PERICARPIUM

本品为芸香科植物橘 *Citrus reticulata* Blanco 及其栽培变种的干燥成熟果皮。药材分为“陈皮”和“广陈皮”。采摘成熟果实，剥取果皮，晒干或低温干燥。

【药材收载标准】《中国药典》2020 年版一部

蒸陈皮

Zhengchenpi

本品为陈皮的炮制加工品。

【炮制】取净陈皮，除去杂质，湿润后，照蒸法（《中国药典》通则 0213）蒸透，及时取出，切丝，低温干燥。

【性状】本品呈不规则的条状或丝状。外表面橙红色或红棕色。有细皱纹和凹下的点状油室。内表面浅黄色至黄棕色。质硬，气清香，味辛、苦。

【鉴别】（1）本品粉末黄白色至黄棕色。中果皮薄壁组织众多，细胞形状不规则，壁不均匀增厚，有的成连珠状。果皮表皮细胞表面观多角形、类方形或长方形，垂周壁稍厚，气孔类圆形，直径 18~26 μm ，副卫细胞不清晰；侧面观外被角质层，靠外方的径向壁增厚。草酸钙方晶成片存在于中果皮薄壁细胞中，呈多面体形、菱形或双锥形，直径 3~34 μm ，长 5~53 μm ，有的一个细胞内含有由两个多面体构成的平行双晶或 3~5 个方晶。橙皮苷结晶大多存在于薄壁细胞中，黄色或无色，呈圆形或无定形团块，有的可见放射状条纹。可见螺旋导管、孔纹导管和网纹导管及较小的管胞。

（2）取本品粉末 0.3g，加甲醇 10ml，超声处理 20 分钟，滤过，取滤液 5mL，浓缩至 1mL，作为供试品溶液。另取橙皮苷对照品，加甲醇制成饱和溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 2 μl ，分别点于同一用 0.5%氢氧化钠溶液制备的硅胶 G 薄层板上，以乙酸乙酯-甲醇-水（100:17:13）为展开剂，展至约 3cm，取出，晾干。再以甲苯-乙酸乙

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

酯-甲酸-水（20:10:1:1）的上层溶液为展开剂，展至约 8cm，取出，晾干。喷以三氯化铝试液，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】水分 不得过 13.0%（《中国药典》通则 0832 第四法）。

黄曲霉毒素 照黄曲霉毒素测定法（《中国药典》通则 2351）测定。

取本品粉末（过二号筛）约 5g，精密称定，加入氯化钠 3g，照黄曲霉毒素测定法项下供试品的制备方法测定，计算，即得。

本品每 1000g 含黄曲霉毒素 B₁ 不得过 5μg，黄曲霉毒素 G₂、黄曲霉毒素 G₁、黄曲霉毒素 B₂ 和黄曲霉毒素 B₁ 的总量不得过 10μg。

【含量测定】照高效液相色谱法（《中国药典》通则 0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-水（22:78）为流动相；检测波长为 283nm。理论板数按橙皮苷峰计算应不低于 2000。

对照品溶液的制备 取橙皮苷对照品适量，精密称定，加甲醇制成 1ml 含 0.4mg 的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品粗粉（过二号筛）约 0.2g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入甲醇 25ml，密塞，称定重量，超声处理（功率 300W；频率 40kHz）45 分钟，放冷，再称定重量，用甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各 5μl，注入液相色谱仪，测定，即得。本品按干燥品计算，含橙皮苷（C₂₈H₃₄O₁₅）不得少于 2.0%。

【性味与归经】苦、辛，温。归肺、脾经。

【功能与主治】理气健脾，燥湿化痰。用于脘腹胀满，食少吐泻，咳嗽痰多。

【炮制作用】蒸制可缓和药性。

【用法与用量】3~10g。

【贮藏】置阴凉干燥处，防霉，防蛀。

楮实子

Chushizi

BROUSSONETIAE FRUCTUS

本品为桑科植物构树 *Broussonetia papyrifera* (L.) Vent. 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采收，洗净，晒干，除去灰白色膜状宿萼和杂质。

【药材收载标准】《中国药典》2020 年版一部

炒楮实子

Chaochushizi

本品为楮实子的炮制加工品。

【炮制】取净楮实子，照清炒法（《中国药典》通则 0213）炒至有爆声，香气溢出。

【性状】本品略呈球形或圆卵形，稍扁。直径约 1.5mm。表面暗红棕色，一侧有棱，一侧有凹沟，质硬而脆。易压碎。胚乳类白色，富油性。气微香，味淡。

【鉴别】（1）本品粉末红棕色。果皮栅状细胞壁黏液化，残存具细齿状的条纹增厚部分，形似细芒。含晶厚壁细胞成片，棕黄色，表面观类多角形，内含草酸钙簇晶；断面观类长方形，内壁极厚，胞腔偏靠外侧，簇晶矩圆形。内果皮厚壁细胞甚扁平，常多层重叠，界限不清。种皮表皮细胞表面观多角形，壁略呈连珠状增厚，非木化，胞腔内含黄棕色物。

（2）取本品粉末 2g，置具塞锥形瓶中，加入石油醚（60~90℃）50ml，密塞，超声处理 30 分钟，滤过，弃去滤液，重复操作 3 次，残渣挥干，加入甲醇 50ml，超声处理 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取楮实子对照药材 2g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 8μl，分别点于同一以羧甲基纤维素钠为黏合剂的硅胶 H 薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-甲酸（10:8:1.3）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 10%硫酸乙醇溶液，在 105℃加热至斑点显色清晰，在紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】水分 不得过 13.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

总灰分 不得过 8.0%（《中国药典》通则 2302）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于 14.0%。

【性味与归经】甘、寒。归肝、肾经。

【功能与主治】补肾清肝，明目，利尿。用于肝肾不足，腰膝酸软，虚劳骨蒸，头晕目昏，目生翳膜，水肿胀满。

【用法与用量】6~12g。

【贮藏】置干燥处，防蛀。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

川赤芍

Chuanchishao

PAEONIAE RADIX ET RHIZOMA

本品为毛茛科植物毛赤芍 *Paeonia veitchii* Lynch var. *woodwardii* (Stapf. ex Cox.) Stern.、单花赤芍 *Paeonia veitchii* Lynch var. *uniflora* K. Y. Pan、美丽芍药 *Paeonia mairei* Lévl.、草芍药 *Paeonia obovata* Maxim. 及毛叶草芍药 *Paeonia obovata* Maxim. var. *willmottiae* (Stapf.) Stern. 的干燥根及根茎。春、秋二季采挖，前两种分开根及根茎，除去须根及泥沙，干燥。前两种根习称“条芍”，其根茎及后三种习称“狗头赤芍”。

【药材收载标准】《重庆市中药材标准》

川赤芍

Chuanchishao

本品为川赤芍的炮制加工品。

【炮制】除去杂质，分开大小，洗净，润透，切片，干燥。

【性状】本品呈类圆形或不规则的片，直径 0.5~5cm。表面灰棕色、棕褐色、紫褐色或淡紫堇色，可见纵皱纹或纵沟，有时可见突起的横向皮孔。质硬而脆，切面黄白色至淡紫棕色，外缘或中央有时可见紫堇色，具粉性，有菊花心。气微香，味微甜而后微苦、酸涩。

【鉴别】取本品粉末 0.5g，加乙醇 10ml，振摇 5 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加乙醇 2ml 使溶解，作为供试品溶液。另取芍药苷对照品，加乙醇制成每 1ml 含 2mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 4 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以二氯甲烷-乙酸乙酯-甲醇-甲酸（40 : 5 : 10 : 0.2）为展开剂，展开。取出，晾干，喷以 5% 香草醛硫酸溶液，105 $^{\circ}$ C 加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同的蓝紫色斑点。

【检查】水分 不得过 13.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 6.0%（《中国药典》通则 2302）。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

酸不溶性灰分 不得过 1.0%（《中国药典》通则 2302）。

【浸出物】照水溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下热浸法测定，不得少于 20.0%。

【性味与归经】苦，微寒。归肝经。

【功能与主治】清热凉血，散瘀止痛，清肝火。用于温毒发斑，吐血衄血，经闭痛经，癥瘕腹痛，跌扑损伤，痈肿疮疡，目赤肿痛，肝郁胁痛。

【用法与用量】6~12g。

【注意】不宜与藜芦同用。

【贮藏】置通风干燥处。

川黄芪

Chuanhuangqi

ASTRAGALI ERNESTIIS RADIX

本品为豆科黄芪属植物梭果黄芪 *Astragalus ernestii* Comb.、多花黄芪 *Astragalus foridus* Benth.、金翼黄芪 *Astragalus chrysopterus* Bge. 的干燥根。春、秋二季采挖，除去须根及根头，干燥。

【药材收载标准】《重庆市中药材标准》

川黄芪

Chuanhuangqi

本品为川黄芪的炮制加工品。

【炮制】除去杂质，分开大小，洗净，润透，切片，干燥。

【性状】本品呈类圆形或椭圆形的片，直径 0.5~4.5cm，表面黄白色、土黄色、棕褐色或灰棕色。断面具放射状纹理，有的并具同心环，具粉性，黄白色或淡黄色。气微，味微甜，嚼之微有豆腥气。

【鉴别】本品粉末淡黄白色或淡黄色。淀粉粒较多，类圆形。纤维成束，末端钝叉状或钝尖。具缘纹孔导管无色或黄色，偶见网纹导管。木栓细胞表面观类方形。石细胞类多角形，壁较厚。

【检查】水分 不得过 12.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 3.0%（《中国药典》通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 2.0%（《中国药典》通则 2302）。

【浸出物】照水溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下冷浸法测定，不得少于 10.0%。

【性味与归经】甘，温。归肺、脾经。

【功能与主治】补气固表，利尿托毒，排脓，敛疮生肌。用于气虚乏力，食少便溏，中气下陷，久泻脱肛，便血崩漏，表虚自汗，气虚水肿，痈疽难溃，久溃不敛，血虚萎黄，内热消渴，慢性肾炎蛋白尿，糖尿病。

【用法与用量】9~30g。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

【贮藏】置通风干燥处。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

川明参

Chuanmingshen

CHUANMINGSHINIS RADIX

本品为伞形科植物川明参 *Chuanminshen violaceum* Sheh et Shan 的干燥根。4-5 月采挖，除去泥沙、须根及外皮，洗净，置沸水中煮至无白心，取出，干燥。

【药材收载标准】《重庆市中药材标准》

川明参

Chuanmingshen

本品为川明参的炮制加工品。

【炮制】 除去杂质。

【性状】 本品呈长圆柱形或长纺锤形，略扭曲，长 7~30cm，直径 0.5~2cm。表面黄白色或淡黄棕色，较光滑，可见不规则纵沟及微细皱纹，散在棕色或淡棕色细长横向皮孔样痕迹。质坚硬，易折断，断面淡黄色或淡黄白色，半透明，有角质样光泽，皮部约占半径的 1/2，有 2~3 个类白色断续同心环纹，可见淡黄棕色小油点，木部有放射状纹理；较粗者一侧常不规则开裂。气微，味淡，嚼之发粘。

【鉴别】 取本品粉末 2g，加乙醚 20ml，超声处理 30 分钟，滤过，滤液挥干，加乙酸乙酯 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取欧前胡素对照品，加乙酸乙酯制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 10~20 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以石油醚（60~90 $^{\circ}$ C）-乙醚（1:5）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同的荧光斑点。

【检查】 水分 不得过 12.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 12.0%（《中国药典》通则 2302）。

【浸出物】 照水溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 10.0%。

【性味与归经】 甘、平，微温。归肺、肝经。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

【功能与主治】滋阴补肺，健脾和胃。用于热病伤阴，肺燥咳嗽，脾虚食少，病后体弱。

【用法与用量】9~15g。

【贮藏】置干燥处。防潮，防蛀。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

川明参

Chuanmingshen

CHUANMINGSHINIS RADIX

本品为伞形科植物川明参 *Chuanminshen violaceum* Sheh et Shan 的干燥根。4-5 月采挖，除去泥沙、须根及外皮，洗净，置沸水中煮至无白心，取出，干燥。

【药材收载标准】《重庆市中药材标准》

川明参片

Chuanmingshenpian

本品为川明参炮制加工品。

【炮制】 除去杂质，分开大小，洗净，润透，切片，干燥。

【性状】 本品呈类圆柱形或不规则的段或片，有的皮部与木部分离，直径 0.5~2cm。表面黄白色或淡黄棕色，较光滑，可见微细皱纹，有的可见棕色或淡棕色细长横向皮孔样痕迹。切面淡黄色或淡黄白色，有角质样光泽，皮部约占半径的 1/2，有 2~3 个类白色断续同心环纹，可见淡黄棕色小油点，木部有放射状纹理。气微，味甘淡，嚼之发粘。

【鉴别】取本品粉末 2g，加乙醚 20ml，超声处理 30 分钟，滤过，滤液挥干，加乙酸乙酯 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取欧前胡素对照品，加乙酸乙酯制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 10~20 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以石油醚（60~90 $^{\circ}$ C）-乙醚（1:5）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同的荧光斑点。

【检查】水分 不得过 12.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 12.0%（《中国药典》通则 2302）。

【浸出物】照水溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 10.0%。

【性味与归经】甘、平，微温。归肺、肝经。

【功能与主治】滋阴补肺，健脾和胃。用于热病伤阴，肺燥咳嗽，脾虚食少，病后体弱。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

【用法与用量】9~15g。

【贮藏】置干燥处。防潮，防蛀。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

川西马勃

Chuanximabo

BOVISTELLA

本品为灰包科真菌大口静灰球 *Bovistella sinensis* Lloyd. 和长根静灰球 *Bovistella radicata* (Mont.) Pat. 的干燥子实体。夏、秋二季采挖，除去泥沙及杂质，直接干燥或趁鲜切块片，干燥。未成熟者习称“白马勃”，成熟者习称“灰马勃”。

【药材收载标准】 《重庆市中药材标准》

川西马勃

Chuanximabo

本品为川西马勃的炮制加工品。

【炮制】 除去杂质，剪或切成小块。

【性状】 白马勃 呈不规则块状，表面黄白色或灰白色，较粗糙。断面呈细颗粒状，显粉性。体轻，质松脆，略有弹性。有特殊香气。

灰马勃 呈不规则块状。表面灰褐色或蓝灰色。孢体粉状，浅烟色或青褐色。手捻较滑。

【鉴别】（1）灰马勃：粉末黄褐色。孢丝众多，浅青褐色或青黄色，多分枝，壁厚，主干直径可达 10 μ m。孢丝单独存在或相互交错，形成明显的孢丝团。孢子黄褐色，球形或扁圆形，直径 3~5 μ m，具无色小柄，长 6~15 μ m。

（2）取本品粉末 1g，加二氯甲烷 40ml，超声处理 10 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加二氯甲烷 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取麦角甾醇对照品，加二氯甲烷制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 10 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以石油醚（60~90 $^{\circ}$ C）-乙酸乙酯（7：3）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 10%磷钼酸乙醇试液，在 105 $^{\circ}$ C 加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 水分 不得过 15.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

总灰分 不得过 10.0%（《中国药典》通则 2302）。

【浸出物】照水溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 30.0%。

【性味与归经】辛，平。归肺经。

【功能与主治】清热，利咽，止血。用于风热郁肺，咽喉肿痛，咳嗽，音哑；外治鼻衄，创伤出血。

【用法与用量】6~10g；外用适量。

【贮藏】置干燥处，防尘。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

川 芎

Chuanxiong

CHUANXIONG RHIZOMA

本品为伞形科植物川芎 *Ligusticum chuanxiong* Hort. 的干燥根茎。夏季当颈上的节盘显著突出，并略带紫色时采挖，除去泥沙，晒后烘干，再去须根。

【药材收载标准】《中国药典》2020 年版一部

酒川芎

Jiuchuanxiong

本品为川芎的炮制加工品。

【炮制】取川芎，除去杂质，洗净，润透，切厚片，加黄酒拌匀，闷润至黄酒被吸尽，置热锅内，照酒炙法（《中国药典》通则 0213）用文火炒干至表面黄色至棕黄色、质坚脆，略有酒香气，取出，摊凉。

每 100kg 川芎，用黄酒 10kg。

【性状】本品形如川芎片，表面黄褐色，偶见焦斑。略有酒气，质坚脆。

【鉴别】取本品粉末 1g，加乙醚 20ml，加热回流 1 小时，滤过，滤液挥干，残渣加乙酸乙酯 2ml 使溶解，作为供试品溶液。另取川芎对照药材 1g，同法制成对照药材溶液。再取欧当归内酯 A 对照品，加乙酸乙酯制成每 1ml 含 0.1mg 的溶液（置棕色瓶中），作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取上述三种溶液各 10 μ l，分别点于同一硅胶 GF₂₅₄ 薄层板上，以正己烷-乙酸乙酯（3:1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（254nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】水分 不得过 12.0%（《中国药典》通则 0832 第四法）。

总灰分 不得过 6.0%（《中国药典》通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 2.0%（《中国药典》通则 2302）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于 10.0%。

【性味与归经】辛，温。归肝、胆、心包经。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

【功能与主治】活血行气，祛风止痛。用于胸痹心痛，胸胁刺痛，跌扑肿痛，月经不调，经闭痛经，癥瘕腹痛，头痛，风湿痹痛。

【炮制作用】增强活血行气作用。用于血瘀头痛，偏头痛，胸胁疼痛，月经不调。

【用法与用量】3~9g。

【注意】孕妇及月经过多者慎用。

【贮藏】置阴凉干燥处，防蛀。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

川紫菀

Chuanziwan

LIGULARIAE RADIX ET RHIZOMA

本品为菊科植物川鄂橐吾 *Ligularia wilsoniana*(Hemsl.) Greenm.、狭苞橐吾 *Ligularia intermedia* Nakai.、鹿蹄橐吾 *Ligularia hodgsonii* Hook. 的根及根茎。秋季采挖，除去泥土，干燥。以上三种未除去须根者习称“毛紫菀”；前两种除去须根的根茎，习称“光紫菀”。

【药材收载标准】《重庆市中药材标准》

川紫菀

Chuanziwan

本品为川紫菀炮制加工品。

【炮制】除去杂质，分开大小，洗净，润透，切片（根茎）或段（根），干燥。

【性状】本品呈不规则形的片（根茎）或段（根），大小不一，有的可见茎基及纤维状叶柄残基。表面灰褐色、棕褐色或黑褐色，根茎表面可见须根脱落的痕迹或少量残存须根。质较硬、脆，切面色较浅，可见多数散在筋脉点或纤维束。气微或略具香气，味淡或味苦、辛。

【检查】水分 不得过 13.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 8.0%（《中国药典》通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 3.0%（《中国药典》通则 2302）。

【浸出物】照水溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 35.0%。

【性味与归经】辛、苦，温。归肺经。

【功能与主治】润肺下气，化痰止咳。用于外感咳嗽，咳痰不利，肺虚久咳，痰中带血。

【用法与用量】4.5~9g。

【贮藏】置阴凉干燥处，防潮。

川紫菀

Chuanziwan

LIGULARIAE RADIX ET RHIZOMA

本品为菊科植物川鄂橐吾 *Ligularia wilsoniana*(Hemsl.) Greenm.、狭苞橐吾 *Ligularia intermedia* Nakai.、鹿蹄橐吾 *Ligularia hodgsonii* Hook. 的根及根茎。秋季采挖，除去泥土，干燥。以上三种未除去须根者习称“毛紫菀”；前两种除去须根的根茎，习称“光紫菀”。

【药材收载标准】《重庆市中药材标准》

蜜川紫菀

Michuanziwan

本品为川紫菀的炮制加工品。

【炮制】取净川紫菀片或段，用蜜水拌匀，闷润至蜜水吸尽、透心，照蜜炙法（《中国药典》通则 0213）炒至颜色加深，不粘手。

每 100kg 川紫菀，用炼蜜 25kg。

【性状】本品呈不规则形的片或段，大小不一。表面棕褐色至紫棕色，偶有焦斑，不粘手或稍粘手。质较硬而韧。微具蜜焦香气，味甜。

【检查】水分 不得过 13.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 8.0%（《中国药典》通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 3.0%（《中国药典》通则 2302）。

【浸出物】照水溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 40.0%。

【性味与归经】辛、苦，温。归肺经。

【功能与主治】祛痰止咳，温肺下气。用于气逆咳嗽，痰吐不利，肺虚久咳，痰中带血。

【用法与用量】4.5~9g。

【贮藏】置通风干燥处，防潮。

脆 蛇

Cuishhe

OPHISAURUS

本品为蛇蜥科动物脆蛇蜥 *Ophisaurus harti* (Boulenger) 或细脆蛇蜥 *Ophisaurus gracilis* (Gray) 的干燥全体。春末、夏初捕捉，用酒醉死或用微火炕死，立即盘成圆盘状，低温干燥。

【药材收载标准】《重庆市中药材标准》

脆 蛇

Cuishhe

本品为脆蛇的炮制加工品。

【炮制】除去杂质。

【性状】脆蛇蜥 本品呈盘状，盘径 6~10cm。背面棕黄色或绿褐色，有的杂有黑色斑点或蓝紫色横斑，腹面黄白色或灰褐色，侧面自颈部至尾端具 1~2 个鳞片宽的黑条纹。全身被鳞片，覆瓦状排列成方格形网纹，具光泽。头部在内，三角形；背面被大型鳞片。多数在放大镜下可见鼻鳞与单片的前额鳞之间有 2 枚鳞片；全长 40~60cm，体部长 15~20cm，腹两侧各有一条凹沟，两凹沟间背鳞 16~18 行，中央 8~10 行具棱，相连成明显的纵棱到尾部。腹鳞 10 行。尾渐细，长约为体长的 2 倍或呈粗短的再生尾。尾腹面的鳞具棱。体轻，质脆，气微腥。

细脆蛇蜥 体较细长，长约 50cm。背面黑棕色，腹面黄色，鼻鳞与单生的前额鳞之间有 3 枚鳞片；两凹沟间背鳞 14~16 行。

【浸出物】水溶性浸出物 照水溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，不得低于 10.0%。

醇溶性浸出物 照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，用稀乙醇作溶剂，不得低于 7.0%。

【性味与归经】辛、咸，平；有小毒。归肾、肝、脾经。

【功能与主治】祛风湿，活血止痛。用于风湿痹痛，跌扑损伤，骨折筋伤。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

【用法与用量】3~6g。

【注意】孕妇忌用。

【贮藏】置干燥处，防蛀、防潮。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

脆 蛇

Cuishhe

OPHISAURUS

本品为蛇蜥科动物脆蛇蜥 *Ophisaurus harti* (Boulenger) 或细脆蛇蜥 *Ophisaurus gracilis* (Gray) 的干燥全体。春末、夏初捕捉，用酒醉死或用微火炕死，立即盘成圆盘状，低温干燥。

【药材收载标准】 《重庆市中药材标准》

脆 蛇 段

Cuisheduan

【炮制】 除去杂质，切段。

【性状】 本品为圆柱形的段。背部棕黄色、绿褐色或黑棕色，有的杂有黑色斑点或紫色横斑，腹面黄色、黄白色或灰褐色。侧面具黑条纹。被鳞片，覆瓦状排列成方格形网纹，具光泽。头部呈三角形，背面被大型鳞片，有的可见鼻鳞与单片前额鳞之间有 2 或 3 枚鳞片。尾腹面的鳞具棱。体轻，质脆，气微腥。

【浸出物】 水溶性浸出物 照水溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，不得低于 10.0%。

醇溶性浸出物 照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，用稀乙醇作溶剂，不得低于 7.0%。

【性味与归经】 辛、咸，平；有小毒。归肾、肝、脾经。

【功能与主治】 祛风湿，活血止痛。用于风湿痹痛，跌扑损伤，骨折筋伤。

【用法与用量】 3~6g。

【注意】 孕妇忌用。

【贮藏】 置干燥处，防虫蛀、防潮。

大菟丝子

Datusizi

CUSCUTAE JAPONICAE SEMEN

本品为旋花科植物金灯藤 *Cuscuta japonica* Choisy. 的干燥成熟种子。秋季果实成熟时采收，干燥，打下种子，除去杂质。

【药材收载标准】《重庆市中药材标准》

大菟丝子

Datusizi

本品为大菟丝子炮制加工品。

【炮制】除去杂质。

【性状】呈类圆形或类三棱形，直径 2~3mm。表面黄棕色、棕褐色或淡黄色，一侧微凹陷，种脐类圆形，色稍淡。质坚硬，不易以指甲压碎。气微，味微涩，嚼之微有粘滑感。

【鉴别】取本品少量，加沸水浸泡后，表面有黏性；加热煮至种皮破裂时，可露出黄白色卷旋状的胚，形如吐丝。

【检查】水分 不得过 13.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 3.0%（《中国药典》通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 1.0%（《中国药典》通则 2302）。

【性味与归经】甘、辛，平。归肝、肾、脾经。

【功能与主治】补肝肾，益精髓，明目，安胎。用于腰膝酸软，遗精，目昏，尿频，小便淋漓，妇女流产，胎动不安。

【用法与用量】6~12g。

【贮藏】置通风干燥处。

大菟丝子

Datusizi

CUSCUTAE JAPONICAE SEMEN

本品为旋花科植物金灯藤 *Cuscuta japonica* Choisy. 的干燥成熟种子。秋季果实成熟时采收，干燥，打下种子，除去杂质。

【药材收载标准】《重庆市中药材标准》

盐大菟丝子

Yandatusizi

本品为大菟丝子的炮制加工品。

【炮制】取净大菟丝子，用盐水拌匀，闷润至盐水吸尽，照盐炙法（《中国药典》通则 0213）炒至微有爆裂声，微具焦斑，有香气溢出。

每 100kg 大菟丝子，用食盐 2kg。

【性状】本品呈类圆形或类三棱形，直径 2~3mm。表面深棕色或棕褐色，一侧微凹陷，另侧稍鼓起。质硬，不易以指甲压碎。气微香，味微咸。

【鉴别】取本品少量，加沸水浸泡后，表面有黏性；加热煮至种皮破裂时，可露出黄白色卷旋状的胚，形如叶丝。

【检查】水分 不得过 11.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 5.0%（《中国药典》通则 2302）。酸不溶性灰分 不得过 2.0%（《中国药典》通则 2302）。

【性味与归经】甘、辛，平。归肝，肾，脾经。

【功能与主治】补肝肾，益精髓，明目，安胎。用于腰膝酸软，遗精，目昏，尿频，小便淋漓，妇女流产，胎动不安。

【用法与用量】6~12g。

【贮藏】置通风干燥处。

大叶茜草

Dayeqiancao

RUBIAE SCHUMANNIANAE RHIZOMA

本品为茜草科植物大叶茜草 *Rubia schumanniana* Pritz. 的干燥根茎。春、秋二季采挖，除去须根及泥沙，干燥。

【药材收载标准】《重庆市中药材标准》

大叶茜草

Dayeqiancao

本品为大叶茜草的炮制加工品。

【炮制】除去杂质，洗净，润透，切段，干燥。

【性状】本品呈细长圆柱形的段。表面红色或紫红色，有纵沟。质脆易折断，断面平坦，红色。皮层薄，木部较宽，淡红色或黄色。具髓，气微，味微甜。

【鉴别】（1）取本品粉末 0.2g，加乙醚 5ml，振摇数分钟，滤过，滤液加氢氧化钠试液 1ml，振摇，静置，分层后，水层显红色；置紫外光灯（365nm）下观察，醚层显天蓝色荧光。

（2）取本品粉末 0.5g，置锥形瓶中，加甲醇 10ml，超声处理 30 分钟，滤过，滤液浓缩至约 1ml，作为供试品溶液。另取大叶茜草素对照品，加甲醇制成每 1ml 含 2mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 10 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以石油醚（60~90 $^{\circ}$ C）-丙酮（4：1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 10%硫酸乙醇溶液，在 105 $^{\circ}$ C 加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】水分 不得过 14.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 13.0%（《中国药典》通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 5.0%（《中国药典》通则 2302）。

【含量测定】照高效液相色谱法（《中国药典》通则 0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-水（80：20）为流动相；检测波长为 250nm。理论板数按大叶茜草素峰计算应不低于 4000。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

对照品溶液的制备 精密称取大叶茜草素对照品适量，加甲醇制成每 1ml 含 80ug 的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品细粉约 0.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入甲醇 25ml，称定重量，浸泡过夜，超声处理（功率 250W，频率 33kHz）30 分钟，放冷，再称定重量，用甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液 10 μ l 与供试品溶液 5~10 μ l，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含大叶茜草素（C₁₇H₁₆O₄）不得少于 0.15%。

【性味与归经】 苦，寒。归肝经。

【功能与主治】 凉血，止血，祛瘀，通经。用于吐血，衄血，崩漏出血，外伤出血，经闭瘀阻，关节痹痛，跌扑肿痛。

【用法与用量】 6~9g。

【贮藏】 置干燥处。

大叶茜草

Dayeqiancao

RUBIAE SCHUMANNIANAE RHIZOMA

本品为茜草科植物大叶茜草 *Rubia schumanniana* Pritz. 的干燥根茎。春、秋二季采挖，除去须根及泥沙，干燥。

【药材收载标准】《重庆市中药材标准》

大叶茜草炭

Dayeqiancaotan

本品为大叶茜草的炮制加工品。

【炮制】取大叶茜草段，照清炒法（《中国药典》通则 0213）炒至表面焦黑色。

【性状】本品为细长圆柱形的段，表面焦褐色至焦黑色，质松脆。气焦香。

【检查】总灰分 不得过 15.0%（《中国药典》通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 5.0%（《中国药典》通则 2302）。

【性味与归经】苦，寒。归肝经。

【功能与主治】凉血，止血，祛瘀，通经。用于吐血，衄血，崩漏出血，外伤出血，经闭瘀阻，关节痹痛，跌扑肿痛。炒炭后增加止血功效。

【用法与用量】6~9g。

【贮藏】置干燥处。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

大 枣

Dazao

JUJUBAE FRUCTUS

本品为鼠李科植物枣 *Ziziphus jujuba* Mill. 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采收，晒干。

【药材收载标准】 《中国药典》2020 年版一部

大枣（去核）

Dazao

本品为大枣的炮制加工品。

【炮制】 除去杂质，去核，干燥。

【性状】 本品呈椭圆形或球形。表面暗红色，略带光泽，有不规则皱纹。外果皮薄，中果皮棕黄色或淡褐色，肉质，柔软，富糖性而油润。中空。气微香，味甜。

【鉴别】 (1)本品粉末棕色。外果皮棕色至棕红色。表皮细胞表面观类方形、多角形或长方形，胞腔内充满棕红色物，断面观外被较厚角质层。表皮下细胞黄色或黄棕色，类多角形，壁稍厚。草酸钙簇晶(有的碎为砂晶)或方晶较小，存在于中果皮薄壁细胞中。

(2)取本品粉末 2g，加石油醚(60~90℃)10ml，浸泡 10 分钟，超声处理 10 分钟，滤过，弃去石油醚液，药渣晾干，加乙醚 20ml，浸泡 1 小时，超声处理 15 分钟，滤过，滤液浓缩至 2ml，作为供试品溶液。另取大枣对照药材 2g，同法制成对照药材溶液。再取齐墩果酸对照品、白桦脂酸对照品，加乙醇分别制成每 1ml 各含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(《中国药典》通则 0502)试验，吸取供试品溶液和对照药材溶液各 10 μ l、上述两种对照品溶液各 4 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-冰醋酸(14:4:0.5)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 10%硫酸乙醇溶液，加热至斑点显色清晰，分别置日光和紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点或荧光斑点。

【检查】 水分 不得过 20.0%(《中国药典》通则 0832 第二法)。

总灰分 不得过 2.0% (《中国药典》通则 2302)。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

黄曲霉毒素 照黄曲霉毒素测定法（《中国药典》通则 2351）测定。

本品每 1000g 含黄曲霉毒素 B₁ 不得过 5 μ g，黄曲霉毒素 G₂、黄曲霉毒素 G₁、黄曲霉毒素 B₂ 和黄曲霉毒素 B₁ 的总量不得过 10 μ g。

【性味与归经】甘，温。归脾、胃、心经。

【功能与主治】补中益气，养血安神。用于脾虚食少，乏力便溏，妇人脏躁。

【用法与用量】6~15g。

【贮藏】置干燥处，防蛀。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

党参

Dangshen

CODONOPSIS RADIX

本品为桔梗科植物党参 *Codonopsis pilosula* (Franch.) Nannf.、素花党参 *Codonopsis pilosula* Nannf. var. *modesta* (Nannf.) L. T. Shen 或川党参 *Codonopsis tangshen* Oliv. 的干燥根。秋季采挖，洗净，晒干。

【药材收载标准】《中国药典》2020年版一部

土炒党参

Tuchaodangshen

本品为党参炮制加工品。

【炮制】取党参片或段，照土炒法炒至黄色，有香气溢出。

每 100kg 党参片或段，用灶心土 25kg。

【性状】本品呈类圆形的厚片或段。外表皮为土黄色，可见细土粉粘附。

【鉴别】取本品粉末 1g，加甲醇 25ml，超声处理 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加水 15ml 使溶解，通过 D101 型大孔吸附树脂柱（内径为 1.5cm，柱高为 10cm），用水 50ml 洗脱，弃去水液，再用 50%乙醇 50ml 洗脱，收集洗脱液，蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取党参炔苷对照品，加甲醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取供试品溶液 2~4 μ l、对照品溶液 2 μ l，分别点于同一高效硅胶 G 薄层板上，以正丁醇-冰醋酸-水（7:1:0.5）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 10%硫酸乙醇溶液，在 100℃加热至斑点显色清晰，分别置日光和紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点或荧光斑点。

【检查】水分 不得过 13.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 7.0%（《中国药典》通则 2302）。

【浸出物】照水溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 55.0%。

【性味与归经】甘，平。归脾、肺经。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

【功能与主治】 健脾益肺，养血生津。用于脾肺气虚，食少倦怠，咳嗽虚喘，气血不足，面色萎黄，心悸气短，津伤口渴，内热消渴。

【用法与用量】 9~30g。

【注意】 不宜与藜芦同用。

【贮藏】 置通风干燥处，防潮。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

冬瓜子

Dongguazi

BENINCASAE SEMEN

本品为葫芦科植物冬瓜 *Benincasa hispida* (Thunb.) Cogn. 的干燥成熟种子。收集成熟的冬瓜种子，晒干。

【药材收载标准】《中国药典》1977年版一部。

冬瓜子

Dongguazi

本品为冬瓜子的炮制加工品。

【炮制】除去杂质，干燥。

【性状】本品呈扁平卵圆形，长1~1.4cm，宽0.5~0.8cm，厚约0.2cm。表面淡黄白色，略粗糙，边缘光滑（单边冬瓜子）或两面外缘各有1环纹（双边冬瓜子）。顶端较尖，并有2个小突起，基部钝圆。种皮硬而脆；子叶2，白色，有油性。体轻。气微，味微甜。

【检查】水分 不得过13.0%（《中国药典》通则0832第二法）。

【性味与归经】甘、微寒。归肺、大肠经。

【功能与主治】清肺化痰，排脓利湿。用于痰热咳嗽，肺脓疡，阑尾炎，白带。

【用法与用量】9~30g。

【贮藏】置通风干燥处，防蛀。

冬瓜子

Dongguazi

SEMEN BENINCASAE

本品为葫芦科植物冬瓜 *Benincasa hispida* (Thunb.) Cogn. 的干燥成熟种子。食用冬瓜时收集成熟的种子，晒干。

【药材收载标准】《中国药典》1977年版一部。

炒冬瓜子

Chaodongguazi

本品为冬瓜子的炮制加工品。

【炮制】取净冬瓜子照清炒法（《中国药典》通则 0213）炒至黄白色，略具焦香气。

【性状】本品呈扁平卵圆形，长1~1.4cm，宽0.5~0.8cm。表面黄白色至黄棕色，略粗糙，偶有焦斑，边缘光滑（单边冬瓜子）或两面外缘各有1环纹（双边冬瓜子）。顶端较尖，并有2个小突起，基部钝圆。种皮硬而脆，子叶2，白色，有油性。体轻。略具焦香气，味微甜。

【检查】水分 不得过13.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

【性味与归经】甘、微寒。

【功能与主治】清肺化痰，排脓利湿。用于痰热咳嗽，肺脓疡，阑尾炎，白带。

【用法与用量】9~30g。

【贮藏】置通风干燥处，防蛀。

杜仲叶

duzhongye

EUCOMMIAE FOLIUM

本品为杜仲科植物杜仲 *Eucommia ulmoides* Oliv. 的干燥叶。夏、秋二季枝叶茂盛时采收，晒干或低温烘干。

【药材收载标准】《中国药典》2020 年版一部

盐杜仲叶

Yanduzhongye

本品为杜仲叶的炮制加工品。

【炮制】取净杜仲叶（丝），用盐水拌匀，闷润至盐水吸尽，照盐炙法（《中国药典》通则 0213）炒至表面略带黑褐色。

每 100kg 杜仲叶，用食盐 2kg。

【性状】本品呈丝状或破碎，表面灰褐色、棕褐色或绿褐色，微有光泽。质脆，搓之易碎，折断面有少量银白色橡胶丝相连。气微，味咸、微苦。

【鉴别】取本品粉末 1g，加甲醇 25ml，加热回流 1 小时，放冷，滤过，滤液作为供试品溶液。另取杜仲叶对照药材 1g，同法制成对照药材溶液。再取绿原酸对照品，加甲醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取上述三种溶液各 5~10 μ l，分别点于同一硅胶 H 薄层板上，以乙酸丁酯-甲酸-水（7:2.5:2.5）的上层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】水分 不得过 13.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，用稀乙醇作溶剂，不得少于 20.0%。

【性味与归经】微辛，温。归肝、肾经。

【功能与主治】补肝肾，强筋骨。用于肝肾不足，头晕目眩，腰膝酸痛，筋骨痿软。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

【用法与用量】10~15g。

【贮藏】置干燥处。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

鹅管石

Eguanshi

BALANOPHYLLIAE OS

本品为腔肠动物枇杷珊瑚科盔形珊瑚属动物丛生盔形珊瑚 *Galaxea fascicularis* (Linnaeus) 的石灰质骨骼的炮制加工品，主含碳酸钙(CaCO_3)。

【药材收载标准】《重庆市中药材标准》。

鹅管石

Eguanshi

本品为鹅管石的炮制加工品。

【炮制】除去杂质，洗净，干燥，砸成碎块或碾成粉末。

【性状】为不规则的圆管形的碎块或粉末。碎块表面乳白色或灰白色，有突起的节状横环纹及纵直棱线，质硬脆。碎断面有多数中隔，自中心呈放射状排列。粉末乳白色或灰白色。气微，味微咸。

【鉴别】取供试品 1g，加水 20 ml，超声 20 分钟，滤过，滤液加甲基红指示液 2 滴，用氨试液中和，再滴加盐酸至恰呈酸性，加草酸铵试液，即生成白色沉淀；分离，沉淀不溶于醋酸，但可溶于稀盐酸。

【含量测定】取本品细粉约 0.1g，精密称定。置锥形瓶中，加稀盐酸 5ml，加热使溶解。加水 100 ml 与甲基红指示液 1 滴，滴加氢氧化钾试液至显黄色。继续多加 10ml，再加钙黄绿素指示剂约 20 mg，用乙二胺四乙酸二钠滴定液（0.05mol/L）滴定至溶液由黄绿荧光色消失而显橙色。每 1ml 乙二胺四乙酸二钠滴定液（0.05mol/L）相当于 5.004mg 的碳酸钙（ CaCO_3 ）。

本品含碳酸钙（ CaCO_3 ）不得少于 90%。

【性味与归经】甘、温。归肺、肾经。

【功能与主治】补肾壮阳，通乳。用于肺癆咳嗽气喘，吐血，阳痿，腰膝无力，乳汁不通。

【用法与用量】9~15g。

【贮藏】置干燥处。

鹅管石

Eguanshi

BALANOPHYLLIAE OS

本品为枇杷珊瑚科动物丛生盔形珊瑚 *Galaxea fascicularis* (Linnaeus) 的石灰质骨骼。主含碳酸钙 (CaCO_3)。采收后，除去杂质，洗净，干燥。

【药材收载标准】《重庆市中药材标准》。

煨鹅管石

Duan'eguanshi

本品为鹅管石的炮制加工品。

【炮制】将净鹅管石碎块装入耐火容器内，置无烟炉火中，以武火煨烧至红透时，取出，放凉，碾成粉末。

【性状】本品为灰白色粉末，质酥松。无臭，味微咸。

【鉴别】取供试品 1g，加水 20ml，超声 20 分钟，滤过，滤液加甲基红指示液 2 滴，用氨试液中和，再滴加盐酸至恰呈酸性，加草酸铵试液，即生成白色沉淀；分离，沉淀不溶于醋酸，但可溶于稀盐酸。

【含量测定】取本品细粉约 0.1g，精密称定。置锥形瓶中，加稀盐酸 5ml，加热使溶解。加水 100 ml 与甲基红指示液 1 滴，滴加氢氧化钾试液至显黄色。继续多加 10ml，再加钙黄绿素指示剂约 20 mg，用乙二胺四乙酸二钠滴定液（0.05mol/L）滴定至溶液由黄绿荧光色消失而显橙色。每 1ml 乙二胺四乙酸二钠滴定液（0.05mol/L）相当于 5.004mg 的碳酸钙 (CaCO_3)。

本品含碳酸钙 (CaCO_3) 不得少于 90%。

【性味与归经】甘、温。归肺、肾经。

【功能与主治】温肾壮阳。用于肾虚气喘，阳痿不举等。

【用法与用量】9~15g。

【贮藏】置干燥处。

覆盆子

Fupenzi

RUBI FRUCTUS

本品为蔷薇科植物华东覆盆子 *Rubus chingii* Hu 的干燥果实。夏初果实由绿变绿黄时采收，除去梗、叶，置沸水中略烫或略蒸，取出，干燥。

【药材收载标准】《中国药典》2020 年版一部

盐覆盆子

Yanfupenzi

本品为覆盆子的炮制加工品。

【炮制】取净覆盆子，用盐水拌浸，闷润，待吸尽盐水后，置容器中蒸至透心，取出，干燥。

每 100kg 覆盆子，用盐 2kg。

【性状】本品为聚合果，由多数小核果聚合而成，呈圆锥形或扁圆锥形，高 0.6~1.3cm，直径 0.5~1.2cm。表面黄绿色或淡棕色至棕色，顶端钝圆，基部中心凹入。气微，味咸微涩。

【鉴别】(1)本品粉末棕黄色。非腺毛单细胞，长 60~450 μm ，直径 12~20 μm ，壁甚厚，木化，大多数具双螺纹，有的体部易脱落，足部残留而埋于表皮层，表面观圆多角形或长圆形，直径约至 23 μm ，胞腔分枝，似石细胞状。草酸钙簇晶较多见，直径 18~50 μm 。果皮纤维黄色，上下层纵横或斜向交错排列。

(2)取本品粉末（过四号筛）约 1g，置具塞锥形瓶中，加入 70%甲醇 50ml，加热回流提取 1 小时，放冷，滤过，取滤液 25ml，蒸干，残渣加水 20ml 使溶解，用石油醚（30~60 $^{\circ}\text{C}$ ）振摇提取 3 次，每次 20ml，弃去石油醚液，再用水饱和正丁醇振摇提取 3 次，每次 20ml，合并正丁醇液，蒸干，残渣加甲醇 5ml 使溶解，作为供试品溶液。取椴树苷对照品，加甲醇制成每 1ml 含 0.1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取供试品溶液 5 μl 与对照品溶液 2 μl ，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以乙酸乙酯-甲醇-水-甲酸（90:4:4:0.5）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以三氯化铝试液，在 105 $^{\circ}\text{C}$ 加热 5 分钟，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】水分 不得过 13.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

【性味与归经】甘、酸、咸，温。归肝、肾、膀胱经。

【功能与主治】益肾固精缩尿，养肝明目。用于遗精滑精，遗尿尿频，阳痿早泄，目暗昏花。盐制增强补肾固涩作用。

【用法与用量】6~12g。

【贮藏】置干燥处。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

赶黄草

Ganhuangcao

PENTHORT HERBA

本品为虎耳草科植物扯根菜 *Penthorum chinense* Pursh. 的干燥地上部分。夏、秋季采收，除去杂质，干燥。

【药材收载标准】《重庆市中药材标准》

赶黄草

Ganhuangcao

本品为赶黄草的炮制加工品。

【炮制】除去杂质，淋润，切段，干燥。

【性状】本品为段。茎呈圆柱状，表面黄红色或绿色，具纤维性，切面黄白色至黄褐色，中空。叶多破碎，黄绿色、灰绿色或黄红色。花黄绿色，无花瓣。气微，味微苦。

【鉴别】（1）本品茎横切面：表皮细胞一行，含棕黄色块状物。表皮下方由多列厚角细胞组成，气室约3列，被单列厚角细胞隔开。韧皮部较窄，形成层可见。木质部由导管、纤维组成，射线平直由1~2列细胞组成。髓部细胞类圆形。厚角细胞和韧皮薄壁细胞均含草酸钙簇晶，簇晶直径20~50 μ m。

本品叶粉末黄绿色。上表皮细胞多角形，垂周壁略呈连珠状增厚，部分细胞含有棕色黄色物质，气孔长圆形或类圆形，突出于叶表面，副卫细胞4~6个，不定式；下表皮细胞呈不规则形，垂周壁波状弯曲，有些细胞含有棕黄色物质，气孔较密集，副卫细胞4~6个，不定式；纤维多成束或单个散在，细长，直径20~40 μ m，壁厚5~9 μ m，部分纤维外侧细胞含有草酸钙簇晶，含晶细胞类圆形，壁稍厚，散列或3~7个沿纤维方向成列形成晶鞘纤维，草酸钙簇晶晶角短钝，直径20~50 μ m；螺纹导管直径25~50 μ m，螺纹紧密。

（2）取本品粉末1g，加乙醚20ml，加热回流30分钟，弃去乙醚液，药渣挥干溶剂，加80%甲醇20ml，加热回流1小时，取出，放冷，滤过，滤液蒸干，残渣加水10ml使溶解，加盐酸2ml，置水浴中加热回流30分钟，取出，迅速冷却，用乙醚提取2次，每次10ml，合并乙醚液，挥干，残渣加乙醇1ml使溶解，作为

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

供试品溶液。另取槲皮素对照品，加乙醇制成每 1ml 含 0.5mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-甲酸（5:4:0.1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 3%三氯化铝乙醇溶液，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】总灰分 不得过 9.0%（《中国药典》通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 1.5%（《中国药典》通则 2302）。

【浸出物】照水溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 14.0%。

【含量测定】照高效液相色谱法（《中国药典》通则 0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-0.4%磷酸溶液（50:50）为流动相；检测波长为 360nm。理论板数按槲皮素峰计算应不低于 3000。

对照品溶液的制备 精密称取槲皮素对照品适量，加 80%甲醇制成每 1ml 含 40 μ g 的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品粉末（过 3 号筛）约 1.0g，精密称定，精密加入 80%甲醇溶液 20ml，称定重量，加热回流 60 分钟，放冷，再称定重量，用 80%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，精密量取续滤液 10ml，精密加入 15%盐酸溶液 4ml，85 $^{\circ}$ C 水浴中回流 20 分钟，取出，迅速冷却，转移至 25ml 量瓶中，加甲醇至刻度，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液 10 μ l、供试品溶液 5~20 μ l，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含槲皮素（ $C_{15}H_{10}O_7$ ）不得少于 0.10%。

【性味与归经】甘，微寒。归肝经。

【功能与主治】除湿利水，祛瘀止痛。主治黄疸，经闭，水肿，跌打损伤。

【用法与用量】15~30g；外用适量，煎水洗或捣敷患处。

【贮藏】置干燥处。

赶黄草

Ganhuangcao

PENTHORT HERBA

本品为虎耳草科植物扯根菜 *Penthorum chinense* Pursh. 的干燥地上部分。夏、秋季采收，除去杂质，干燥。

【药材收载标准】《重庆市中药材标准》

赶黄草花

Ganhuangcaohua

本品为赶黄草的炮制加工品。

【炮制】收集赶黄草中掉落的花，除去杂质。

【性状】本品呈蠓尾聚伞花序，分枝疏生短腺毛。苞片小，卵形或钻形；花梗长 0.5~2mm，带有嫩枝。花萼黄绿色，筒宽钟形，长约 2mm，深裂 5~7，裂片三角形，先端微尖或微钝，无花瓣；胚珠细小多数。荫果红紫色。气微，味微苦。

【鉴别】取本品粉末 1g，加乙醚 20ml，加热回流 30 分钟，弃去乙醚液，药渣挥干溶剂，加 80% 甲醇 20ml，加热回流 1 小时，取出，放冷，滤过，滤液蒸干，残渣加水 10ml 使溶解，加盐酸 2ml，置水浴中加热回流 30 分钟，取出，迅速冷却，用乙醚提取 2 次，每次 10ml，合并乙醚液，挥干，残渣加乙醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取槲皮素对照品，加乙醇制成每 1ml 含 0.5mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-甲酸（5:4:0.1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 3% 三氯化铝乙醇溶液，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】总灰分 不得过 9.0%（《中国药典》通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 1.5%（《中国药典》通则 2302）。

【浸出物】照水溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 14.0%。

【含量测定】照高效液相色谱法（《中国药典》通则 0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-0.4%

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

磷酸溶液（50:50）为流动相；检测波长为 360nm。理论板数按槲皮素峰计算应不低于 3000。

对照品溶液的制备 精密称取槲皮素对照品适量，加 80%甲醇制成每 1ml 含 40 μ g 的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品粉末（过 3 号筛）约 1.0g，精密称定，精密加入 80%甲醇溶液 20ml，称定重量，加热回流 60 分钟，放冷，再称定重量，用 80%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，精密量取续滤液 10ml，精密加入 15%盐酸溶液 4ml，85 $^{\circ}$ C 水浴中回流 20 分钟，取出，迅速冷却，转移至 25ml 量瓶中，加甲醇至刻度，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液 10 μ l、供试品溶液 5~20 μ l，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含槲皮素（ $C_{15}H_{10}O_7$ ）不得少于 0.20%。

【性味与归经】甘，平。归肝经。

【功能与主治】除湿利水，祛瘀止痛。主治黄疸，经闭，水肿，跌打损伤。

【用法与用量】15~30g；外用适量，煎水洗或捣敷患处。

【贮藏】置干燥处。

赶黄草

Ganhuangcao

PENTHORT HERBA

本品为虎耳草科植物扯根菜 *Penthorum chinense* Pursh. 的干燥地上部分。夏、秋季采收，除去杂质，干燥。

【药材收载标准】《重庆市中药材标准》

赶黄草叶

Ganhuangcaoye

本品为赶黄草的炮制加工品。

【炮制】除去杂质及花、茎。

【性状】本品多皱缩、破碎。完整叶片展开后呈披针形，两面无毛，上表面黄红色或暗绿色，下表面红黄色或灰绿色。偶尔可见未去尽的花序。气微，味微苦。

【鉴别】（1）本品叶粉末黄绿色。上表皮细胞多角形，垂周壁略呈连珠状增厚，部分细胞含有棕色黄色物质，气孔长圆形或类圆形，突出于叶表面，副卫细胞4~6个，不定式；下表皮细胞呈不规则形，垂周壁波状弯曲，有些细胞含有棕黄色物质，气孔较密集，副卫细胞4~6个，不定式；纤维多成束或单个散在，细长，直径20~40 μm ，壁厚5~9 μm ，部分纤维外侧细胞含有草酸钙簇晶，含晶细胞类圆形，壁稍厚，散列或3~7个沿纤维方向成列形成晶鞘纤维，草酸钙簇晶晶角短钝，直径20~50 μm ；螺纹导管直径25~50 μm ，螺纹紧密。

（2）取本品粉末1g，加乙醚20ml，加热回流30分钟，弃去乙醚液，药渣挥干溶剂，加80%甲醇20ml，加热回流1小时，取出，放冷，滤过，滤液蒸干，残渣加水10ml使溶解，加盐酸2ml，置水浴中加热回流30分钟，取出，迅速冷却，用乙醚提取2次，每次10ml，合并乙醚液，挥干，残渣加乙醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取槲皮素对照品，加乙醇制成每1ml含0.5mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则0502）试验，吸取上述两种溶液各5 μl ，分别点于同一硅胶G薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-甲酸（5:4:0.1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以3%三氯化铝乙醇溶液，置紫外光灯（365nm）下检视。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

供试品色谱中在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】水分 不得过 13.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 9.0%（《中国药典》通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 1.5%（《中国药典》通则 2302）。

【浸出物】照水溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 14.0%

【含量测定】照高效液相色谱法（《中国药典》通则 0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-0.4%磷酸溶液（50:50）为流动相；检测波长为 360nm。理论板数按槲皮素峰计算应不低于 3000。

对照品溶液的制备 精密称取槲皮素对照品适量，加 80%甲醇制成每 1ml 含 40 μ g 的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品粉末（过 3 号筛）约 1.0g，精密称定，精密加入 80%甲醇溶液 20ml，称定重量，加热回流 60 分钟，放冷，再称定重量，用 80%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，精密量取续滤液 10ml，精密加入 15%盐酸溶液 4ml，85 $^{\circ}$ C 水浴中回流 20 分钟，取出，迅速冷却，转移至 25ml 量瓶中，加甲醇至刻度，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液 10 μ l、供试品溶液 5~20 μ l，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含槲皮素（C₁₅H₁₀O₇）不得少于 0.20%。

【性味与归经】甘，微寒。归肝经。

【功能与主治】除湿利水，祛瘀止痛。主治黄疸，经闭，水肿，跌打损伤。

【用法与用量】15~30g。外用适量，煎水洗或捣敷患处。

【贮藏】置干燥处。

蛤 蚧

Gejie

GECKO

本品为壁虎科动物蛤蚧 *Gekko gekko* Linnaeus 的干燥体。全年均可捕捉，除去内脏，拭净，用竹片撑开，使全体扁平顺直，低温干燥。

【药材收载标准】《中国药典》2020 年版一部

蛤 蚧

Gejie

本品为蛤蚧的炮制加工品。

【炮制】除去杂质。

【性状】本品呈扁片状，腹部及四肢用竹片或竹条撑开。头颈部及躯干部长 9~18cm，头颈部约占三分之一，腹背部宽 6~11cm，尾长 6~12cm。头略呈扁三角状，两眼多凹陷成窟窿，口内有细齿，生于颚的边缘，无异型大齿。吻部半圆形，吻鳞不切鼻孔，与鼻鳞相连，上鼻鳞左右各 1 片，上唇鳞 12~14 对，下唇鳞（包括颊鳞）21 片。腹背部呈椭圆形，腹薄。背部呈灰黑色或银灰色，有黄白色、灰绿色或橙红色斑点散在或密集成不显著的斑纹，脊椎骨和两侧肋骨突起。四足均具 5 趾；趾间仅具蹼迹，足趾底有吸盘。尾细而坚实，微现骨节，与背部颜色相同，有 6~7 个明显的银灰色环带，有的再生尾较原生尾短，且银灰色环带不明显。全身密被圆形或多角形微有光泽的细鳞。气腥，味微咸。

【鉴别】（1）本品粉末淡黄色或淡灰黄色。横纹肌纤维侧面观有波峰状或稍平直的细密横纹；横断面观三角形、类圆形或类方形。鳞片近无色，表面可见半圆形或类圆形的隆起，略作覆瓦状排列，布有极细小的粒状物，有的可见圆形孔洞。皮肤碎片表面可见棕色或棕黑色色素颗粒。骨碎片不规则碎块状，表面有细小裂缝状或针状空隙；可见裂缝状骨陷窝。

（2）取本品粉末 0.4g，加 70%乙醇 5ml，超声处理 30 分钟，滤过，滤液作为供试品溶液。另取蛤蚧对照药材 0.4g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

《中国药典》通则 0502)试验，吸取上述两种溶液各 5~8 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以正丁醇-冰醋酸-水 (3:1:1)为展开剂，展开 15cm，取出，晾干，喷以茚三酮试液，在 105 $^{\circ}$ C 加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的冷浸法测定，用稀乙醇作溶剂，不得少于 8.0%。

【性味与归经】咸、平。归肺、肾经。

【功能与主治】补肺益肾，纳气定喘，助阳益精。用于肺肾不足，虚喘气促，劳嗽咳血，阳痿，遗精。

【用法与用量】3~6g，多入丸散或酒剂。

【贮藏】用木箱严密封装，常用花椒拌存，置阴凉干燥处，防蛀。

隔山撬

Geshanqiao

CYNANCHI AURICULATI RADIX

本品为萝藦科植物牛皮消 *Cynanchum auriculatum* Royle. ex Wight. 的干燥块根。秋末、初春采挖，直接干燥或趁鲜切片，干燥。

【药材收载标准】《重庆市中药材标准》

隔山撬

Geshanqiao

本品为隔山撬的炮制加工品。

【炮制】除去杂质；产地未切片者，除去杂质，洗净，润透，切片，干燥。

【性状】本品为类圆形、椭圆形的圆片、直片或斜片，平直或微翘，边缘内卷。表面黄白色或灰白色，残留栓皮棕色或棕褐色，有的可见细纵皱纹或横长皮孔。切面类白色，粉性，可见略突起的筋脉点或筋脉纹。质脆。气微，味甘、微苦。

【鉴别】取本品粉末 2g，加三氯甲烷-甲醇（2:1）混合溶液振摇提取 2 次，每次 5ml，滤过，合并滤液，蒸干，残渣加少量三氯甲烷使溶解，加石油醚（30℃~60℃）3ml，使沉淀析出，弃去石油醚液，沉淀物加三氯甲烷溶解，再加石油醚 30℃~60℃）3ml 使沉淀，分离沉淀：

①取沉淀少许，滴加三氯化锑的三氯甲烷饱和溶液，即呈紫红色。

②取沉淀少许，加冰醋酸 1ml 使溶解，加醋酐 1ml 摇匀，再加浓硫酸 2 滴，先呈红紫色，后渐变成墨绿色。

【检查】水分 不得过 13.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 5.0%（《中国药典》通则 2302）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下热浸法测定，用 60%乙醇作溶剂，不得少于 12.0%。

【性味与归经】甘、微苦，平。归脾、胃、肝经。

【功能与主治】消食健胃，理气止痛。用于宿食不消，脘腹胀满疼痛，呕吐腐秽。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

【用法与用量】12~30g。

【贮藏】置阴凉干燥处，防蛀。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

枸杞子

Gouqizi

LYCII FRUCTUS

本品为茄科植物宁夏枸杞 *Lycium barbarum* L. 的干燥成熟果实。夏、秋二季果实呈红色时采收，热风烘干，除去果梗，或晾至皮皱后，晒干，除去果梗。

【药材收载标准】《中国药典》2020年版一部

酒枸杞子

Jiugouqizi

本品为枸杞子的炮制加工品。

【炮制】取净枸杞子，加黄酒拌匀吸干，照蒸法（《中国药典》通则 0213）及时蒸至表面颜色略加深、稍软成型，取出，及时摊开，低温干燥。

每 100kg 枸杞子，用黄酒 5kg。

【性状】本品呈类纺锤形或椭圆形。表面红色或暗红色。果皮柔韧，皱缩；果肉肉质，柔润。种子 20~50 粒，类肾形，扁而翘，长 1.5~1.9mm，宽 1~1.7mm，表面浅黄色或棕黄色。微具酒气，味甜。

【鉴别】（1）本品粉末黄橙色或红棕色。外果皮表皮细胞表面观呈类多角形或长多角形，垂周壁平直或细波状弯曲，外平周壁表面有平行的角质条纹。中果皮薄壁细胞呈类多角形，壁薄，胞腔内含橙红色或红棕色球形颗粒。种皮石细胞表面观不规则多角形，壁厚，波状弯曲，层纹清晰。

（2）取本品 0.5g，加水 35ml，加热煮沸 15 分钟，放冷，滤过，滤液用乙酸乙酯 15ml 振摇提取，分取乙酸乙酯液，浓缩至 1ml，作为供试品溶液。另取枸杞子对照药材 0.5g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以乙酸乙酯-三氯甲烷-甲酸（3:2:1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】水分 不得过 13.0%（《中国药典》通则 0832 第二法，温度为 80℃）。总灰分 不得过 5.0%（《中国药典》通则 2302）。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

【浸出物】照水溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 55.0%。

【性味与归经】甘，平。归肝、肾经。

【功能与主治】滋补肝肾，益精明目。用于虚劳精亏，腰膝酸痛，眩晕耳鸣，阳萎遗精，内热消渴，血虚萎黄，目昏不明。酒制增强滋补肝肾功能。

【用法与用量】6~12g。

【贮藏】置阴凉干燥处，防闷热，防潮，防蛀。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

枸杞子

Gouqizi

LYCII FRUCTUS

本品为茄科植物宁夏枸杞 *Lycium barbarum* L. 的干燥成熟果实。夏、秋二季果实呈红色时采收，热风烘干，除去果梗，或晾至皮皱后，晒干，除去果梗。

【药材收载标准】《中国药典》2020年版一部

盐枸杞子

Yangouqizi

本品为枸杞子的炮制加工品。

【炮制】取盐置热锅中翻动，炒至滑利，投入枸杞子，炒至表面鼓起时，取出，筛去盐，摊凉。

每 100kg 枸杞子，用食盐 20kg。

【性状】本品呈类纺锤形或椭圆形，表面暗红色或暗红黄色，微鼓起。味微咸。

【鉴别】取本品 0.5g，加水 35ml，加热煮沸 15 分钟，放冷，滤过，滤液用乙酸乙酯 15ml 振摇提取，分取乙酸乙酯液，浓缩至 1ml，作为供试品溶液。另取枸杞子对照药材 0.5g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以乙酸乙酯-三氯甲烷-甲酸（3:2:1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】水分 不得过 13.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 11.0%（《中国药典》通则 2302）。

【浸出物】照水溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 55.0%。

【性味与归经】甘，平。归肝、肾经。

【功能与主治】滋补肝肾，益精明目。用于虚劳精亏，腰膝酸痛，眩晕耳鸣，阳萎遗精，内热消渴，血虚萎黄，目昏不明。

【用法与用量】6~12g。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

【贮藏】置通风干燥处，防闷热，防潮，防注。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

瓜蒌皮

Gualoupi

TRICHOSANTHIS PERICARPIUM

本品为葫芦科植物栝楼 *Trichosanthes kirilowii* Maxim. 或双边栝楼 *Trichosanthes rosthornii* Harms 的干燥成熟果皮。秋季采摘成熟果实，剖开，除去果瓢及种子，阴干。

【药材收载标准】《中国药典》2020 年版一部

蜜瓜蒌皮

Migualoupi

本品为瓜蒌皮的炮制加工品。

【炮制】取净瓜蒌皮（丝），用蜜水拌匀，闷润至蜜水吸尽，照蜜炙法（《中国药典》通则 0213）炒至颜色加深，不粘手。

每 100kg 瓜蒌皮，用炼蜜 25kg。

【性状】本品为丝条状或方块状，外表面棕绿色、棕黄色或棕褐色，略皱缩，有光泽；内表面淡黄棕色或浅棕黄色。具蜜焦香气，味甜、微酸。

【鉴别】取本品，在 60℃ 烘干，粉碎，取粗粉 2g，加乙醇 20ml，超声处理 15 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇 2ml 使溶解，作为供试品溶液。另取瓜蒌皮对照药材 2g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5 μ l 分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以石油醚（60~90℃）-乙酸乙酯（4:1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 5% 香草醛硫酸溶液，加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】水分 不得过 13.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

【性味与归经】甘，寒。归肺、胃经。

【功能与主治】清热化痰，利气宽胸。用于痰热咳嗽，胸闷胁痛。

【用法与用量】6~10g。

【注意】不宜与川乌、制川乌、草乌、制草乌、附子同用。

【贮藏】置阴凉干燥处，防霉，防潮。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

诃子

Hezi

CHEBULAE FRUCTUS

本品为使君子科植物诃子 *Terminalia chebula* Retz. 或绒毛诃子 *Terminalia chebula* Retz. var. *tomentella* Kurt. 的干燥成熟果实。秋、冬二季果实成熟时采收，除去杂质，晒干。

【药材收载标准】《中国药典》2020年版一部

煨诃子

Weihezi

本品为诃子的炮制加工品。

【炮制】取净诃子，照煨制法（《中国药典》通则 0213）煨至深褐色。

【性状】本品为长圆形或卵圆形。表面深褐色或焦褐色，外表凹凸不平，偶尔可见裂隙，质坚实。有焦香气，味酸涩后甜。

【鉴别】（1）本品粉末深褐色。纤维淡黄色，成束，纵横交错排列或与石细胞、木化厚壁细胞相联结。石细胞类方形、类多角形或呈纤维状，直径 14~40 μm ，长至 130 μm ，壁厚，孔沟细密；胞腔内偶见草酸钙方晶和砂晶。木化厚壁细胞淡黄色或无色，呈长方形、多角形或不规则形，有的一端膨大成靴状；细胞壁上纹孔密集；有的含草酸钙簇晶或砂晶。

（2）取本品（去核）粉末 0.5g，加无水乙醇 30ml，加热回流 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣用甲醇 5ml 溶解，通过中性氧化铝柱（100~200 目，5g，内径为 2cm），用稀乙醇 50ml 洗脱，收集洗脱液，蒸干，残渣用水 5ml 溶解后通过 C18（300mg）固相萃取小柱，用 30% 甲醇 10ml 洗脱，弃去 30% 甲醇液，再用甲醇 10ml 洗脱，收集洗脱液，蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取诃子对照药材（去核）0.5g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 4 μl ，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以甲苯-冰醋酸-水（12:10:0.4）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 10% 硫酸乙醇溶液，在 105 $^{\circ}\text{C}$ 加热至斑点显色清晰，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】总灰分 不得过 5.0%（《中国药典》通则 2302）。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

【浸出物】照水溶性浸出物测定法(《中国药典》通则 2201)项下的冷浸法测定，不得少于 24.0%。

【性味与归经】苦、酸、涩，平。归肺、大肠经。

【功能与主治】涩肠止泻，敛肺止咳，降火利咽。用于久泻久痢，便血脱肛，肺虚喘咳，久嗽不止，咽痛音哑。煨诃子增强涩肠止泻作用。

【用法与用量】3~10g。

【贮藏】置干燥处。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

核桃仁

Hetaoren

JUGLANDIS SEMEN

本品为胡桃科植物胡桃 *Juglans regia* L. 的干燥成熟种子。秋季果实成熟时采收，除去肉质果皮，晒干，除去核壳和木质隔膜，干燥。

【药材收载标准】《中国药典》2020年版一部

炒核桃仁

Chaohetaoren

本品为核桃仁的炮制加工品。

【炮制】取净核桃仁，除去杂质，取盐，置热锅中翻动，炒至滑利，投入核桃仁，炒至色变深、可见焦斑、气香，取出，除去盐及药屑，摊凉。

每 100kg 核桃仁，用食盐 25kg。

【性状】呈不规则的块状，大小不一，多破碎，有皱曲的沟槽，完整者类圆形，直径 2~3cm。种皮黄色或黄褐色，偶见焦斑，附有少许盐粒。膜质，具深棕色脉纹，种仁类白色或黄白色。质脆，富油性，气香，味咸。

【检查】水分 不得过 7.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

酸值 不得过 10.0（《中国药典》通则 2303）。

【性味与归经】甘，温。归肾、肺、大肠经。

【功能与主治】补肾，温肺，润肠。用于肾阳不足，腰膝酸软，阳痿遗精，虚寒喘嗽，肠燥便秘。

【用法与用量】6~9g。

【贮藏】置阴凉干燥处，防蛀。

红参

Hongshen

GINSENG RADIX ET RHIZOMA RUBRA

本品为五加科植物人参 *Panax ginseng* C. A. Mey. 的栽培品经蒸制后的干燥根和根茎。秋季采挖，洗净，蒸制后，干燥。

【药材收载标准】《中国药典》2020年版一部

红参须

Hongshenxu

本品为红参的炮制加工品。

【炮制】除去杂质，整理红参细枝根和须根，扎成小把。

【性状】本品为红参细枝根和须根扎成的小把，细支根和须根呈条形弯曲状，粗细不均。表面橙红色或棕黄色，有光泽，半透明。气香，味甘，微苦。

【鉴别】取本品粉末 1g，加三氯甲烷 40ml，加热回流 1 小时，弃去三氯甲烷液，药渣挥干溶剂，加水 0.5ml 搅拌湿润，加水饱和正丁醇 10ml，超声处理 30 分钟，吸取上清液加 3 倍量氨试液，摇匀，放置分层，取上层液蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取人参对照药材 1g，同法制成对照药材溶液。再取人参皂苷 Rb₁ 对照品、人参皂苷 Re 对照品、人参皂苷 R_f 对照品及人参皂苷 Rg₁ 对照品，加甲醇制成每 1ml 各含 2mg 的混合溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取上述三种溶液各 1~2 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-乙酸乙酯-甲醇-水（15:40:22:10）10 $^{\circ}$ C 以下放置的下层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 10% 硫酸乙醇溶液，在 105 $^{\circ}$ C 加热至斑点显色清晰，分别置日光和紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱和对照品色谱相应位置上，分别显相同颜色的斑点或荧光斑点。

【含量测定】照高效液相色谱法（《中国药典》通则 0512）测定。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈为流动相 A，以水为流动相 B，按下表中的规定进行梯度洗脱；检测波长为 203nm。理论板数按人参皂苷 Rg₁ 峰计算应不低于 6000。

时间（分钟）	流动相 A（%）	流动相 B（%）
0~35	19	81
35~55	19→29	81→71
55~70	29	71
70~100	29→40	71→60

对照品溶液的制备 分别取人参皂苷 Rg₁ 对照品、人参皂苷 Re 对照品、人参皂苷 Rb₁ 对照品，加甲醇制成每 1ml 中含人参皂苷 Rg₁0.5mg、人参皂苷 Re 0.3mg、人参皂苷 Rb₁0.5mg 的混合溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品粉末(过四号筛)约 1g，精密称定，置索氏提取器中，加三氯甲烷适量，加热回流 3 小时，弃去三氯甲烷液，药渣挥干溶剂，连同滤纸筒移入具塞锥形瓶中，精密加入水饱和正丁醇 50ml，密塞，放置过夜，超声处理(功率 250W，频率 50kHz)30 分钟，滤过。精密量取续滤液 25ml，置蒸发皿中蒸干，残渣加甲醇溶解，转移至 5ml 量瓶中，加甲醇至刻度，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液 10 μ l 与供试品溶液 10~20 μ l，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含人参皂苷 Rg₁(C₄₂H₇₂O₁₄)和人参皂苷 Re(C₄₈H₈₂O₁₈)的总量不得少于 0.25%，人参皂苷 Rb₁(C₅₄H₉₂O₂₃)不得少于 0.20%。

【性味与归经】甘、微苦，温。归脾、肺、心、肾经。

【功能与主治】大补元气，复脉固脱，益气摄血。用于体虚欲脱，肢冷脉微，

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

气不摄血，崩漏下血。

【用法与用量】 3~9g，另煎兑服。

【注意】 不宜与藜芦、五灵脂同用。

【贮藏】 置阴凉干燥处，密闭，防蛀。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

莲子

Lianzi

NELUMBINIS SEMEN

本品为睡莲科植物莲 *Nelumbo nucifera* Gaertn. 的干燥成熟种子。秋季果实成熟时采割莲房，取出果实，除去果皮，干燥。

【药材收载标准】《中国药典》2020年版一部

红莲米

Honglianmi

本品为莲子的炮制加工品。

【炮制】取莲子，除去杂质及莲子心。

【性状】本品略呈椭圆形或类球形。表面红棕色，有细纵纹和较宽的脉纹。一端中心呈乳头状突起，多有裂口，其周边略下陷。质硬，种皮薄，不易剥离。子叶黄白色，肥厚，中有空隙。气微，味微甘、微涩。

【鉴别】（1）本品粉末类白色。主为淀粉粒，单粒长圆形、类圆形、卵圆形或类三角形，有的具小尖突，直径4~25 μm ，脐点少数可见，裂缝状或点状；复粒稀少，由2~3分粒组成。色素层细胞黄棕色或红棕色，表面观呈类长方形、类长多角形或类圆形，有的可见草酸钙簇晶。子叶细胞呈长圆形，壁稍厚，有的呈连珠状，隐约可见纹孔域。可见螺旋导管和环纹导管。

（2）取本品粉末少许，加水适量，混匀，加碘试液数滴，呈蓝紫色，加热后逐渐褪色，放冷，蓝紫色复现。

（3）取本品粉末0.5g，加水5ml，浸泡，滤过，滤液置试管中，加 α -萘酚试液数滴，摇匀，沿管壁缓缓滴加硫酸1ml，两液交界处出现紫色环。

（4）取本品粗粉5g，加三氯甲烷30ml，振摇，放置过夜，滤过，滤液蒸干，残渣加乙酸乙酯2ml使溶解，作为供试品溶液。另取莲子对照药材5g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则0502）试验，吸取两种溶液各2 μl ，分别点于同一硅胶G薄层板上，以正己烷-丙酮（7:2）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以5%香草醛的10%硫酸乙醇溶液，在105 $^{\circ}\text{C}$ 加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

【检查】总灰分 不得过 5.0%（《中国药典》通则 2302）。

黄曲霉毒素 照黄曲霉毒素测定法（《中国药典》通则 2351）测定。

本品每 1000g 含黄曲霉毒素 B₁ 不得过 5μg，黄曲霉毒素 G₂、黄曲霉毒素 G₁、黄曲霉毒素 B₂ 和黄曲霉毒素 B₁ 总量不得过 10μg。

【性味与归经】甘、涩，平。归脾、肾、心经。

【功能与主治】补脾止泻，止带，益肾涩精，养心安神。用于脾虚泄泻，带下，遗精，心悸失眠。

【用法与用量】6~15g。

【贮藏】置干燥处，防蛀。

红毛五加皮

Hongmaowujiapi

ACANTHOPANACIS GIRALDII CORTEX

本品为五加科植物红毛五加 *Acanthopanax giraldii* Harms. 或毛梗红毛五加 *Acanthopanax giraldii* Harms var. *Hispidus* Hoo. 密生刺毛的干燥茎皮。春末、夏初剥取茎皮，干燥。

【药材收载标准】《重庆市中药材标准》

红毛五加皮

Hongmaowujiapi

本品为红毛五加皮的炮制加工品。

【炮制】 除去杂质，淋润，切段，干燥，筛去药屑。

【性状】 本品多为圆筒形的段。外表面黄白色、黄色或黄棕色，密被黄褐色或红褐色毛状针刺，长3~10mm，倒向一端；内表面黄绿色或黄棕色，具浅纵条纹。皮薄，质轻，折断面纤维性，外侧黄棕色，内侧绿白色或黄白色。气微，味淡。

【鉴别】 （1）本品粉末淡黄色、黄色或黄棕色。皮刺厚壁细胞淡黄色或红棕色，类长方形或长多角形，排列紧密，壁呈念珠状增厚；偶见细长分隔纤维，梭状，具薄的横隔，多破碎。韧皮纤维成束或单个散在，细长，有的边缘微呈波状弯曲，直径9~40 μ m，胞腔细窄，有孔沟。分泌道碎片含淡黄色或橘黄色分泌物。草酸钙簇晶直径15~70 μ m，多具小而尖锐的棱角。木栓细胞黄棕色，表面观长方形或类多角形。表皮细胞表面观多角形、类长方形，可见角质层纹理，垂周壁略增厚。

（2）取本品粉末0.5g，加50%甲醇30ml，加热回流1小时，滤过，滤液蒸干，残渣加50%甲醇2ml使溶解，作为供试品溶液。另取刺五加苷E对照品，加50%甲醇制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则0502）试验，吸取上述两种溶液各5 μ l，分别点于同一硅胶G薄层板

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

上，以三氯甲烷-甲醇-水（6:3:1）的下层溶液为展开剂，展开，取出，晾干。喷以 10%硫酸乙醇溶液，在 105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】水分 不得过 13.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 9.0%（《中国药典》通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 1.0%（《中国药典》通则 2302）。

【浸出物】照水溶性浸出物测定法（《中国药典》通则2201）项下的热浸法测定，不得少于12.0%。

【性味与归经】辛，温。归肝、肾经。

【功能与主治】祛风湿，通关节，强筋骨。用于痿痹，拘挛疼痛，风寒湿痹，腰膝无力，阳痿。

【用法与用量】3~12g。

【贮藏】置通风干燥处。

红 曲

Hongqu

ORYZAE SEMEN CUM MONASCO

本品为曲霉科真菌紫色红曲霉 *Monascus purpureus* Went 接种在粳米上培养发酵而成的红曲米。

【药材收载标准】《湖北省中药材标准》2009 年版

红 曲

Hongqu

本品为红曲的炮制加工品。

【炮制】除去杂质。

【性状】本品为不规则颗粒，状如碎米。表面紫红色或暗红色。质脆易碎，断面红色至粉红色；微有酵气，味淡。

【鉴别】（1）本品粉末红色或紫红色。糊化淀粉粒多，多聚集成团；未糊化淀粉粒多为单粒，类圆形或长圆形，直径 5~8 μm 。菌丝无色或淡红色，细长弯曲，有分枝，直径 1~3 μm 。子囊孢子，椭圆形，直径 3~5 μm 。

（2）取本品粉末 1g，加 75%乙醇 5ml，摇匀，超声处理 30 分钟，离心，取上清液作为供试品溶液。另取红曲对照药材 1g，同法制成对照药材溶液。再取洛伐他汀对照品，加 75%乙醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取上述三种溶液各 5 μl ，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-丙酮（5:1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 5%磷钼酸乙醇溶液，在 105 $^{\circ}\text{C}$ 加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】水分 不得过 12.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 2.0%（《中国药典》通则 2302）。

【性味与归经】甘，温。归肝、脾、大肠经。

【功能与主治】消食活血，健脾养胃。用于瘀滞腹痛，赤白带下，跌打损伤。

【用法与用量】6~12g；外用适量，捣敷患处。

【贮藏】置阴凉干燥处，防蛀。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

黄 柏

Huangbo

PHELLODENDRI CHINENSIS CORTEX

本品为芸香科植物黄皮树 *Phellodendron chinense* Schneid. 的干燥树皮。习称“川黄柏”。剥取树皮后，除去粗皮，晒干。

【药材收载标准】《中国药典》2020年版一部

酒黄柏

Jiuhuangbo

本品为黄柏的炮制加工品。

【炮制】取黄柏丝，照酒炙法（《中国药典》通则 0213）炒干，表面颜色加深。每 100kg 黄柏丝，用白酒 10kg。

【性状】本品形如黄柏丝，深黄色，有少量焦斑，略有酒气。

【鉴别】取本品粉末 0.2g，加 1%醋酸甲醇溶液 40ml，于 60℃超声处理 20 分钟，滤过，滤液浓缩至 2ml，作为供试品溶液。另取黄柏对照药材 0.1g，加 1%醋酸甲醇 20ml，同法制成对照药材溶液。再取盐酸黄柏碱对照品，加甲醇制成每 1ml 含 0.5mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取上述三种溶液各 3~5μl，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-甲醇-水（30:15:4）的下层溶液为展开剂，置氨蒸气饱和的展开缸内，展开，取出，晾干，喷以稀碘化铋钾试液。供试品色谱中，在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】水分 不得过 13.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 8.0%（《中国药典》通则 2302）。

【浸出物】照水溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 13.0%。

【性味与归经】苦，寒。归肾、膀胱经。

【功能与主治】清热燥湿，泻火除蒸，解毒疗疮。用于湿热泻痢，黄疸尿赤，带下阴痒，热淋涩痛，脚气痿躄，骨蒸劳热，盗汗，遗精，疮疡肿毒，湿疹湿疮。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

【用法与用量】3~12g；外用适量。

【贮藏】置通风干燥处，防潮。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

藿香

Huoxiang

AGASTACHIS HERBA

本品为唇形科植物藿香 *Agastache rugosus*(Fisch.et Mey.)O.Ktze.的干燥地上部分。夏、秋二季枝叶茂盛或花初开时采割，阴干，或趁鲜切段阴干。

【药材收载标准】《中国药典》1977年版一部

藿香

Huoxiang

本品为藿香的炮制加工品。

【炮制】除去杂质；未切段者，淋润，切段，干燥。

【性状】本品呈段状。茎呈方柱形。表面绿色、黄绿色或灰褐色，被柔毛，髓部白色；中空。叶片较薄，多皱缩，破碎，完整者展平后呈卵形或长卵形，上下表面深绿色、黄棕色或灰褐色，先端尖或短渐尖，基部圆形或心形，边缘有钝锯齿。可见少数穗状轮伞花序。气香而特异，味淡，微凉。

【鉴别】本品叶的表面观：表皮细胞垂周壁波状弯曲；气孔及毛茸较多，气孔直轴式。非腺毛1~4细胞，表面有疣状突起。腺鳞头部8细胞，罕为4细胞，直径60~90 μ m，柄单细胞，棕色；小腺毛头部1~2细胞，柄单细胞。

茎的横切面：表皮细胞外被角质层，并有腺毛及非腺毛。下皮厚角组织位于棱角处。皮层狭窄。中柱鞘纤维束断续排列成环，壁木化。韧皮部窄。形成层环不明显。木质部在棱角处较发达，均木化；射线宽窄不一。髓部薄壁细胞纹孔明显，有时可见细小草酸钙柱晶。

【检查】水分 不得过13.0%（《中国药典》通则0832第四法）。

【性味与归经】辛，微温。归脾、胃、肺经。

【功能与主治】祛暑解表，化湿和胃。用于暑湿感冒，胸闷，腹痛吐泻。

【用法与用量】6~12g。

【贮藏】置阴凉干燥处，防潮。

藿香

Huoxiang

AGASTACHIS HERBA

本品为唇形科植物藿香 *Agastache rugosus*(Fisch.et Mey.)O.Ktze.的干燥地上部分。夏、秋二季枝叶茂盛或花初开时采割，阴干，或趁鲜切段阴干。

【药材收载标准】《中国药典》1977年版一部

藿香叶

Huoxiangye

本品为藿香的炮制加工品。

【炮制】取净藿香，除去茎及杂质。

【性状】本品多皱缩、破碎。完整者有柄，展平后呈卵形或长卵形，上下表面深绿色、黄棕色或灰褐色，先端尖或短渐尖，基部圆形或心形，边缘有钝锯齿，质脆。可见少数穗状轮伞花序。气香而特异，味淡，微凉。

【鉴别】本品叶的表面观：表皮细胞垂周壁波状弯曲；气孔及毛茸较多。气孔直轴式。非腺毛1~4细胞，表面有疣状突起。腺鳞头部8细胞，罕为4细胞，直径60~90 μ m,柄单细胞，棕色；小腺毛头部1~2细胞，柄单细胞。

【检查】水分 不得过13.0%(《中国药典》通则0832第四法)。

【性味与归经】辛，微温。归脾、胃、肺经。

【功能与主治】祛暑解表，化湿和胃。用于暑湿感冒，胸闷，腹痛吐泻。

【用法与用量】6~12g。

【贮藏】置阴凉干燥处，防潮。

鸡矢藤

Jishiteng

PAEDERIAE HERBA

本品为茜草科植物鸡矢藤 *Paederia scandens* (Lour.) Merr. 的干燥地上部分。夏、秋二季采割，阴干。

【药材收载标准】《中国药典》1977年版一部

鸡矢藤

Jishiteng

本品为鸡矢藤的炮制加工品。

【炮制】除去杂质，洗净，切段，干燥。

【性状】本品为茎、叶混合的段。茎呈扁圆柱形，老茎外皮灰棕色，有纵皱纹，有时可见对生的叶柄断痕，嫩茎红褐色至黑褐色；质韧，切面灰白色或浅绿色，具放射状纹理和多数细孔。叶多已破碎或皱缩，两面被毛或仅下表面被毛。气特异，味甘、涩。

【检查】水分 不得过 13.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 10.0%（《中国药典》通则 2302）。

【性味与归经】甘、涩、平。归脾、胃、肝经。

【功能与主治】消食，止痛，除湿，解毒。用于脘腹痞闷，食少纳呆，湿疹，疮疡肿痛。

【用法与用量】30~60g；外用适量。

【贮藏】置通风干燥处。

蒺藜

Jili

TRIBULI FRUCTUS

本品为蒺藜科植物蒺藜 *Tribulus terrestris* L. 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采割植株，晒干，打下果实，除去杂质。

【药材收载标准】《中国药典》2020 年版一部

盐蒺藜

Yanjili

本品为蒺藜的炮制加工品。

【炮制】取净蒺藜，用盐水拌匀，闷润至盐水吸尽，照盐炙法（《中国药典》通则 0213）炒至表面颜色加深。

每 100kg 蒺藜，用食盐 2kg。

【性状】本品多为单一的分果瓣，呈斧状，长 3~6mm；背部棕黄色至棕褐色，隆起，有纵棱和瘤状突起，并有对称的长刺和短刺各 1 对，两侧面粗糙，有网纹，偶有焦斑。质坚硬。气微香，味咸、微苦、辛。

【鉴别】取本品粉末 3g，加三氯甲烷 50ml，超声处理 30 分钟，滤过，弃去三氯甲烷液，药渣挥干，加水 1ml，搅匀，加水饱和的正丁醇 50ml，超声处理 30 分钟，分取上清液，加 2 倍量的氨试液洗涤，弃去洗液，取正丁醇液，蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取蒺藜对照药材 3g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-甲醇-水（13:7:2）10 $^{\circ}$ C 以下放置的下层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，喷以改良对二甲氨基苯甲醛溶液（取对二甲氨基苯甲醛 1g，加盐酸 34ml，甲醇 100ml，摇匀，即得），在 105 $^{\circ}$ C 加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】水分 不得过 10.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 15.0%（《中国药典》通则 2302）。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

【性味与归经】辛、苦，微温；有小毒。归肝经。

【功能与主治】平肝解郁，活血祛风，明目，止痒。用于头痛眩晕，胸胁胀痛，乳闭乳痈，目赤翳障，风疹瘙痒。

【用法与用量】6~10g。

【贮藏】置干燥处，防霉。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

建 曲

Jianqu

【处方】 蓼子草 6.6g 苍耳草 6.6g 青蒿 6.6g 苦杏仁 4g 赤小豆 4g
麦芽 9g 山楂(炒) 9g 陈皮 6g 藿香 6g 苍术 6g
厚朴 3g 川木香 3g 白芷 3g 枳壳(麸炒) 3g 槟榔 3g
紫苏 6g 薄荷 3g 谷芽 9g 官桂 1.5g 香附 6g
甘草 1.5g 麦麸 21.2g 面粉 10.6g

【药材收载标准】《卫生部药品标准》中成药成方制剂第十七册

炒建曲

Chaojianqu

本品为建曲的炮制加工品。

【炮制】取净建曲，照清炒法（《中国药典》通则 0213）炒至表面深褐色，略具香气。

【性状】呈不规则块状或粗粉状，表面深褐色，略具香气。

【鉴别】取本品，置显微镜下观察：种皮表皮细胞为栅状，底面观细胞呈多角形，壁稍厚，胞腔大，内含红棕色至红色物质。内胚乳细胞多破碎，无色，纹孔较多，甚大，类圆形或矩圆形。分泌细胞类圆形，含淡黄棕色至红棕色分泌物。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。

【检查】水分 不得过 13.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

【性味与归经】辛、温，微苦。归脾、胃经。

【功能与主治】解表和中，开胃健脾，芳香化浊。用于寒热头痛，食滞阻中，胀满腹泻，食欲不振。

【用法与用量】10~15g。可用袋泡茶剂饮用。

【贮藏】置阴凉干燥处保存。

建曲

jianqu

【处方】 蓼子草 6.6g 苍耳草 6.6g 青蒿 6.6g 苦杏仁 4g 赤小豆 4g
麦芽 9g 山楂(炒) 9g 陈皮 6g 藿香 6g 苍术 6g
厚朴 3g 川木香 3g 白芷 3g 枳壳(麸炒) 3g 槟榔 3g
紫苏 6g 薄荷 3g 谷芽 9g 官桂 1.5g 香附 6g
甘草 1.5g 麦麸 21.2g 面粉 10.6g

【药材收载标准】《卫生部药品标准》中成药成方制剂第十七册

焦建曲

Jiaojianqu

本品为建曲的炮制加工品。

【炮制】取建曲，照清炒法（《中国药典》通则 0213）炒至表面深黄色，带焦斑，有焦香气。

【性状】呈不规则块状或粗粉状，表面深黄色至褐色，带焦斑，有焦香气。

【鉴别】取本品，置显微镜下观察：种皮表皮细胞为栅状，底面观细胞呈多角形，壁稍厚，胞腔大，内含红棕色至红色物质。内胚乳细胞多破碎，无色，纹孔较多，甚大，类圆形或矩圆形。分泌细胞类圆形，含淡黄棕色至红棕色分泌物。纤维束周围薄壁细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。

【性味与归经】辛、温，微苦。归脾、胃经。

【功能与主治】解表和中，开胃健脾，芳香化浊。用于寒热头痛，食滞阻中，胀满腹泻，食欲不振。

【用法与用量】10~15g。可用袋泡茶剂饮用。

【贮藏】置阴凉干燥处保存。

绞股蓝

Jiaogulan

GYNOSTEMMAE HERBA

本品为葫芦科植物绞股蓝 *Gynostemma pentaphyllum* (Thunb.) Makino 的干燥全草。夏、秋二季采收，除去杂质，洗净，晒干。

【药材收载标准】《重庆市中药材标准》

绞股蓝

Jiaogulan

本品为绞股蓝的炮制加工品。

【炮制】除去杂质，洗净，切段，干燥。

【性状】本品为茎、叶混合的段。茎纤细，直径1~3mm，表面黄绿色或褐绿色，具细纵棱线，被短柔毛或近无毛，质柔，不易折断。卷须侧生于叶柄基部。叶片多皱缩或破碎，黄绿色或褐绿色，薄纸质或膜质，完整者湿润展平后呈鸟足状，通常5~7小叶，小叶卵状长圆形或披针形，中间者较长，边缘有锯齿。气微，味苦、微甘。

【鉴别】取本品粉末2g，加乙酸乙酯20ml，超声处理30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取绞股蓝对照药材2g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则0502）试验，吸取上述两种溶液各5 μ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以三氯甲烷-甲醇（20:1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10%硫酸乙醇溶液，在105℃加热至斑点显色清晰，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光主斑点。

【检查】水分 不得过12.0%（《中国药典》通则0832 第二法）。

总灰分 不得过13.0%（《中国药典》通则2302）。

酸不溶性灰分 不得过2.0%（《中国药典》通则2302）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》通则2201）项下的热浸法测定，用稀乙醇作溶剂，不得少于12.0%。

【性味与归经】苦、甘，微寒。归脾、肺经。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

【功能与主治】益气健脾，化痰止咳，清热解毒，化浊降脂。用于脾胃气虚，倦怠食少，肺虚燥咳，咽喉疼痛等。

【用法与用量】6~10g。

【贮藏】置阴凉干燥处。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

绞股蓝

Jiaogulan

GYNOSTEMMAE HERBA

本品为葫芦科植物绞股蓝 *Gynostemma pentaphyllum* (Thunb.) Makino 的干燥全草。夏、秋二季采收，除去杂质，洗净，晒干。

【药材收载标准】《重庆市中药材标准》

绞股蓝叶

Jiaogulanye

本品为绞股蓝的炮制加工品。

【炮制】收集绞股蓝碎落的叶，除去杂质，洗净，干燥。

【性状】本品多皱缩卷曲，有的破碎。黄绿色或褐绿色，薄纸质或膜质，皱缩易碎，完整者湿润展平后呈鸟足状，通常 5~7 小叶，小叶卵状长圆形或披针形，中间者较长，边缘有锯齿。气微，味苦微甘。

【鉴别】取本品粉末 2g，加乙酸乙酯 20ml，超声处理 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取绞股蓝对照药材 2g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-甲醇（20:1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 10%硫酸乙醇溶液，在 105℃加热至斑点显色清晰，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光主斑点。

【检查】水分 不得过 12.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 13.0%（《中国药典》通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 2.0%（《中国药典》通则 2302）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，用稀乙醇作溶剂，不得少于 12.0%。

【性味与归经】苦、甘，微寒。归脾、肺经。

【功能与主治】益气健脾，化痰止咳，清热解毒，化浊降脂。用于脾胃气虚，倦怠食少，肺虚燥咳，咽喉疼痛等。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

【用法与用量】6~10g。

【贮藏】置阴凉干燥处。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

金樱子

Jinyingzi

ROSAE LAEVIGATAE FRUCTUS

本品为蔷薇科植物金樱子 *Rosa laevigata* Michx. 的干燥成熟果实。10-11 月果实成熟变红时采收，干燥，除去毛刺。

【药材收载标准】《中国药典》2020 年版一部

炒金樱子肉

Chaojinyingzirou

本品为金樱子肉的炮制加工品

【炮制】取净金樱子肉（取金樱子，略浸，润透，纵切两瓣，除去毛、核，干燥）照清炒法（《中国药典》通则 0213）炒至表面微带黑色。

【性状】本品呈倒卵形纵剖瓣，表面微带黑色，有突起的棕色小点，偶见焦斑，顶端有花萼残基，下部渐尖。内壁偶见坚硬的小瘦果，残存淡黄色绒毛。质硬。气微，味甘、微涩。

【鉴别】（1）本品粉末淡肉红色。非腺毛单细胞或多细胞，长 505~1836 μm ，直径 16~31 μm ，壁木化或微木化，表面常有螺旋状条纹，胞腔内含黄棕色物。表皮细胞多角形，壁厚，内含黄棕色物。草酸钙方晶多见，长方形或不规则形，直径 16~39 μm ，簇晶少见，直径 27~66 μm 。螺纹导管、网纹导管、环纹导管及具缘纹孔导管直径 8~20 μm 。薄壁细胞多角形，木化，具纹孔，含黄棕色物。纤维梭形或条形，黄色，长至 1071 μm ，直径 16~20 μm ，壁木化。树脂块不规则形，黄棕色，半透明。薄壁细胞多角形，木化，具纹孔，含黄棕色物。纤维梭形或条形，黄色，长至 1071 μm ，直径 16~20 μm ，壁木化。树脂块不规则形，黄棕色，半透明。

（2）取本品粉末 2g，加乙醇 30ml，超声处理 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加水 20ml 使溶解，用乙酸乙酯振摇提取 2 次，每次 30ml，合并乙酸乙酯液，蒸干，残渣加甲醇 2ml 使溶解，作为供试品溶液。另取金樱子对照药材 2g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 2 μl ，分别点 1~2mm 于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-乙酸乙酯

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

-甲醇-甲酸（5:5:1:0.1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10%硫酸乙醇溶液，在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】水分 不得过13.0%（《中国药典》通则0832第二法）。

总灰分 不得过5.0%（《中国药典》通则2302）。

【含量测定】对照品溶液的制备 取无水葡萄糖对照品适量，精密称定，加水制成每1ml中含0.6mg的溶液，即得。

标准曲线的制备 精密量取对照品溶液0.5ml、1.0ml、1.5ml、2.0ml、2.5ml，分别置于50ml量瓶中，各加水至刻度，摇匀。分别精密量取上述溶液2ml，置具塞试管中，各精密加4%苯酚溶液1ml，混匀，迅速精密加入硫酸7ml，摇匀，置40℃水浴中保温30分钟，取出，置冰水浴中放置5分钟，取出，以相应试剂为空白，照紫外-可见分光光度法（《中国药典》通则0401），在490nm的波长处测定吸光度，以吸光度为纵坐标，浓度为横坐标，绘制标准曲线。

测定法 取本品粗粉约0.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加水50ml，称定重量，静置1小时，加热回流1小时，放冷，再称定重量，用水补足减失的重量，摇匀，滤过，精密量取续滤液1ml，置100ml量瓶中，加水至刻度，摇匀，精密量取25ml，置50ml量瓶中，加水至刻度，摇匀，精密量取2ml，置具塞试管中，照标准曲线的制备项下的方法，自“各精密加4%苯酚溶液1ml起，依法测定吸光度，从标准曲线上读出供试品溶液中金樱子多糖的重量（ μg ），计算，即得。

本品按干燥品计算，含金樱子多糖以无水葡萄糖（ $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ ）计，不得少于20.0%。

【性味与归经】酸、甘、涩、平。归肾、膀胱、大肠经。

【功能与主治】固精缩尿，固崩止带，涩肠止泻。用于遗精滑精，遗尿尿频，崩漏带下，久泻久痢。增强止泻作用。

【用法与用量】6~12g。

【贮藏】置通风干燥处，防蛀。

金樱子

Jinyingzi

ROSAE LAEVIGATAE FRUCTUS

本品为蔷薇科植物金樱子 *Rosa laevigata* Michx. 的干燥成熟果实。10-11 月果实成熟变红时采收，干燥，除去毛刺。

【药材收载标准】《中国药典》2020 年版一部

盐金樱子肉

Yanjinyingzirou

本品为金樱子肉的炮制加工品。

【炮制】取净金樱子肉（取金樱子，略浸，润透，纵切两瓣，除去毛、核，干燥），照盐炙法（《中国药典》通则 0213）炒干。

每金樱子肉 100kg，用盐 2kg。

【性状】本品呈倒卵形纵剖瓣。表面红黄色或红棕色，略有焦斑，有突起的棕色小点。顶端有花萼残基，下部渐尖。花托壁厚 1~2mm，内面淡黄色至棕黄色。气微，味微咸。

【鉴别】(1) 本品粉末淡肉红色。非腺毛单细胞或多细胞，长 505~1836 μm ，直径 16~31 μm ，壁木化或微木化，表面常有螺旋状条纹，胞腔内含黄棕色物。表皮细胞多角形，壁厚，内含黄棕色物。草酸钙方晶多见，长方形或不规则形，直径 16~39 μm ；簇晶少见，直径 27~66 μm 。螺纹导管、网纹导管、环纹导管及具缘纹孔导管直径 8~20 μm 。薄壁细胞多角形，木化，具纹孔，含黄棕色物。纤维梭形或条形，黄色，长至 1071 μm ，直径 16~20 μm ，壁木化。树脂块不规则形，黄棕色，半透明。薄壁细胞多角形，木化，具纹孔，含黄棕色物。纤维梭形或条形，黄色，长至 1071 μm ，直径 16~20 μm ，壁木化。树脂块不规则形，黄棕色，半透明。

(2) 取本品粉末 2g，加乙醇 30ml，超声处理 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加水 20ml 使溶解，用乙酸乙酯振摇提取 2 次，每次 30ml，合并乙酸乙酯液，蒸干，残渣加甲醇 2ml 使溶解，作为供试品溶液。另取金樱子对照药材 2g，同法

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 2 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-乙酸乙酯-甲醇-甲酸（5:5:1:0.1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 10%硫酸乙醇溶液，在 105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】水分 不得过 13.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 7.0%（《中国药典》通则 2302）。

【含量测定】对照品溶液的制备 精密称取经 105℃干燥至恒重的无水葡萄糖 60mg，置 100ml 量瓶中，加水溶解并稀释至刻度，摇匀，即得。（每 1ml 中含无水葡萄糖 0.6mg）。

标准曲线的制备 精密量取对照品溶液 0.5 ml、1.0 ml、1.5 ml、2.0 ml、2.5 ml，分别置 50ml 量瓶中，各加水至刻度，摇匀。分别精密量取上述溶液各 2ml，置具塞试管中，各加 4%苯酚溶液 1ml，混匀，迅速加入硫酸 7.0ml，摇匀，置 40℃水浴中保温 30 分钟，取出后置冰水浴中放置 5 分钟，取出，以相应试剂为空白，照紫外-可见分光光度法（《中国药典》通则 0401），在 490nm 的波长处测定吸光度，以吸光度为纵坐标，浓度为横坐标，绘制标准曲线。

测定法 取金樱子肉粗粉约 0.5g，精密称定，置锥形瓶中，精密加水 50ml，称定重量，静置 1 小时，加热回流 1 小时，放冷，再称定重量，用水补足减失的重量，摇匀，滤过，精密量取续滤液 1ml，置 100ml 量瓶中，加水至刻度，摇匀，精密量取 25ml，置 50ml 量瓶中，加水至刻度，摇匀，精密量取 2ml，置具塞试管中，照标准曲线的制备项下的方法，自“各加 4%苯酚溶液 1ml”起，依法测定吸光度，从标准曲线上读出供试品溶液中金樱子多糖的重量（ μ g），计算，即得。

按干燥品计算，含金樱子多糖以无水葡萄糖（ $C_6H_{12}O_6$ ）计，不得少于 25.0%。

【性味与归经】酸、涩、平。归肾、膀胱、大肠经。

【功能与主治】固精缩尿，涩肠止泻。用于滑精、遗精，遗尿、尿频，久泻、久痢，崩漏带下。

【用法与用量】6~12g。

【贮藏】置通风干燥处，防蛀。

苦丁茶

Kudingcha

LIGUSTRI FOLIUM

本品为木犀科植物变紫女贞 *Ligustrum Purpurascens* Yang. 或兴山蜡树 *Ligustrum henryi* Hemsl. 的干燥叶。夏季采收，除去枝、梗，加热闷透或蒸透，干燥。

【药材收载标准】《重庆市中药材标准》

苦丁茶

Kudingcha

本品为苦丁茶的炮制加工品。

【炮制】除去杂质。

【性状】本品多破碎，部分数片粘合，呈绿褐色、茶褐色或棕褐色。完整者展平后呈卵圆形、卵状披针形或类圆形，长3~5cm，宽1~3cm，先端渐尖或锐尖，基部楔形或近圆形。表面平滑光亮，上表面绿色，下表面灰绿色，主脉微突起。纸质或薄革质，易脆，半透明或微透明。气清香，味苦回甜。

【鉴别】（1）本品粉末灰绿色。上表皮细胞呈类方形或类多角形，气孔不定式，副卫细胞3~5个；下表皮细胞垂周壁呈波状弯曲。纤维成束，微木化，壁较厚，纹孔不明显。非腺毛壁厚，多碎断。

（2）取本品粉末0.5g，精密称定，加甲醇-25%盐酸溶液（4:1）混合液25ml，加热回流30分钟，立即冷却，加甲醇25ml，摇匀，经0.45 μ m微孔滤膜滤过，作为供试品溶液。另取槲皮素对照品，加甲醇制成每1ml含20 μ g的溶液，作为对照品溶液。照液相色谱法（《中国药典》通则0512）试验，以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以甲醇-0.4%磷酸溶液（50:50）为流动相；检测波长为360nm。分别吸取上述对照品溶液与供试品溶液各10 μ l，注入液相色谱仪。供试品色谱中应呈现与对照品色谱峰保留时间相同的色谱峰。

【检查】水分 不得过11.0%（《中国药典》通则0832第二法）。

总灰分 不得过9.0%（《中国药典》通则2302）。

酸不溶性灰分 不得过3.0%（《中国药典》通则2302）。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，用稀乙醇为溶剂，不得少于 40.0%。

【性味归经】甘、苦，凉。归肝、胆、胃经。

【功能与主治】清头目，解暑热。用于暑热烦渴，头痛，目赤。

【用法与用量】3~10g。常沸水泡服。

【注意】虚寒者忌用。

【贮藏】置干燥处，防霉。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

灵芝

Lingzhi

GANODERMA

本品为多孔菌科真菌赤芝 *Ganoderma lucidum* (Leyss. Ex Fr.) Karst. 或紫芝 *Ganoderma sinense* Zhao, Xu et Zhang 的干燥子实体。全年采收，除去杂质，剪除附有朽木、泥沙或培养基质的下端菌柄，阴干或在 40~50℃ 烘干。

【药材收载标准】《中国药典》2020 年版一部

灵芝

Lingzhi

本品为灵芝的炮制加工品

【炮制】除去杂质，分开大小，润透，剪下菌柄，分别切片，干燥。

【性状】本品为不规则的片，菌盖切面由皮壳、菌肉及多数菌管构成，切面类白色或淡棕色。菌盖上方或上下两面均具皮壳，下面皮壳常脱落，皮壳坚硬，红褐色、黄褐色或紫褐色，有光泽，具皱纹，皮壳外常被有大量粉尘样的黄褐色孢子。菌肉淡褐色、淡棕色或锈褐色。菌柄类圆形或不规则形，表面红褐色或紫黑色，光亮，切面淡褐色至锈褐色，有的具环纹。气微香，味苦涩。

【鉴别】取本品粉末 2g，加乙醇 30ml，加热回流 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇 2ml 使溶解，作为供试品溶液。另取灵芝对照药材 2g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 4 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以石油醚（60~90℃）-甲酸乙酯-甲酸（15:5:1）的上层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】水分 不得过 14.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 3.0%（《中国药典》通则 2302）。

【浸出物】照水溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 3.0%。

【性味与归经】甘，平。归心、肺、肝、肾经。

【功能与主治】补气安神，止咳平喘。用于心神不宁，失眠心悸，肺虚咳喘，

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

虚劳短气，不思饮食。

【用法与用量】 6~12g。

【贮藏】 置干燥处，防霉，防蛀。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

灵芝孢子

Lingzhibaozi

GANODERMAE SPORA

本品为多孔菌科真菌赤芝*Ganoderma lucidum*(Leyss. ex Fr.) Karst. 或紫芝*Ganoderma sinense* Zhao. Xu et Zhang. 的干燥成熟孢子。在子实体开始弹射孢子时收集，除去杂质。

【药材收载标准】《重庆市中药材标准》

灵芝孢子

Lingzhibaozi

本品为灵芝孢子的炮制加工品。

【炮制】除去杂质。

【性状】本品呈粉末状，黄褐色至紫褐色。体轻，手捻有细腻感。气微，味淡。

【鉴别】（1）取本品，置显微镜下观察：孢子卵形或卵圆形，一端平截或微凹入，长6~12 μm ，宽4~8 μm ，具双层壁，外壁平滑，无色，内壁具疣状突起，褐色。

（2）取本品粉末2g，加乙醇30ml，超声处理30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇2ml使溶解，作为供试品溶液。另取灵芝孢子对照药材2g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则0502）试验，吸取上述两种溶液各5 μl ，分别点于同一硅胶G薄层板上，以石油醚（60~90 $^{\circ}\text{C}$ ）-甲酸乙酯-甲酸（15:5:1）10 $^{\circ}\text{C}$ 以下放置过夜的上层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光主斑点。

【检查】水分 不得过13.0%（《中国药典》通则0832第二法）。

总灰分 不得过3.0%（《中国药典》通则2302）。

【浸出物】照水溶性浸出物测定法（《中国药典》通则2201）项下的热浸法测定，不得少于5.0%。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

【性味与归经】甘、平。归心、肺、肾经。

【功能与主治】补肾益肺，养心安神，止血化痰。用于病后体虚，肾虚腰软，健忘失眠，心悸怔忡，久咳虚喘，虚劳咳血。

【用法与用量】3~6g。

【贮藏】置通风干燥处。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

六神曲

Liushenqu

【处方】辣蓼 500g 青蒿 500g 苍耳草 500g 赤小豆 100g
苦杏仁 100g 麦麸 5000g 面粉 2500g

【药材收载标准】《卫生部药品标准》中药成方制剂第 19 册

炒六神曲

Chaoliushenqu

本品为六神曲的炮制加工品。

【炮制】取净六神曲，照清炒法（《中国药典》通则 0213）炒至表面颜色加深，并具焦香气味。

【性状】本品呈不规则细小块状或粗颗粒状，表面黄色，质脆易碎，有焦香气。

【鉴别】取本品，置显微镜下观察：非腺毛单细胞，长 40~950 μ m，直径 10~30 μ m，壁厚 5~11 μ m；果皮细胞细长条形、类长方形或长多角形，壁念珠状增厚（麦麸）。种皮表皮为 1 列栅状细胞，细胞内含淡红棕色物（赤小豆）。石细胞淡黄白色或黄棕色，表面观类圆形、类多角形，纹孔大而密（苦杏仁）。

【检查】水分 不得过 13.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 8.0%（《中国药典》通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 2.0%（《中国药典》通则 2302）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的冷浸法测定，用 50%乙醇作溶剂，不得少于 15.0%。

【功能与主治】健脾和胃，消食调中。用于脾胃虚弱，饮食停滞，胸痞腹胀，呕吐泻痢，小儿食积。

【用法与用量】每次 6~12g，水煎服，或粉碎后入茶、丸、散等制剂用。

【注意】脾阴虚、胃火盛者不宜用；能落胎，孕妇宜少食。

【贮藏】置阴凉干燥处，防潮、防虫蛀。

龙 齿

Longchi

DRACONIS DENS

本品为古代哺乳动物如象类、三趾马、鹿类、犀类、牛类等牙齿化石。

【药材收载标准】《中国药典》1977年版一部

龙 齿

Longchi

本品为龙齿的炮制加工品。

【炮制】除去杂质，砸成碎块或碾成粉末。

【性状】为不规则的碎块。青灰色、暗棕色或黄白色，具有棕黄色条纹及斑点，断面不平坦或有规则的凸起棱线，具吸湿性，有粘舌感。用火烧之不炭化。气微，味淡。

【鉴别】（1）取本品粉末约 2g，滴加稀硝酸 10ml，即煮沸，将产生的二氧化碳气体通入氢氧化钙试液中，即生成白色沉淀。

（2）取【鉴别】（1）项下煮沸停止后的溶液，滤过，取滤液适量，加甲基红指示液 2 滴，用氨试液调 pH 值至中性，将中性溶液平均分成两份，一份滴加稀盐酸至恰呈酸性，加草酸铵试液，即生成白色沉淀，分离，沉淀不溶于醋酸，可溶于稀盐酸；一份加硝酸银试液，即生成浅黄色沉淀，分离沉淀，沉淀在氨试液或稀硝酸中均易溶解。

【性味与归经】甘、涩，凉。归心、肝经。

【功能与主治】镇惊安神。用于癫狂惊痫，心悸失眠。

【用法与用量】9~15g，先煎。

【贮藏】置干燥处。

龙 齿

Longchi

DRACONIS DENS

本品为古代哺乳动物如象类、三趾马、鹿类、犀类、牛类等牙齿化石。

【药材收载标准】《中国药典》1977年版一部

煅龙齿

Duanlongchi

本品为龙齿的炮制加工品。

【炮制】取净龙齿，装入耐火容器中，置无烟炉火中，武火煅至红透，取出，放凉，砸成碎块或碾成粉末。

【性状】为不规则的碎块或粉末，灰白色，无光泽。质较轻，具吸湿性，有粘舌感。气微，味淡。

【鉴别】（1）取本品粉末约2g，滴加稀硝酸10ml，即煮沸，将产生的二氧化碳气体通入氢氧化钙试液中，即生成白色沉淀。

（2）取【鉴别】（1）项下煮沸停止后的溶液，滤过，取滤液适量，加甲基红指示液2滴，用氨试液调pH值至中性，将中性溶液平均分成两份，一份滴加稀盐酸至恰呈酸性，加草酸铵试液，即生成白色沉淀，分离，沉淀不溶于醋酸，可溶于稀盐酸；一份加硝酸银试液，即生成浅黄色沉淀，分离沉淀，沉淀在氨试液或稀硝酸中均易溶解。

【性味与归经】甘、涩，凉。归心、肝经。

【功能与主治】镇惊安神。多用于失眠多梦。

【用法与用量】9~15g，先煎。

【贮藏】置干燥处。

龙胆草

Longdancao

GENTIANAE CEPHALANTHAE HERBA

本品为龙胆科植物头花龙胆 *Gentiana cephalantha* Franch. 的干燥全草。秋末、冬初采收，除去泥沙及杂质，干燥。

【药材收载标准】《重庆市中药材标准》

龙胆草

Longdancao

本品为龙胆草的炮制加工品

【炮制】除去杂质，淋润，切段，干燥。

【性状】本品呈不规则的段。表面灰褐色，粗糙，有疣状突起的茎痕和须根茎。茎紫色或黄绿色带紫晕，质脆，切面中空。叶绿色或黄绿色，多破碎，完整的叶为宽披针形或倒披针形。花绿黄色或淡蓝紫色。气微清香，茎叶味微苦，根味极苦。

【鉴别】（1）本品粉末黄褐色。木栓细胞类方形。纤维单个散在或成束。薄壁细胞类方形。导管螺旋纹、网纹，直径 5~20 μ m。

（2）取本品粉末约 0.5g，加稀乙醇 20 ml，超声处理 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加稀乙醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取龙胆苦苷对照品，加甲醇制成每 1ml 含 2mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5 μ l，分别点于同一硅胶 GF₂₅₄ 薄层板上，以乙酸乙酯-甲醇-水（20:2:1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（254 nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】水分 不得过 13.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 7.0%（《中国药典》通则 2302）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，用稀乙醇作溶剂，不得少于 15.0%。

【含量测定】照高效液相色谱法（《中国药典》通则 0512）测定。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-水（28:72）为流动相；检测波长为 254 nm。理论板数按龙胆苦苷峰计算应不低于 2000。

对照品溶液的制备 取龙胆苦苷对照品适量，精密称定，加甲醇制成每 1ml 含 50 μ g 的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品粉末（过三号筛）约 0.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入甲醇 50 ml，密塞，称定重量，浸渍 12 小时，再超声处理 45 分钟，放冷，用甲醇补足减少的重量，摇匀，用微孔滤膜（0.45 μ m）滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各 10 μ l，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含龙胆苦苷（C₁₆H₂₀O₉）不得少于 0.15%。

【性味与归经】苦，寒。归肝、胆经。

【功能与主治】清热燥湿，泻肝胆火。用于湿热黄疸，阴肿阴痒，带下，湿疹瘙痒，目赤，耳聋，肋痛，口苦，惊风抽搐。

【用法与用量】3~9g。

【贮藏】置通风干燥处。

龙 骨

Longgu

DRACONIS OS

本品为古代哺乳动物如三趾马、犀类、鹿类、牛类、象类等的骨骼化石或象类门齿的化石。前者习称“龙骨”或“土龙骨”，后者习称“五花龙骨”。

【药材收载标准】《中国药典》1977年版一部

龙 骨

Longgu

本品为龙骨的炮制加工品。

【炮制】除去杂质，刷去泥土及灰屑，砸成碎块或碾成粉末。

【性状】龙骨 为不规则的碎块或粉末。表面白色、灰白色或黄白色至淡棕色，较平滑，有的碎块具有纹理，或棕色条纹和斑点，质硬。碎断面不平坦，有的中空，或具蜂窝状小孔，具吸湿性。气微，无味。

五花龙骨 为不规则的碎块或粉末。表面具蓝灰色及红棕色深浅粗细不同的花纹。质硬而脆，易成片状剥落，吸湿强。

【鉴别】（1）取本品粉末约 2g，滴加稀硝酸 10ml，即煮沸，产生二氧化碳气；将此气通入氢氧化钙试液中，即生成白色沉淀。

（2）取【鉴别】（1）项下煮沸停止后的溶液，滤过，取滤液适量，加甲基红指示液 2 滴，用氨试液调 pH 值至中性，将中性溶液平均分成两份，一份滴加稀盐酸至恰呈酸性，加草酸铵试液，即生成白色沉淀，分离，沉淀不溶于醋酸，可溶于稀盐酸；一份加硝酸银试液，即生成浅黄色沉淀，分离沉淀，沉淀在氨试液或稀硝酸中均易溶解。

【性味与归经】涩、甘，平。归心、肝、肾、大肠经。

【功能与主治】镇心安神，平肝潜阳，收涩固脱，止血，敛疮。用于心悸怔忡，失眠健忘，惊痫癫狂，头晕目眩，自汗盗汗，遗精遗尿，崩漏带下，久泻久痢，溃疡久不收口及湿疮。

【用法与用量】10～15g；先煎，或入丸散用。外用适量，研末撒或调敷患处。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

【贮藏】置干燥处，防潮。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

龙骨

Longgu

DRACONIS OS

本品为古代哺乳动物如三趾马、犀类、鹿类、牛类、象类等的骨骼化石或象类门齿的化石。前者习称“龙骨”或“土龙骨”，后者习称“五花龙骨”。

【药材收载标准】《中国药典》1977年版一部

煅龙骨

Duanlonggu

本品为龙骨的炮制加工品。

【炮制】取净龙骨置无烟炉火中，或取净龙骨碎块，装入耐火容器内，置无烟的炉火中，武火煅烧至红透后，取出，放凉。

【性状】呈不规则碎块。暗灰白色或灰绿色，断面有的具有蜂窝状小孔，具吸湿性，质轻。气微，无味。

【鉴别】（1）取本品粉末约 2g，滴加稀硝酸 10ml，即煮沸，产生二氧化碳气；将此气通入氢氧化钙试液中，即生成白色沉淀。

（2）取【鉴别】（1）项下煮沸停止后的溶液，滤过，取滤液适量，加甲基红指示液 2 滴，用氨试液调 pH 值至中性，将中性溶液平均分成两份，一份滴加稀盐酸至恰呈酸性，加草酸铵试液，即生成白色沉淀，分离，沉淀不溶于醋酸，可溶于稀盐酸；一份加硝酸银试液，即生成浅黄色沉淀，分离沉淀，沉淀在氨试液或稀硝酸中均易溶解。

【性味与归经】涩、甘，平。归心、肝、肾、大肠经。

【功能与主治】镇心安神，平肝潜阳，收涩固脱，止血，敛疮。用于心悸怔忡，失眠健忘，惊痫癫狂，头晕目眩，自汗盗汗，遗精遗尿，崩漏带下，久泻久痢，溃疡久不收口及湿疮。

【用法与用量】10～15g；先煎，或入丸散用。外用适量，研末撒或调敷患处。

【贮藏】置干燥处，防潮。

芦竹根

Luzhugen

ARUNDINIS RHIZOMA

本品为禾本科植物芦竹 *Arundo donax* L. 的新鲜或干燥根茎。全年均可采挖，除去须根及泥沙，鲜用或趁鲜切片，干燥。

【药材收载标准】《重庆市中药材标准》

芦竹根

Luzhugen

本品为芦竹根的炮制加工品

【炮制】除去杂质；未切片者，洗净，润透，切片或段，干燥。

【性状】为不规则的块片，外皮黄白色、类白色或浅黄色，具光泽，环节上有时可见黄白色叶鞘残痕，有的可见残存的须根。横切面粗糙，有多数筋脉小点，纵切面可见众多纤维。体轻，质硬。气微，味微苦。

【鉴别】取干芦竹根粉末 1g，加氨水 1ml，搅拌均匀，静置 15 分钟。再加乙醚 25ml，摇匀，静置 30 分钟，滤过，滤液挥干。残渣加甲醇 1ml 溶解，作为供试品溶液。另取芦竹根对照药材 1g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 20 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以丙酮-正丁醇-二氯甲烷-氨水（9:1:0.5:1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365 nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同的蓝色荧光斑点。

【检查】水分 不得过 10.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 6.0%（《中国药典》通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 1.5%（《中国药典》通则 2302）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下热浸法测定，用 20%乙醇作溶剂，不得少于 18.0%。

【性味与归经】甘、苦，寒。归肺、胃经。

【功能与主治】清热泻火，止呕生津，利尿。用于热病烦渴，呕吐，高热不

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

退，小便不利等症。

【用法与用量】 15~30g。

【贮藏】 置阴凉干燥处。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

绿豆

Lüdou

PHASEOLI SEMEN

本品为豆科植物绿豆 *Phaseolus radiatus* L. 干燥成熟的种子。秋季种子成熟时采收，除去杂质，晒干。

【药材收载标准】《山东省中药材标准》2012 年版

绿豆

Lüdou

本品为绿豆的炮制加工品

【炮制】除去杂质，筛去灰屑。

【性状】呈短矩圆形，长 4~6mm。表面黄绿色或暗绿色，有光泽，种脐位于一侧上端，长约为种子的 1/3，呈白色纵向线性。种皮薄而韧，种仁黄绿色或黄白色，子叶 2 枚，肥厚。气微，嚼之有豆腥味。

【检查】水分 不得过 12.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 5.0%（《中国药典》通则 2302）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，用稀乙醇做溶剂，不得少于 10.0%。

【性味与归经】甘，凉。归心、胃经。

【功能与主治】清热解毒，消暑，利水。用于暑热烦渴，水肿，泻痢，丹毒，痈肿，解热药毒。

【用法与用量】15~30g。

【贮藏】置阴凉干燥处，防蛀，防霉。

蚂 蚁

Mayi

FORMICA

本品为蚁科昆虫棕褐沙林蚁 *Formica rufibarbis* Sinal Emery 的干燥全虫。捕捉后，用水烫死或闷死，除去杂质，晒干。

【药材收载标准】《山西省中药材中药饮片标准》第一册

蚂 蚁

Mayi

本品为蚂蚁的炮制加工品。

【炮制】除去杂质，洗净，干燥。

【性状】本品多为工蚁，工蚁体为棕褐色，头和并腹胸为黄褐色，后腹部为黑褐色，有的品种额三角区和前、中胸背部也为黑褐色，体较光亮，被白色短柔毛；体长 4.1~7.6mm，头较长，后头缘中央平直，唇基前缘圆形，中脊明显，触角细长，膝状，12 节，触角柄节超过后头缘；复眼 1 对，黑色，椭圆形，单眼 3 只，品字形排列于额顶部；并腹胸各节愈合紧密，背板缝隙清晰，前胸背板发达，中胸背板较小，有少数立毛，并腹胸节气孔长椭圆形；腹柄节为直立鳞片状，上缘圆形，侧缘薄锐，边缘有少许立毛；后腹部较短，近球形，无螫针。味微辛、咸。

【鉴别】（1）本品粉末棕褐色。体壁碎块多见，不规则形，淡褐色或黄色，具柔毛、小立毛及圆孔形凹窝，有的半透明，边缘晶莹剔透，可见网格状和横纹状纹理；少量细长条形、棍棒状碎条，有的两端呈劈缝状，具毛刺或小立毛，皮革样纹理，为足碎片；偶见束管样团块或分散半透明淡黄色肌纤维、筒形棕褐色具细柔毛的触角碎片、边缘齿刻状上颚碎块、结晶样复眼碎片、针状刺及细碎毛。

（2）取本品粉末 0.5g，加 50%乙醇 5ml，超声处理 30 分钟，滤过，取滤液 1 滴滴于滤纸上，再滴加 2%茛三酮乙醇溶液 3 滴，于 105℃加热 2~3 分钟，显蓝紫色斑点。

（3）取本品粉末 0.5g，加 50%乙醇 5ml，超声处理 30 分钟，滤过，取续滤液作为供试品溶液。另取蚂蚁对照药材 0.5g，同法制成对照药材溶液。照薄层色

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

谱法(《中国药典》通则 0502)试验, 吸取上述两种溶液各 5 μ l, 分别点于同一硅胶 G 薄层板上, 以正丁醇-甲醇-冰醋酸-水(4:1:1:1)为展开剂, 展开, 取出, 晾干, 喷以 0.5%茚三酮乙醇溶液, 在 105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中, 在与对照药材色谱相应的位置上, 显相同颜色的斑点。

【检查】杂质 不得过 6.0%(《中国药典》通则 2301)。

水分 不得过 18.0% (《中国药典》通则 0832 第二法)。

总灰分 不得过 8.0% (中国药典通则 2302)。

酸不溶性灰分 不得过 3.0% (中国药典通则 2302)。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法(《中国药典》通则 2201)项下的热浸法测定, 用 50%乙醇作溶剂, 不得少于 26.0%。

【性味与归经】咸, 平。归肝、肾经。

【功能与主治】益气补肾, 通经活络, 解毒消肿。用于风湿痹证, 关节肿胀, 疼痛, 神衰气弱。

【用法与用量】1~3g, 研末开水冲服、浸酒服或入丸、散。外用适量, 捣烂涂敷。

【贮藏】密闭, 置阴凉干燥处, 防潮、防蛀。

麻黄

Mahuang

EPHEDRAE HERBA

本品为麻黄科植物草麻黄 *Ephedra sinica* Stapf、中麻黄 *Ephedra intermedia* Schrenk et C. A. Mey. 或木贼麻黄 *Ephedra equisetina* Bge. 的干燥草质茎。秋季采割绿色的草质茎，晒干。

【药材收载标准】《中国药典》2020 年版一部

麻黄绒

Mahuangrong

本品为麻黄的炮制加工品。

【炮制】取麻黄，除去木质茎、杂质及残根，切段，碾成绒，筛去粉末。

【性状】本品呈松散轻泡的纤维绒状，黄绿色至淡绿色。气微香，味微苦、涩。

【鉴别】(1) 粉末黄绿色至淡绿色。表皮组织碎片甚多，细胞呈长方形，含颗粒状晶体；气孔特异，内陷，保卫细胞侧面观呈哑铃形或电话听筒形，角质层极厚，呈脊状突起，常破碎呈不规则条块状。纤维多而壁厚，木化或非木化，狭长，胞腔狭小，不明显，附有细小众多的砂晶和方晶。皮层薄壁细胞呈类圆形，壁薄，非木化，含多数细小颗粒状结晶。棕色块散在，棕色或红棕色，形状不规则。

(2) 取本品粉末 0.2g，加水 5ml 与稀盐酸 1~2 滴，煮沸 2~3 分钟，滤过。滤液置分液漏斗中，加氨试液数滴使呈碱性，再加三氯甲烷 5ml，振摇提取，分取三氯甲烷液，置两支试管中，一管加氨制氯化铜试液与二硫化碳各 5 滴，振摇，静置，三氯甲烷层显深黄色；另一管为空白，以三氯甲烷 5 滴代替二硫化碳 5 滴，振摇后三氯甲烷层无色或显微黄色。

(3) 取本品粉末 1g，加氨试液数滴，再加三氯甲烷 10ml，加热回流 1 小时，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇 2ml 充分振摇，滤过，滤液作为供试品溶液，另取盐酸麻黄碱对照品，加甲醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5 μ l，分别点于同

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-甲醇-浓氨试液 (20:5:0.5) 为展开剂，展开，取出，晾干，喷以茚三酮试液，在 105℃ 加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同的红色斑点。

【检查】水分 不得过 10.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 10.0%（《中国药典》通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 1.0%（《中国药典》通则 2302）。

【性味与归经】辛、微苦，温。归肺、膀胱经。

【功能与主治】发汗散寒，宣肺平喘，利水消肿。用于风寒感冒，胸闷喘咳，风水浮肿。适于气虚衰弱患者。

【用法与用量】2~10g。

【贮藏】置干燥处，防潮。

麻黄

Mahuang

EPHEDRAE HERBA

本品为麻黄科植物草麻黄 *Ephedra sinica* Stapf、中麻黄 *Ephedra intermedia* Schrenk et C. A. Mey. 或木贼麻黄 *Ephedra equisetina* Bge. 的干燥草质茎。秋季采割绿色的草质茎，晒干。

【药材收载标准】《中国药典》2020年版一部。

蜜麻黄绒

Mimahuangrong

本品为麻黄绒的炮制品。

【炮制】取炼蜜，用适量开水稀释后，加入麻黄绒拌匀，闷透，置锅内用文火加热，照蜜炙法（《中国药典》通则 0213）炒至深黄色不粘手为度，取出放凉。

每 100kg 麻黄绒，用炼蜜 25kg。

【性状】本品为松散黏结纤维绒状，深黄色，有蜜香气，味微甜。

【鉴别】（1）粉末深黄色。表皮组织碎片甚多，细胞呈长方形，含颗粒状晶体；气孔特异，内陷，保卫细胞侧面观呈哑铃形或电话听筒形，角质层极厚，呈脊状突起，常破碎呈不规则条块状。纤维多而壁厚，木化或非木化，狭长，胞腔狭小，不明显，附有细小众多的砂晶和方晶。皮层薄壁细胞呈类圆形，壁薄，非木化，含多数细小颗粒状结晶。棕色块散在，棕色或红棕色，形状不规则。

（2）取本品粉末 0.2g，加水 5ml 与稀盐酸 1~2 滴，煮沸 2~3 分钟，滤过。滤液置分液漏斗中，加氨试液数滴使呈碱性，再加三氯甲烷 5ml，振摇提取，分取三氯甲烷液，置两支试管中，一管加氨制氯化铜试液与二硫化碳各 5 滴，振摇，静置，三氯甲烷层显深黄色；另一管为空白，以三氯甲烷 5 滴代替二硫化碳 5 滴，振摇后三氯甲烷层无色或显微黄色。

（3）取本品粉末 1g，加氨试液数滴，再加三氯甲烷 10ml，加热回流 1 小时，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇 2ml 充分振摇，滤过，滤液作为供试品溶液，另取盐酸麻黄碱对照品，加甲醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-甲醇-浓氨试液(20:5:0.5)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以茚三酮试液，在 105 $^{\circ}$ C 加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同的红色斑点。

【检查】水分 不得过 14.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 9.0%（《中国药典》通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 1.0%（《中国药典》通则 2302）。

【性味与归经】辛、微苦，温。归肺、膀胱经。

【功能与主治】润肺止咳，宣肺平喘。用于表邪已解，胸闷喘咳。

【用法与用量】2~10g。

【贮藏】置阴凉干燥处，防潮。

马兰草

Malancao

KALIMERIS INSICAE HERBA

本品为菊科植物马兰（*Kalimeris indica* (L.) Schulz-Bip.）的干燥全草的炮制加工品。

【药材收载标准】《中国药品》1977年版一部

马兰草

Malancao

【炮制】除去杂质，淋润，切段，干燥。

【性状】本品为根、根茎、茎、叶及花的混合段。根及根茎圆柱形，表面浅棕黄色，具须根痕。茎类圆柱形，直径1~3mm，切面黄白色，中间有髓，表面灰绿色或紫褐色，略具细纵纹。叶绿色，皱缩卷曲，多破碎，完整者展平边缘有疏粗齿或羽状浅裂。偶见头状花序，瘦果倒卵状长圆形，扁平，有毛。气微、味淡。

【性味与归经】辛、苦，平。归胃、肠经。

【功能与主治】理气，消食，清利湿热。用于胃脘胀痛，风寒咳嗽，痢疾，水泻，尿路感染。

【用法与用量】9~30g。

【贮藏】置通风干燥处。

满天星

Mantianxing

HYDROCOTYLES HERBA

本品为伞形科植物天胡荽 *Hydrocotyle sibthorpioides* Lamarck 的干燥全草。
夏、秋 二季采收，除去杂质，洗净，干燥。

【药材收载标准】《重庆市中药材标准》

满天星

Mantianxing

本品为满天星的炮制加工品。

【炮制】除去杂质，淋润，切段，干燥。

【性状】本品呈小段。根呈细圆柱形，外表面淡黄色或灰黄色。茎细长弯曲，黄绿色或淡棕色，节处残留细根或根痕。叶多皱缩或破碎，完整叶片展平后呈圆形或近肾形，掌状 5~7 浅裂或裂至叶片中部，淡绿色，叶柄扭曲状。可见伞形花序及双悬果。气香，味淡。

【鉴别】粉末淡棕绿色。非腺毛呈短角状或长角状锥形，长可达 600 μm ，由 10 数个至数十个细胞组成，排成多列，亦可见由 2~4 个细胞组成、排成单列的小非腺毛。上表皮细胞垂周壁弯曲，直径 27~58 μm ，下表皮细胞壁薄亦弯曲，直径 14~20 μm ，长 18~24 μm 。气孔不定式、平轴式或直轴式。

【检查】水分 不得过 13.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 16.0%（《中国药典》通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 4.0%（《中国药典》通则 2302）。

【浸出物】照水溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 13.0%。

【性味与归经】微苦、辛，凉。归脾、胆、肾经。

【功能与主治】清热利湿，解毒消肿。用于黄疸，痢疾，水肿，淋症，目翳，喉肿，痈肿疮毒，带状疱疹，跌打损伤。

【用法与用量】9~15g；外用适量。

【贮藏】置阴凉干燥处。

木 耳

Muer

FRUCTIFICATIO AURICULARIAE

本品为木耳科真菌木耳 *Auricularia anricula* (L.ex Hook.)Underw. 的干燥子实体。

【药材收载标准】《卫生部药品标准》中药材第一册

木 耳

Muer

本品为木耳的加工炮制品。

【炮制】 除去泥沙、杂质。

【性状】 本品呈不规则块片，多卷缩，大小不等。表面平滑，黑褐色或紫褐色；底面色较淡，质脆，易折断，以水浸泡则膨胀，色泽转淡，呈棕褐色，柔润而微透明，表面有滑润的粘液。气微香。

【检查】 水分 不得过 19.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 6.0%（《中国药典》通则 2302）。

【性味与归经】 甘，平。入胃、大肠经。

【功能与主治】 益气强身，活血，止血，舒筋活络。用于崩中漏下，产后虚弱，抽筋麻木，腰腿疼痛。

【用法与用量】 15～50g；或研末服。

【注意】 大便不实者忌。

【贮藏】 置阴凉干燥处，防潮。

牛尾独活

Niuweiduhuo

HERACLEI RADIX ET RHIZOMA

本品为伞形科植物短毛独活 *Heracleum moellendorffii* Hance.、渐尖叶独活 *Heracleum acuminatum* Fr. 或独活 *Heracleum hemsleyanum* Diels. 的干燥根及根茎。春初苗刚发芽或秋末茎叶枯萎时采挖，除去须根及泥沙，干燥。

【药材收载标准】《重庆市中药材标准》

牛尾独活

Niuweiduhuo

本品为牛尾独活的炮制加工品。

【炮制】除去杂质，洗净，润透，切片，干燥。

【性状】本品呈类圆形或不规则形的片，外表面灰棕色至棕褐色，有的可见密集环纹或茎叶残基；有的具不规则的皱纹及隆起横长皮孔，或须根痕。体轻，切面皮部黄白色至浅棕色，散有细小棕色油点，木部黄白色，有的有髓。香气特异，味苦、微辛。

【鉴别】本品粉末灰黄色至灰褐色。淀粉粒众多，多单粒，圆形或类圆形，脐点点状，复粒3~4分粒组成。分泌道长条形或长带状，可见数个油管并列或相连，单个油管直径12~75 μ m，黄棕色，有的破碎。纤维呈束，较多，壁厚，直径10~17 μ m，纹孔较密，木化。导管多为网纹，直径45~118 μ m，亦见梯纹或螺旋纹。

【检查】水分 不得过12.0%（《中国药典》通则0832 第二法）。

总灰分 不得过7.0%（《中国药典》通则2302）。

酸不溶性灰分 不得过2.0%（《中国药典》通则2302）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》通则2201）项下的热浸法测定，用稀乙醇作溶剂，不得少于22.0%。

【性味与归经】辛、苦，微温。归肺、肝经。

【功能与主治】祛风除湿，通痹止痛。用于风寒湿痹，腰膝疼痛，少阴伏风

头痛。

【用法与用量】 3~9g。

【贮藏】 置通风干燥处，防霉、防蛀。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

蒲黄

Puhuang

TYPHAE POLLEN

本品为香蒲科植物水烛香蒲 *Typha angustifolia* L.、东方香蒲 *Typha orientalis* Presl 或同属植物的干燥花粉。夏季采收蒲棒上部的黄色雄花序，晒干后碾轧，筛取花粉。

【药材收载标准】《中国药典》2020年版一部

炒蒲黄

Chaopuhuang

本品为蒲黄的炮制加工品。

【炮制】除去杂质，照清炒法（《中国药典》通则 0213）炒至黄褐色。

【性状】本品为黄褐色粉末。体轻，放水中则飘浮水面。手捻有滑腻感，易附着手指上。气微，味淡。

【鉴别】（1）本品粉末黄褐色。花粉粒类圆形或椭圆形，直径 17~29 μ m，表面有网状雕纹，周边轮廓线光滑，呈凸波状或齿轮状，具单孔，不甚明显。

（2）取本品粉末 2g，加 80%乙醇 50ml，冷浸 24 小时，滤过，滤液蒸干，残渣加水 5ml 使溶解，滤过，滤液加水饱和的正丁醇提取 2 次，每次 5ml，合并提取液，蒸干，残渣加乙醇 2ml 使溶解，作为供试品溶液。另取异鼠李素-3-O-新橙皮苷对照品、香蒲新苷对照品，加乙醇分别制成每 1ml 各含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取供试品溶液 5 μ l~10 μ l，对照品溶液 5 μ l，分别点于同一硅胶 GF₂₅₄ 薄层板上，以乙酸乙酯-丁酮-甲酸-水（5:3:1:1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（254nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】杂质 取本品 10g，称定重量，置七号筛中，保持水平状态过筛，左右往返，边筛边轻叩 2 分钟。取不能通过七号筛的杂质，称定重量，计算，不得过 10.0%。

水分 不得过 13.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 10.0%（《中国药典》通则 2302）。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

酸不溶性灰分 不得过 4.0%（《中国药典》通则 2302）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于 15.0%。

【含量测定】照高效液相色谱法（《中国药典》通则 0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-水（15:85）为流动相；检测波长为 254nm。理论板数按异鼠李素-3-O-新橙皮苷峰计算应不低于 5000。

对照品溶液的制备 取异鼠李素-3-O-新橙皮苷对照品适量，精密称定，加甲醇制成每 1ml 含 50 μ g 的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品约 0.5g，精密称定，置 50ml 量瓶中，加甲醇 45ml，超声处理（功率 250W，频率 20KHz）30 分钟，放冷，加甲醇至刻度，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液 10 μ l 与供试品溶液 20 μ l，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含异鼠李素-3-O-新橙皮苷（ $C_{28}H_{32}O_{16}$ ）不得少于 0.18%。

【性味与归经】甘，平。归肝、心包经。

【功能与主治】止血，化瘀，通淋。用于吐血，衄血，咯血，崩漏，外伤出血，经闭痛经，脘腹刺痛，跌扑肿痛，血淋涩痛。

【用法与用量】5~10g，包煎。外用适量，敷患处。

【注意】孕妇慎用。

【贮藏】置通风干燥处，防潮，防蛀。

蒲黄

Puhuang

TYPHAE POLLEN

本品为香蒲科植物水烛香蒲 *Typha angustifolia* L.、东方香蒲 *Typha orientalis* Presl 或同属植物的干燥花粉。夏季采收蒲棒上部的黄色雄花序，晒干后碾轧，筛取花粉。

【药材收载标准】《中国药典》2020 版一部

醋蒲黄

Cupuhuang

本品为蒲黄的炮制加工品。

【炮制】取蒲黄，除去杂质，照醋炙法（《中国药典》通则 0213）炒至表面黄褐色至棕褐色。

每 100kg 蒲黄，用醋 20kg。

【性状】本品为黄褐色至棕褐色粉末。体轻，放水中则飘浮水面。手捻有滑腻感，易附着手指上。气微，有醋味。

【鉴别】（1）本品粉末黄色。花粉粒类圆形或椭圆形，直径 17~29 μ m，表面有网状雕纹，周边轮廓线光滑，呈凸波状或齿轮状，具单孔，不甚明显。

（2）取本品 2g，加 80%乙醇 30ml，加热回流 1h，滤过，滤液蒸干，残渣加乙酸乙酯 10ml，加热使溶解，滤过，滤液浓缩至约 2ml，作为供试品溶液。另取异鼠李素对照品，加乙酸乙酯制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取供试品溶液 10 μ l~15 μ l、对照品溶液 5 μ l，分别点于同一硅胶 GF₂₅₄ 薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-甲酸（5:2:1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（254nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】杂质 取本品 10g，称定重量，置七号筛中，保持水平状态过筛，左右往返，边筛边轻叩 2 分钟。取不能通过七号筛的杂质，称定重量，计算，不

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

得过 10.0%。

水分 不得过 11.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）

总灰分 不得过 10.0%（《中国药典》通则 2302）

酸不溶性灰分 不得过 4.0%（《中国药典》通则 2302）

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于 15.0%。

【含量测定】照高效液相色谱法（《中国药典》通则 0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-0.05%磷酸溶液（15:85）为流动相；检测波长为 254nm。理论板数按异鼠李素-3-0-新橙皮苷峰计算应不低于 5000。

对照品溶液的制备 取异鼠李素-3-0-新橙皮苷对照品、香蒲新苷对照品适量，精密称定，加甲醇分别制成每 1ml 各含 50 μ g 的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品约 0.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入甲醇 50ml，称定重量，冷浸 12 小时后加热回流 1 小时，放冷，再称定重量，用甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取上述两种对照品溶液与供试品溶液各 20 μ l，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含异鼠李素-3-0-新橙皮苷（ $C_{28}H_{32}O_{16}$ ）和香蒲新苷（ $C_{34}H_{42}O_{20}$ ）的总量不得少于 0.30%。

【性味与归经】甘，平。归肝、心包经。

【功能与主治】收敛止血，化瘀，通淋。用于吐血，衄血，咯血，崩漏，外伤出血，经闭痛经，胸腹刺痛，跌扑肿痛，血淋涩痛。醋蒲黄增强活血散结止痛作用。

【用法与用量】5~10g，包煎。外用适量。

【注意】孕妇慎用。

【贮藏】置通风干燥处，防潮，防蛀。

七叶莲

Qiyelian

SCHEFLERAE CAULIS ET FOLIUM

本品为五加科植物鹅掌藤 *Schefflera arboricola* Hayata 的干燥茎叶。全年均可采收，除去杂质，洗净，可切段，干燥。

【药材收载标准】《重庆市中药材标准》

七叶莲

Qiyelian

本品为七叶莲炮制加工品。

【炮制】除去杂质，喷淋清水，稍润，切片或段，干燥。

【性状】本品为茎叶混合的片或段。茎呈圆柱形，直径 0.5~5cm，表面灰白色至棕褐色，可见纵皱纹。切面黄白色至黄褐色，髓部海绵状或中空。叶多破碎，完整者展平后长卵圆形，先端微尖，基部圆形或略尖，全缘，淡绿色至黄绿色。气微、味淡。

【鉴别】本品粉为灰白色。石细胞无色，常单个散在或成群，类方形或不规则形，壁厚，有层纹，纹孔明显。晶纤维无色或淡黄色，多散在，两端较平截。导管多见具缘纹孔、网纹及螺纹导管。草酸钙方晶散在，或存在于石细胞中。

【检查】水分 不得过 12.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）

总灰分 不得过 8.0%（《中国药典》通则 2302）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，用稀乙醇作溶剂，不得少于 10.0%。

【性味与归经】苦、甘，温。归肝、胃经。

【功能与主治】祛风除湿，活血止痛。用于风湿痹痛，头痛，牙痛，脘腹疼痛，痛经，产后腹痛，跌扑骨折，外伤出血，疮肿。

【用法与用量】10~15g；外用适量。

【贮藏】置通风干燥处。

蜻 蜓

Qingting

DRAGONFLY

本品为蜻科昆虫赤蜻蛉 *Crocothemis servillia* Drury、夏赤蜻 *Sympetrum darwinianum* Selys 及其近似种或蜓科昆虫青蜻蜓 *Aesohnophlebia* SP、碧伟蜓 *Anax parthenope julius* Brauer 的干燥成虫。夏、秋二季捕捉，闷死，干燥。

【药材收载标准】《重庆市中药材标准》

蜻 蜓

Qingting

本品为蜻蜓的炮制加工品。

【炮制】除去杂质。

【性状】整只或破碎呈不规则的碎块，头部有大型的复眼一对，左右相连，触角短小，口器发达。翅 2 对，膜质透明，翅脉呈细密的网状，多已脱落破碎。胸部有足 3 对，多已脱落，具细毛和刺。体细长，有环节。质松脆，易碎。气腥臭，味微咸。

【鉴别】取本品粉末 0.2g，加 70%乙醇 5ml，超声处理 15 分钟，滤过，滤液作为供试品溶液。取丙氨酸对照品，加 70%乙醇制成每 1ml 含 0.5mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取供试品溶液 2 μ l，对照品溶液 1 μ l，分别点于同一硅胶 G 板上，以正丁醇-冰醋酸-水（3:1:1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 2%茚三酮丙酮溶液，在 105 $^{\circ}$ C 加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】水分 不得过 14.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，用乙醇做溶剂，不得少于 8.0%。

【性味与归经】微寒、凉。归肾经。

【功能与主治】益肾强阴。用于肾虚阳痿，遗精。

【用法与用量】0.8~1.5g。

【贮藏】置阴凉干燥处，防蛀，防压。

赛谷精草

Saigujingcao

ERIOCAULI HERBA

本品为谷精草科植物谷精草 *Eriocaulon buergerianum* Koern.或白药谷精草 *Eriocaulon sieboldianum* Sieb.et Zucc.的干燥全草。秋季开花时采收，除去杂质，干燥。

【药材收载标准】《四川省中药材标准》2010年版

赛谷精草

Saigujingcao

本品为赛谷精草的炮制加工品。

【炮制】除去杂质，稍润，切段，干燥。

【性状】本品为段状。有时可见不完整须根。完整的叶长披针状条形，宽3~6mm；或狭条形，宽1~2mm。花葶纤细，有数条扭曲的棱线。头状花序顶生，近半球形，直径4~6mm，底部有苞片层层紧密排列，上部边缘密生白色短毛；或卵圆形，直径2~4mm，灰黄色或灰褐色。破碎花序可见多数黑色或黄白色花药及细小黄绿色未成熟果实。质柔软，气微，味淡。

【鉴别】本品粉末黄绿色。叶表皮细胞类长方形，排列紧密，含颗粒状的硅质体，气孔平轴式，较密，下沉。导管螺纹、网纹。腺毛头部长椭圆形，1~4个细胞，顶端细胞较长；柄单细胞。非腺毛甚长，多数弯曲，2~4个细胞。花茎表皮细胞表面观长条形，表面观有纵直角质纹理。果皮细胞表面观类多角形，垂周壁串珠状增厚。花粉粒类圆形。

【检查】水分 不得过10.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过16.5%（《中国药典》通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过10.0%（《中国药典》通则 2302）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于3.0%。

【性味与归经】辛、甘，平。归肝、肺经。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

【功能与主治】疏风散热，明目退翳。用于风热目赤，肿痛畏光，眼生翳膜，风热头痛。

【用法与用量】5~10g。

【贮藏】置通风干燥处。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

山乌龟

Shanwugui

STEPHANIAE RADIX

本品为防己科植物广西地不容 *Stephania kwangsiensis* H. S. Lo、小花地不容 *Stephania micrantha* H. S. Lo. et M. Yang 及近似种的干燥块根。全年均可采收，以秋季采挖者为佳。除去须根，洗净，切片或块，干燥。

【药材收载标准】《重庆市中药材标准》

山乌龟

Shanwugui

本品为山乌龟炮制加工品。

【炮制】除去杂质；未切片者，润至透心，切片，干燥。

【性状】本品为不规则的类圆形片或不规则片，稍卷曲，表面灰褐色至棕褐色，有粗糙的皱纹或不规则的龟壳状裂纹。切面暗黄色或淡黄色，可见维管束呈点状突起，排列成同心环或不规则状。质硬而脆，易折断，粉性。气微，味苦。

【鉴别】（1）本品粉末灰黄色至黄棕色；淀粉粒甚多，单粒类圆形、半圆形、卵形或不规则圆形，脐点不明显，或点状、人字状，复粒由 2~10 分粒组成；石细胞类方形、长方形、椭圆形、长卵形或不规则形；导管多为网纹导管。

（2）取本品粉末 1g，加甲醇 20ml，超声处理 30 分钟，滤过，蒸干，残渣加甲醇 5ml 使溶解，作为供试品溶液。另取盐酸巴马汀对照品，加甲醇制成每 1ml 含 0.05mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-无水乙醇-浓氨试液（9:2:0.5）为展开剂，置于浓氨试液预饱和 20 分钟的展开缸内，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】水分 不得过 13.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 8.0%（《中国药典》通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 2.0%（《中国药典》通则 2302）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

测定，用稀乙醇作溶剂，不得少于 15.0%。

【性味与归经】苦、辛，寒；小毒。归胃、肝经。

【功能与主治】清热解毒，散瘀止痛。用于胃痛，神经痛，牙痛，跌扑损伤，毒蛇咬伤，疮疖肿痛，放疗引起的白细胞减少症。

【用法与用量】3~6g；外用适量。

【注意】孕妇慎服。

【贮藏】置通风干燥处，防霉。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

山羊角

Shanyangjiao

CAPRAE HIRCI CORNU

本品为牛科动物山羊 *Capra hircus* Linnaeus 的角。宰杀后锯取其角，晒干。

【药材收载标准】《甘肃省中药材标准》2009 年版

山羊角

Shanyangjiao

本品为山羊角的炮制加工品。

【炮制】洗净，除去角塞。

【性状】本品呈扭曲的长锥形，略呈弓形，一面较平或略向内凹，一面凸起，长 15~30cm，基部直径约 3~5cm。表面棕色、棕黑色、淡棕色或黄棕色。先端具纵纹或纵裂纹。自基部向上有 7~15 个较密集的波状环脊，脊间距约 0.5cm。角鞘黑色、棕黄色或类白色，角质。质坚硬。气微腥，味淡。

【性味与归经】咸，寒。归肝、心经。

【功能与主治】清热，镇惊，明目，解毒。用于小儿惊痫，高热神昏，风热头痛，烦躁失眠，惊悸，青盲，痈肿疮毒。

【用法与用量】15~25g。磨粉，或入成药，或烧灰研磨调敷。

【贮藏】置阴凉干燥处，防虫蛀。

山枝仁

Shanzhiren

PITTOSPORI SEMEN

本品为海桐花科植物海金子 *Pittosporum illicioides* Mak. 或皱叶海桐 *Pittosporum crispulum* Gagnep. 的干燥种子。秋后果实成熟时采收，除去果壳及杂质，干燥。

【药材收载标准】《重庆市中药材标准》

山枝仁

Shanzhiren

本品为山枝仁的炮制加工品。

【炮制】除去杂质。

【性状】本品呈不规则的多面体，直径3~6mm。表面红褐色或橙红色，久贮后则颜色加深，微显颗粒性，带油润光泽。一侧可见黑色点状微凹入的种脐。质硬，不易粉碎。破开后可见胚乳乳白色。气微，味涩、微苦。

【鉴别】(1)本品粉末呈橙黄色。种皮表皮细胞表面观呈多角形，排列整齐，有的其平周壁可见平行的微波状纹理，偶见色素颗粒。色素层细胞类圆形，内含脂肪油滴和色素颗粒。胚乳细胞多见，壁厚，呈破碎的块状或团块状，胞腔内含脂肪油滴和糊粉粒。

(2)取本品粉末2g，加石油醚(30~60℃)40ml，超声处理15分钟，滤过，弃去滤液，残渣重复处理一次，挥干，残渣加乙酸乙酯30ml，加热回流30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取槲皮素对照品，加甲醇制成每1ml含1.5mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(《中国药典》通则0502)试验，吸取供试品溶液10 μ l及对照品溶液5 μ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-甲酸(5:4:1)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以3%三氯化铝试液显色，置紫外光灯(365nm)检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】水分 不得过14.0%(《中国药典》通则0832第二法)。

总灰分 不得过5.0%(《中国药典》通则2302)。

酸不溶性灰分 不得过1.0%(《中国药典》通则2302)。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法(《中国药典》通则2201)项下的热浸法测定，用稀乙醇做溶剂，不得少于16.0%。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

【性味与归经】苦、寒。归肺、脾、大肠经。

【功能与主治】清热利咽，涩肠固精，收敛止泻。用于咽痛，痢疾，肠炎，带下病，滑精。

【用法与用量】5~9g。

【贮藏】置阴凉通风干燥处，防蛀。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

山枝仁

Shanzhiren

PITTOSPORI SEMEN

本品为海桐花科植物海金子 *Pittosporum illicioides* Mak. 或皱叶海桐 *Pittosporum crispulum* Gagnep. 的干燥种子。秋后果实成熟时采收，除去果壳及杂质，干燥。

【药材收载标准】《重庆市中药材标准》

炒山枝仁

Chaoshanzhiren

本品为山枝仁的炮制加工品。

【炮制】取净山枝仁，照清炒法（《中国药典》通则 0213）炒至有爆裂声。

【性状】本品呈不规则的多面体，直径 3~6mm。表面暗红褐色，略有焦斑。一侧可见黑色点状微凹入的种脐。质硬，不易粉碎。破开后可见胚乳乳白色。气微香，味涩、微苦。

【检查】水分 不得过 14.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 5.0%（《中国药典》通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 1.0%（《中国药典》通则 2302）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，用稀乙醇做溶剂，不得少于 16.0%。

【性味与归经】苦、寒。归肺、脾、大肠经。

【功能与主治】清热利咽，涩肠固精，收敛止泻。用于咽痛，痢疾，肠炎，带下病，滑精。

【用法与用量】5~9g。

【贮藏】置通风干燥处。

石见穿

Shijianchuan

SALVIAE CHINENSIS HERBA

本品为唇形科植物华鼠尾草 *Salvia chinensis* Benth. 的干燥地上部分。夏、秋二季花期采割，干燥。

【药材收载标准】《重庆市中药材标准》

石见穿

Shijianchuan

本品为石见穿的炮制加工品。

【炮制】除去杂质，喷淋清水，稍润，切段，干燥。

【性状】本品呈不规则的段，表面灰绿色至暗紫色，被白色柔毛。茎方形，有纵棱，直径 0.1~0.4cm，质脆，易折断，断面髓部黄白色。叶多卷曲，破碎。气微，味微苦、涩。

【鉴别】（1）本品叶的表面观：上表皮细胞多角形，垂周壁略呈连珠状增厚。下表皮细胞垂周壁波状弯曲。上下表皮均有角质线纹。气孔直轴式或不定式。腺鳞，头部 4 细胞，直径 30~40 μm ，柄单细胞。非腺毛 1~10 细胞，壁有疣状突起。

（2）取本品粉末 1g，加甲醇 20ml，超声处理 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取石见穿对照药材 1g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5 μl ，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-冰醋酸（14：4：0.5）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 10%硫酸乙醇溶液，在 105 $^{\circ}\text{C}$ 烘至斑点显色清晰。置紫外灯（365nm）下检视，供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】水分 不得过 15.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 12.0%（《中国药典》通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 3.0%（《中国药典》通则 2302）。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于 3.0%。

【性味与归经】辛、苦，微寒。归肝、脾经。

【功能与主治】活血化瘀，清热利湿，散结消肿。用于闭经，痛经，月经不调，跌打损伤，湿热黄疸，淋症，带下，泻痢，疮痈肿痛。

【用法与用量】9~15g。外用适量，捣烂敷患处。

【贮藏】置通风干燥处。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

锁 阳

Suoyang

CYNOMORII HERBA

本品为锁阳科植物锁阳 *Cynomorium songaricum* Rupr. 的干燥肉质茎。春季采挖，除去花序，切段，晒干。

【药材收载标准】《中国药典》2020 年版一部

酒 锁 阳

Jiusuoyang

本品为锁阳的炮制加工品。

【炮制】取锁阳，除去杂质，洗净，置适宜容器内，加黄酒拌匀，闷至锁阳基本吸尽黄酒，蒸或炖至透心，取出，稍晾，切厚片，拌入余下未吸尽的黄酒，干燥，筛去药屑、碎渣。

每 100kg 锁阳，用黄酒 20kg。

【性状】本品为不规则的厚片，棕色或棕褐色至棕黑色，略显油润。切面浅棕色或棕褐色，散在黄色三角状维管束。具酒香气，味甘而涩。

【鉴别】（1）本品粉末棕褐色。淀粉粒极多，常存在于含棕色物的薄壁细胞中，或包埋于棕色块中；单粒类球形或椭圆形，直径 4~32 μm ，脐点十字状、裂缝状或点状，大粒层纹隐约可见。栓内层细胞淡棕色，表面观呈类方形或类长方形，壁多细波状弯曲，有的表面有纹理。导管黄棕色或近无色，主为网状导管，也有螺纹导管，有的导管含淡棕色物。棕色块性状不一，略透明，常可见圆孔状腔隙。

（2）取本品粉末 1g，加水 10ml，浸渍 30 分钟，滤过，取滤液作为供试品溶液。另取脯氨酸对照品，加水制成每 1ml 含 2mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取两种溶液各 5 μl ，分别点于同一硅胶 H 薄层板上，以正丙醇-冰醋酸-乙醇-水（4:1:1:2）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以茚哚醌试液，晾干，在 100 $^{\circ}\text{C}$ 加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

（3）取本品粉末 1g，加乙酸乙酯 20ml，超声处理 30 分钟，滤过，滤液浓缩至 1ml，作为供试品溶液。另取熊果酸对照品，加甲醇制成每 1ml 含 0.5mg 的

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取供试品溶液 10 μ l、对照品溶液 4 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-甲酸（20:4:0.5）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 10%硫酸乙醇溶液，加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同的紫红色斑点。

【检查】水分 不得过 12.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 9.0%（《中国药典》通则 2302）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于 12.0%。

【性味与归经】甘，温。归肝、肾、大肠经。

【功能与主治】补肾阳，益精血，润肠通便。用于肾阳不足，精血亏虚，腰膝痿软，阳痿滑精，肠燥便秘。

【用法与用量】5~10g。

【贮藏】置通风干燥处。

台 乌

Taiwu

LINDERAE FRAGRANTIS RADIX

本品为樟科植物香叶子 *Lindera fragrans* Oliv. 的干燥块根。秋末至初春采挖，除去细根，洗净，干燥或趁鲜切片，干燥。

【药材收载标准】《重庆市中药材标准》

台 乌

Taiwu

【炮制】除去杂质；未切片者，除去杂质及须根，洗净，润透，切片，干燥。

【性状】本品呈类圆形或类椭圆形的片。表面棕褐色或黄褐色，有的可见纵皱纹及须根脱落的痕迹。切面类黄色或淡黄棕色，射线放射状，可见淡棕色环纹，质脆。气香，味微辛、苦。

【鉴别】取本品粉末 1g，加石油醚（30~60℃）30ml，振摇 10 分钟，滤过，滤液挥干，残渣加乙酸乙酯 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取乌药醚内酯对照品，加乙酸乙酯制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯（15：1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 1%香草醛硫酸溶液，在 105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】水分 不得过 12.0%（《中国药典》通则 0832 第四法）。

总灰分 不得过 5.0%（《中国药典》通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 3.0%（《中国药典》通则 2302）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，用 70%乙醇作为溶剂，不得少于 10.0%。

【性味与归经】辛，温。归肺、脾、肾、膀胱经。

【功能与主治】顺气止痛，温肾散寒。用于胸腹胀痛，气逆喘急，膀胱虚冷，遗尿尿频，疝气，痛经。

【用法与用量】4.5~9g。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

【贮藏】置阴凉干燥处，防蛀。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

藤梨根

Tengligen

ACTINIDIAE CHINENSIS RADIX

本品为猕猴桃科植物中华猕猴桃 *Actinidia chinensis* Planch. 的干燥根。春、秋二季采挖，洗净，或切成块、片，晒干。

【药材收载标准】《中国药典》1977年版一部

藤梨根

Tengligen

本品为猕猴桃根的炮制加工品。

【炮制】除去杂质；或除去杂质，劈成小块。

【性状】本品为不规则的块片。外皮棕褐色或灰棕色，具纵沟及横裂纹。切面皮部棕褐色，有白色结晶状物，木部淡棕色，有多数小孔。质坚硬。气微，味淡、微涩。

【鉴别】本品粉末淡棕色。草酸钙针晶甚多，成束或散在，长43~208 μm ，直径2~4 μm 。淀粉粒单粒类圆形，脐点点状或裂缝状，直径3~16 μm ；复粒由2~4粒组成。石细胞类方形、类圆形或梭形，直径28~96 μm 。具缘纹孔及网纹导管直径20~804 μm 。木栓细胞多角形，棕黄色。

【检查】总灰分 不得过6.0%（《中国药典》通则2302）。

酸不溶性灰分 不得过1.0%（《中国药典》通则2302）。

【性味】苦、涩，凉。

【功能与主治】清热解毒，活血散结，祛风利湿。用于风湿性关节炎，淋巴结核，跌扑损伤，痈疔。

【用法与用量】30~60g。

【贮藏】置干燥处，防蛀。

天麻

Tianma

GASTRODIAE RHIZOMA

本品为兰科植物天麻 *Gastrodia elata* Bl.的干燥块茎。立冬后至次年清明前采挖，立即洗净，蒸透，敞开低温干燥。

【药材收载标准】《中国药典》2020年版一部

天麻

Tianma

本品为天麻的炮制加工品。

【炮制】除去杂质。

【性状】本品呈椭圆形或长条形，略扁，皱缩而稍弯曲，长3~15cm，宽1.5~6cm，厚0.5~2cm，表面黄白色至黄棕色，有纵皱纹及由潜伏芽排列而成的横环纹多轮，有时可见棕褐色菌索。顶端有红棕色至深棕色鹦嘴状的芽或残留茎基；另端有圆脐形疤痕。质坚硬，不易折断，断面较平坦，黄白色至淡黄棕色，角质样。气微，味甘。

【鉴别】（1）本品横切面：表皮有残留，下皮由2~3列切向延长的栓化细胞组成。皮层为10数列多角形细胞，有的含草酸钙针晶束。较老块茎皮层与下皮相接处有2~3列椭圆形厚壁细胞，木化，纹孔明显。中柱占绝大部分，有小型周韧维管束散在；薄壁细胞亦含草酸钙针晶束。

粉末黄白色至黄棕色。厚壁细胞椭圆形或类多角形，直径70~180 μ m，壁厚3~8 μ m，木化，纹孔明显。草酸钙针晶成束或散在，长25~75（93） μ m。用醋酸甘油水装片观察含糊化多糖类物的薄壁细胞无色，有的细胞可见长卵形、长椭圆形或类圆形颗粒，遇碘液显棕色或淡棕紫色。螺纹导管、网纹导管及环纹导管直径8~30 μ m。

（2）取本品粉末0.5g，加70%甲醇5ml，超声处理30分钟，滤过，取滤液作为供试品溶液。另取天麻对照药材0.5g，同法制成对照药材溶液。再取天麻素对照品，加甲醇制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则0502）试验，吸取供试品溶液10 μ l、对照药材溶液及对照品溶液各5 μ l，

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

分别点于同一硅胶G薄层板上，以乙酸乙酯-甲醇-水（9:1:0.2）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10%磷钼酸乙醇溶液，在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

（3）取对羟基苯甲醇对照品，加乙醇制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则0502）试验，吸取〔鉴别〕（2）项下供试品溶液10 μ l、对照药材溶液及上述对照品溶液各5 μ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以石油醚（60~90℃）-乙酸乙酯（1:1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10%磷钼酸乙醇溶液，在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】水分 不得过 15.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 4.5%（《中国药典》通则 2302）。

二氧化硫残留量 照二氧化硫残留量测定法（《中国药典》通则 2331）测定，不得过 400mg/kg。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，用稀乙醇作溶剂，不得少于 15.0%。

【含量测定】照高效液相色谱法（《中国药典》通则 0512）测定。

色谱条件与系统适应性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-0.05%磷酸溶液（3:97）为流动相；检测波长为220nm。理论板数按天麻素峰计算应不低于5000。

对照品溶液的制备 取天麻素对照品、对羟基苯甲醇对照品适量，精密称定，加乙腈-水（3:97）混合溶液制成每1ml含天麻素50 μ g、对羟基苯甲醇25 μ g的混合溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品粉末（过三号筛）约2g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入稀乙醇50ml，称定重量，超声处理（功率120W，频率40kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用稀乙醇补足减失的重量，滤过，精密量取续滤液10ml，浓缩至近干无醇味，残渣加乙腈-水（3:97）混合溶液溶解，转移至25ml量瓶中，用乙腈-水（3:97）混合溶液稀释至刻度，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各5 μ l，注入液相色谱仪，测定，即得。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

本品按干燥品计算，含天麻素（ $C_{13}H_{18}O_7$ ）和对羟基苯甲醇（ $C_7H_8O_2$ ）的总量不得少于0.25%。

【性味与归经】甘，平。归肝经。

【功能与主治】息风止痉，平抑肝阳，祛风通络。用于小儿惊风，癫痫抽搐，破伤风，头痛眩晕，手足不遂，肢体麻木，风湿痹痛。

【用法与用量】3~10g。

【贮藏】置通风干燥处，防蛀。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

五味子

Wuweizi

SCHISANDRAE CHINENSIS FRUCTUS

本品为木兰科植物五味子 *Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill. 的干燥成熟果实。习称“北五味子”。秋季果实成熟时采摘，晒干或蒸后晒干，除去果梗和杂质。

【药材收载标准】《中国药典》2020 年版一部

酒五味子

Jiuwuweizi

本品为五味子的炮制加工品。

【炮制】取净五味子，用黄酒拌匀，蒸至透心，干燥。用时捣碎。

每 100kg 五味子，用黄酒 10kg。

【性状】本品呈不规则的球形或扁球形。表面紫黑色或黑褐色，皱缩，显油润，稍有光泽。种子 1~2 枚，肾形，表面棕黄色，有光泽，种皮薄而脆。果肉微具酒气，味酸；种子破碎后，有香气，味辛、微苦。

【鉴别】(1) 本品粉末棕红色。种皮表皮石细胞表面观呈多角形或长多角形，直径 18~50 μm ，壁厚，孔沟极细密，胞腔内含深棕色物。种皮内层石细胞呈多角形、类圆形或不规则形，直径约至 83 μm ，壁稍厚，纹孔较大。果皮表皮细胞表面观类多角形，垂周壁略呈连珠状增厚，表面有角质线纹；表皮中散有油细胞。中果皮细胞皱缩，含暗棕色物，并含淀粉粒。

(2) 取本品粉末 1g，加三氯甲烷 20ml，加热回流 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加三氯甲烷 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取五味子对照药材 1g，同法制成对照药材溶液。再取五味子甲素对照品，加三氯甲烷制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取上述三种溶液各 2 μl ，分别点于同一硅胶 GF₂₅₄ 薄层板上，以石油醚（30~60 $^{\circ}\text{C}$ ）-甲酸乙酯-甲酸（15:5:1）的上层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（254nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】水分 不得过 16.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 7.0%（《中国药典》通则 2302）。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于 35.0%。

【含量测定】 照高效液相色谱法（《中国药典》通则 0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-水（65:35）为流动相；检测波长为 250nm。理论板数按五味子醇甲峰计算应不低于 2000。

对照品溶液的制备 取五味子醇甲对照品适量，精密称定，加甲醇制成每 1ml 含五味子醇甲 50 μ g 的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品粉末（过三号筛）约 0.25g，精密称定，置 25ml 量瓶中，加甲醇约 18ml，超声处理（功率 250W，频率 20KHz）20 分钟，取出，加甲醇至刻度，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各 10 μ l，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品含五味子醇甲（C₂₄H₃₂O₇）不得少于 0.40%。

【性味与归经】 酸、甘，温。归肺、心、肾经。

【功能与主治】 收敛固涩，益气生津，补肾宁心。用于久嗽虚喘，梦遗滑精，遗尿尿频，久泻不止，自汗盗汗，津伤口渴，内热消渴，心悸失眠。

【用法与用量】 2~6g。

【贮藏】 置通风干燥处，防霉。

五味子

Wuweizi

SCHISANDRAE CHINENSIS FRUCTUS

本品为木兰科植物五味子 *Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill. 的干燥成熟果实。习称“北五味子”。秋季果实成熟时采摘，晒干或蒸后晒干，除去果梗和杂质。

【药材收载标准】《中国药典》2020年版一部

蒸五味子

Zhengwuweizi

本品为五味子的炮制加工品。

【炮制】取净五味子，置适宜容器内，蒸透，焖过夜至表面黑色油润时，取出，干燥。

【性状】本品呈不规则的球形或扁球形。表面黑色或黑红色，皱缩，显油润。果肉柔软，种子 1~2 枚，肾形，表面棕黄色，有光泽，种皮薄而脆。果肉气微，味酸；种子破碎后，有香气，味辛、微苦。

【鉴别】（1）本品粉末红棕色。种皮表皮石细胞表面观呈多角形或长多角形，直径 18~50 μm ，壁厚，孔沟极细密，胞腔内含深棕色物。种皮内层石细胞呈多角形、类圆形或不规则形，直径约至 83 μm ，壁稍厚，纹孔较大。果皮表皮细胞表面观类多角形，垂周壁略呈连珠状增厚，表面有角质线；表皮中散有油细胞。中果皮细胞皱缩，含暗棕色物，并含淀粉粒。

（2）取本品粉末 1g，加三氯甲烷 20ml，加热回流 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加三氯甲烷 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取五味子对照药材 1g，同法制成对照药材溶液。再取五味子甲素对照品，加三氯甲烷制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取上述三种溶液各 2 μl ，分别点于同一硅胶 GF₂₅₄ 薄层板上，以石油醚（30~60℃）-甲酸乙酯-甲酸（15:5:1）的上层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（254nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】水分 不得过 16.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 7.0%（《中国药典》通则 2302）。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

【性味与归经】酸、甘，温。归肺、心、肾经。

【功能与主治】收敛固涩，益气生津，补肾宁心。用于久嗽虚喘，梦遗滑精，遗尿尿频，久泻不止，自汗，盗汗，津伤口渴，短气脉虚，内热消渴，心悸失眠。

【用法与用量】2~6g。

【贮藏】置通风干燥处，防霉。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

仙茅

Xianmao

CURCULIGINIS RHIZOMA

本品为石蒜科植物仙茅 *Curculigo orchioides* Gaertn. 的干燥根茎。秋、冬二季采挖，除去根头和须根，洗净，干燥。

【药材收载标准】《中国药典》2020年版一部

酒仙茅

Jiuxianmao

本品为仙茅的炮制加工品。

【炮制】取净仙茅段或片，用黄酒拌匀，闷润约2小时，置锅内，文火炒至表面深棕色或深褐色、略有酒香气，取出，放凉，筛去药屑。

每100kg仙茅段，用黄酒10kg。

【性状】本品呈类圆形或不规则形的厚片或段，外表皮深棕色至深褐色，粗糙，有的可见纵横皱纹和细孔状的须根痕。断面灰白色至棕褐色，有多数棕色小点，中间有深色环纹。气微香，略具酒香气，味微苦、辛。

【鉴别】取本品粉末2g，加乙醇20ml，加热回流30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加乙酸乙酯1ml使溶解，作为供试品溶液。另取仙茅对照药材2g，同法制成对照药材溶液。再取仙茅苷对照品，加乙醇制成每1ml含0.2mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则0502）试验，吸取供试品溶液和对照药材溶液各4 μ l，对照品溶液6 μ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以二氯甲烷-丙酮-甲酸（5:2:1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以2%香草醛的10%硫酸乙醇溶液，在105℃加热至斑点显色清晰，置日光下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】水分 不得过12.0%（《中国药典》通则0832 第二法）。

总灰分 不得过10.0%（《中国药典》通则2302）。

酸不溶性灰分 不得过2.0%（《中国药典》通则2302）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》通则2201）项下的热浸法

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

测定，用乙醇作溶剂，不得少于 7.0%。

【含量测定】照高效液相色谱法（《中国药典》通则 0512）测定。

色谱条件与系统适应性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-0.1%磷酸溶液（21:79）为流动相；检测波长为 285nm。理论塔板按仙茅苷峰计算应不低于 3000。

对照品溶液的制备 取仙茅苷对照品适量，精密称定，加甲醇制成每 1ml 含 70ug 的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品粉末（过三号筛）约 1g，精密称定，精密加入甲醇 50ml，称定重量，加热回流 2 小时，取出，放冷，再称定重量，用甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，精密量取续滤液 20ml，蒸干，残渣加甲醇溶解，并转移至 10ml 量瓶中，加甲醇制刻度，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各 10ul，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品按干燥品计算，含仙茅苷（ $C_{22}H_{26}O_{11}$ ）不得少于 0.070%。

【性味与归经】辛，热；有毒。归肾、肝、脾经。

【功能与主治】补肾阳，强筋骨，祛寒湿。用于阳痿精冷，筋骨痿软，腰膝冷痛，阳虚冷泻。

【用法与用量】3~10g。

【贮藏】置干燥处，防霉，防蛀。

绣球小通草

Xiuqiuxiaotongcao

HYDRANGEAE DAVIDIIS MEDULLA

本品为虎耳草科植物云南绣球 *Hydrangea davidii* Franch. 的干燥茎髓。秋季割取茎，截成段，趁鲜取出髓部，理直，干燥。

【药材收载标准】《重庆中药材标准》

绣球小通草

Xiuqiuxiaotongcao

本品为绣球小通草的炮制加工品。

【炮制】除去杂质，切段，干燥。

【性状】本品呈段状，表面淡黄白色，无纹理。体轻，质柔韧，捏之能变形。切面实心，平坦，呈银白色光泽。水浸后无粘滑感。气微，无味。

【鉴别】本品横切面：由薄壁细胞组成。边缘细胞类圆形或长圆形，长径 100~560 μ m，短径 51~220 μ m；中央细胞类圆形或多角形；纹孔稀少，椭圆形，直径 1~4.5 μ m。草酸钙针晶束易见，长 71~205 μ m。

【检查】水分 不得过 11.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 7.0%（《中国药典》通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 0.5%（《中国药典》通则 2302）。

【浸出物】取本品粉末约1g，精密称定，精密加水100ml，密塞，照水溶性浸出物测定法（《中国药典》通则2201）项下热浸法测定，不得少于2.5%。

【性味与归经】甘、淡，寒。归肺、胃经。

【功能与主治】清热，利尿，下乳。用于小便不利，尿路感染，乳汁不下。

【用法与用量】3~6g。

【贮藏】置干燥处。

银 耳

Yin er

TREMELLAE HYMENOPHORUM

本品为银耳科真菌银耳 *Tremella fuciformis* Berk. 的干燥子实体。全年采收，除去杂质，干燥。

【药材收载标准】《重庆市中药材标准》

银 耳

Yiner

本品为银耳的炮制加工品。

【炮制】除去杂质、基部残留枯朽树皮及杂色者。

【性状】本品呈半圆形或不规则皱缩块片状，由众多波状卷曲或屈曲的瓣片组成，外表黄白色或浅棕黄色，微具光泽。质硬脆。遇水变软，易膨胀，透明，具粘性。有清香气，味淡。

【鉴别】本品粉末黄白色或浅棕黄色。菌丝散在或粘结成团，无色或浅棕色，长而稍弯曲，多无分枝。

【检查】水分 不得过 18.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 6.0%（《中国药典》通则 2302）。

【含量测定】对照品溶液的制备 精密称取 105℃干燥至恒重的葡萄糖对照品适量，加水制成每 1ml 中含无水葡萄糖 0.15mg 的溶液，即得。

标准曲线的制备 精密量取对照品溶液 0.2ml、0.4ml、0.6ml、0.8ml、1.0ml，分别置具塞试管中，加水至 1.0ml，分别加 5%苯酚溶液 0.5ml，摇匀，迅速精密加入浓硫酸 5.0ml，摇匀，置 60℃水浴中加热 10 分钟后，立即置冰浴中冷却 5 分钟，以相应试剂为空白。照紫外-可见分光光度法（通则 0401），在 485nm 的波长处测定吸光度，以吸光度为纵坐标，浓度为横坐标，绘制标准曲线。

测定法 取本品粗粉约 0.1g，精密称定，置锥形瓶中，精密加水 100ml，称定重量，浸置过夜，加热回流 3 小时，放冷，再称定重量，用水补足减失的重量，摇匀，滤过，精密量取续滤液 0.2 ml，置具塞试管，加水至 1.0 ml，摇匀，照标准曲线的制备项下的方法，自“分别加 5%苯酚溶液 0.5 ml”起，依法测定吸光

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

度，从标准曲线上读出供试品溶液中银耳多糖的重量(μg)，计算，即得。

本品按干燥品计算，含银耳多糖以无水葡萄糖($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$)计，不得少于 37.0%。

【性味与归经】甘，平。归肺、胃、肾经。

【功能与主治】滋阴润肺，养胃生津。用于肺虚咳嗽，阴虚低热，津少口渴。

【用法与用量】3~10g。

【贮藏】置阴凉干燥处。

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

玉米须

Yumixu

MAYDIS STIGMA

本品为禾本科植物玉蜀黍 *Zea mays* L. 的干燥花柱和柱头。夏、秋二季果实成熟时采收，除去杂质，晒干。

【药材收载标准】《中国药典》1977年版一部

玉米须

Yumixu

本品为玉米须的炮制加工品。

【炮制】取玉米须原药材，除去杂质，切制成段，干燥。

【性状】本品为蓬松的团状。淡黄色或棕红色，有光泽，质轻，柔软，气微，味微甜。

【性味与归经】甘，平。归肝、胃、小肠经

【功能与主治】利尿消肿，降血压。用于肾炎水肿，小便不利，湿热黄，高血压。

【用法与用量】15~30g。

【贮藏】置于干燥处。

远志

Yuanzhi

POLYGALAE RADIX

本品为远志科植物远志 *Polygala tenuifolia* Willd. 或卵叶远志 *Polygala sibirica* L. 的干燥根。春、秋二季采挖，除去须根和泥沙，晒干或抽去木心晒干。

【药材收载标准】《中国药典》2020 年版一部

蜜远志

Miyuanzhi

本品为远志的炮制加工品。

【炮制】取净远志（段），用蜜水拌匀，闷润至蜜水吸尽，照蜜炙法（《中国药典》通则0213）炒至颜色加深，不粘手。

每 100kg 远志，用炼蜜 25kg。

【性状】本品为圆筒形的段。外表皮棕黄色至黄棕色，有横皱纹，偶有焦斑，不粘手或稍粘手。切面黄棕色，中空。具蜜焦香气，味甜后稍苦、微辛，嚼之无刺喉感。

【鉴别】（1）取本品粉末 1g，加正丁醇 20ml，超声处理 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取远志口山酮 III 对照品，加甲醇制成每 1ml 含 0.5mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取对照品溶液 2 μ l，供试品溶液 10 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-甲醇-水（7:3:1）的下层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

（2）取本品粉末 1g，加入 90%乙醇 50ml，超声处理 1 小时，放冷，摇匀，滤过，滤液蒸干，残渣加石油醚（60~90℃）20ml，超声处理 30 分钟，弃去石油醚液，残渣加 10%氢氧化钠溶液 50ml 搅拌溶解，转移至圆底烧瓶中，加热回流 1 小时，放冷，用盐酸调节 pH 值为 4~5，用水饱和的正丁醇振摇提取 2 次，每次

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

50ml，合并正丁醇液，回收溶剂至干，残渣加甲醇 5ml 使溶解，作为供试品溶液。另取细叶远志皂苷对照品加甲醇制成 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，取对照品溶液 4 μ l，供试品溶液 20 μ l 分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-甲醇-水（6: 3: 0.5）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 10%硫酸乙醇溶液，在 105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】水分 不得过 12.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 6.0%（《中国药典》通则 2302）。

黄曲霉毒素 照黄曲霉毒素测定法（《中国药典》通则 2351）测定。

本品每 1000g 含黄曲霉毒素 B₁ 不得过 5 μ g，含黄曲霉毒素 G₂ 黄曲霉毒素 G₁、黄曲霉毒素 B₂ 和黄曲霉毒素 B₁ 的总量不得过 10 μ g。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，用 70%乙醇作溶剂，不得少于 40.0%。

【性味与归经】苦、辛，温。归心、肾、肺经。

【功能与主治】安神益智，交通心肾，祛痰，消肿。用于心肾不交引起的失眠多梦、健忘惊悸、神志恍惚，咳痰不爽，乳房肿痛。

【用法与用量】3~10g。

【贮藏】置通风干燥处，防潮。

远志

Yuanzhi

POLYGALAE RADIX

本品为远志科植物远志 *Polygala tenuifolia* Willd. 或卵叶远志 *Polygala sibirica* L. 的干燥根。春、秋二季采挖，除去须根和泥沙，晒干或抽去木心晒干。

【药材收载标准】《中国药典》2020 年版一部

蜜制远志

Mizhiyuanzhi

本品为远志的炮制加工品。

【炮制】取制远志（段），用蜜水拌匀，闷润至蜜水吸尽，照蜜炙法（《中国药典》通则 0213）炒至颜色加深，不粘手。

每 100kg 制远志，用炼蜜 25kg。

【性状】本品呈圆筒形的段。外表皮棕黄色至棕褐色，有横皱纹，偶有焦斑，不粘手或稍粘手。切面棕色，中空。具蜜焦香气，味甜后微苦、微辛，嚼之无刺喉感。

【鉴别】（1）取本品粉末 1g，加正丁醇 20ml，超声处理 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取远志口山酮Ⅲ对照品，加甲醇制成每 1ml 含 0.5mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取对照品溶液 2 μ l，供试品溶液 10 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-甲醇-水（7:3:1）的下层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

（2）取本品粉末 1g，加入 90%乙醇 50ml，超声处理 1 小时，放冷，摇匀，滤过，滤液蒸干，残渣加石油醚（60~90℃）20ml，超声处理 30 分钟，弃去石油醚液，残渣加 10%氢氧化钠溶液 50ml 搅拌溶解，转移至圆底烧瓶中，加热回流 1 小时，放冷，用盐酸调节 pH 值为 4~5，用水饱和的正丁醇振摇提取 2 次，

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

每次 50ml，合并正丁醇液，回收溶剂至干，残渣加甲醇 5ml 使溶解，作为供试品溶液。另取细叶远志皂苷对照品加甲醇制成 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，取对照品溶液 4 μ l，供试品溶液 20 μ l 分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-甲醇-水（6:3:0.5）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 10%硫酸乙醇溶液，在 105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】水分 不得过 12.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 6.0%（《中国药典》通则 2302）。

黄曲霉毒素 照黄曲霉毒素测定法（《中国药典》通则 2351）测定。

本品每 1000g 含黄曲霉毒素 B₁ 不得过 5 μ g，含黄曲霉毒素 G₂ 黄曲霉毒素 G₁、黄曲霉毒素 B₂ 和黄曲霉毒素 B₁ 的总量不得过 10 μ g。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，用 70%乙醇作溶剂，不得少于 35.0%。

【性味与归经】苦、辛，温。归心、肾、肺经。

【功能与主治】安神益智，交通心肾，祛痰，消肿。用于心肾不交引起的失眠多梦、健忘惊悸、神志恍惚，咳痰不爽，乳房肿痛。

【用法与用量】3~10g。

【贮藏】置通风干燥处，防潮。

梔子

Zhizi

GARDENIAE FRUCTUS

本品为茜草科植物梔子 *Gardenia jasminoids* Ellis 的干燥成熟果实。9-11 月果实成熟呈红黄色时采收，除去果梗和杂质，蒸至上气或置沸水中略烫，取出，干燥。

【药材收载标准】《中国药典》2020 年版一部

姜梔子

Jiangzhizi

本品为梔子的炮制加工品。

【炮制】取净梔子，切碎或碾碎，用姜汁拌匀，闷润至姜汁被吸尽，照姜炙法（《中国药典》通则 0213）炒至表面颜色加深。

每 100kg 梔子，用生姜 10kg 或干姜 3kg。

姜汁制法：取生姜，洗净，捣烂，加水适量，搅拌后压榨取汁，姜渣再加水适量，搅拌、浸泡后再榨干取汁，合并姜汁，用水控制姜汁浓度，使生姜与姜汁比例为 1:1；或取干姜加水适量，煎煮 45 分钟，滤取煎煮液，姜渣再加水煎煮 30 分钟，滤取煎煮液，将 2 次煎煮液合并，用水控制姜汁浓度，使干姜与姜汁比例为 1:3。

【性状】本品呈不规则的碎块或颗粒。果皮表面棕褐色或黄褐色，有的可见翅状纵棱。种子扁卵形，深棕褐色或黄褐色，略显金黄色，有的可见焦斑。气微，略具姜辣味。

【鉴别】取本品粉末 1g，加 50%甲醇 10ml，超声处理 40 分钟，滤过，取滤液作为供试品溶液。另取梔子对照药材 1g，同法制成对照药材溶液。再取梔子苷对照品，加乙醇制成每 1ml 含 4mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取上述三种溶液各 2 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以乙酸乙酯-丙酮-甲酸-水（5:5:1:1）为展开剂，展开，取出，晾干。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的黄色斑点；

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

再喷以 10%硫酸乙醇溶液，在 110℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】水分 不得过 10.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 6.0%（《中国药典》通则 2302）。

【性味与归经】苦，寒。归心、肺、三焦经。

【功能与主治】泻火除烦，清热利湿，凉血解毒。用于热病心烦，湿热黄疸，淋证涩痛，血热吐衄，目赤肿痛，火毒疮疡。

【用法与用量】6~10g。

【贮藏】置通风干燥处。

竹叶柴胡

Zhuyechaihu

BUPLEURI HERBA

本品为伞形科植物竹叶柴胡 *Bupleurum marginatum* Wall. ex DC.、马尾柴胡 *Bupleurum microcephalum* Diels. 或马尔康柴胡 *Bupleurum malconense* Shan et Y. Li. 的干燥全草。夏、秋二季花初开时采收，除去泥沙，干燥。

【药材收载标准】《重庆市中药材标准》

竹叶柴胡

Zhuyechaihu

本品为竹叶柴胡炮制加工品。

【炮制】除去杂质，洗净，切段，干燥。

【性状】本品为根、茎、叶、花混合的段。根棕褐色或黄棕色，具细纵纹及稀疏小横突起。茎圆柱形，微具棱线，切面白色，有髓。叶多破碎，叶缘软骨质。花序复伞形，花黄色或黄棕色。气清香，味微苦。

【鉴别】（1）取本品粉末 1g，加甲醇 50ml，加热回流提取 1 小时，冷却，滤过，滤液蒸干，残渣加水 25ml 使溶解，用乙酸乙酯振摇提取 2 次，每次 20ml，合并乙酸乙酯液，蒸干，残渣加甲醇 2ml 使溶解，作为供试品溶液。另取芦丁对照品，加甲醇制成每 1ml 含 0.5mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取上述两种溶液 1~2 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以乙酸乙酯-甲酸-水（7:2:1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 5% 三氯化铝溶液，加热至斑点显色清晰，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

（2）取本品粉末 1g，加 80% 甲醇 50ml，加热回流 1 小时，滤过，滤液蒸干，残渣加水 10ml 使溶解，用乙醚振摇提取 2 次，每次 10ml，弃去乙醚液，水液加稀盐酸 10ml，加热回流 1 小时，取出，冷却，用乙酸乙酯振摇提取 2 次，每次 20ml，合并乙酸乙酯液，用水 30ml 洗涤，弃去水液，乙酸乙酯液蒸干，残渣加甲醇 2ml 使溶解，作为供试品溶液。另取槲皮素对照品，加甲醇制成每 1ml 含 0.5mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试

重庆市中药饮片炮制规范（征求意见稿）

验，分别吸取上述两种溶液各 1 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以正己烷-乙酸乙酯-甲酸（7:5:0.8）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 5%三氯化铝溶液，加热至斑点显色清晰，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】水分 不得过 13.0%（《中国药典》通则 0832）第二法测定。

总灰分 不得过 10.0%（《中国药典》第通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 5.0%（《中国药典》通则 2302）

【浸出物】照水溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 10.0%。

【性味与归经】苦，微寒。归肝、胆经

【功能与主治】疏风退热，疏肝，升阳。用于感冒发热，寒热往来，疟疾，胸胁胀痛，月经不调，子宫脱垂，脱肛。

【用法与用量】3~9g。

【贮藏】置通风干燥处，防注。