

门诊特药辅助用药名单

序号	药品名称/通用名	备注
1	注射用艾普拉唑钠	消化性溃疡出血。
2	奥美拉唑碳酸氢钠干混悬剂(I)	限活动性十二指肠溃疡或胃食管反流病。
3	奥美拉唑碳酸氢钠干混悬剂(II)	限活动性良性胃溃疡。
4	富马酸伏诺拉生片	限反流性食管炎的患者。
5	替戈拉生片	限反流性食管炎。
6	甲磺酸多拉司琼注射液	
7	昂丹司琼口溶膜	
8	奈妥匹坦帕洛诺司琼胶	
9	甘草酸单铵半胱氨酸氯化钠注射液	限肝功能衰竭或无法使用甘草酸口服制剂的患者。
10	精氨酸谷氨酸注射液	限肝性脑病。
11	门冬氨酸鸟氨酸颗粒	治疗因急、慢性肝病如肝硬化、脂肪肝、肝炎所致的高血氨症，特别适合治疗早期的意识失调或神经系统并发症。
12	利那洛肽胶囊	限成人便秘型肠易激综合征(IBS-C)。
13	磷酸钠盐散	
14	德谷胰岛素利拉鲁肽注射液	限血糖控制不佳的成人2型糖尿病患者。
15	盐酸二甲双胍缓释片(III)	
16	脯氨酸恒格列净片	限成人2型糖尿病患者。
17	西格列他钠片	

18	艾地骨化醇软胶囊	限绝经后女性骨质疏松症。
19	铝镁匹林片(Ⅱ)	
20	氯吡格雷阿司匹林片	
21	曲前列尼尔注射液	限肺动脉高压(PAH, WHO分类1)。
22	甲苯磺酸艾多沙班片	限华法林治疗控制不良或出血高危的非瓣膜性房颤、深静脉血栓、肺栓塞患者。
23	注射用甲磺酸萘莫司他	
24	重组人血小板生成素注射液	限实体瘤化疗后所致的血小板减少症或原发免疫性血小板减少症(ITP)。
25	注射用尖吻蝾蛇血凝酶	
26	注射用罗普司亭	限对其他治疗(例如皮质类固醇、免疫球蛋白)治疗反应不佳的成人(≥ 18 周岁)慢性原发免疫性血小板减少症(ITP)患者。
27	异麦芽糖酐铁注射液	限口服铁剂无效或无法口服补铁; 或临床上需要快速补充铁。
28	注射用罗特西普	限 β -地中海贫血成人患者。
29	达依泊汀 α 注射液	限接受血液透析的成人慢性肾脏病患者(CKD)的贫血。
30	多种油脂肪乳(C6~24)注射液	限经营养风险筛查, 明确具有营养风险的肝功能不全(严重肝功能不全者除外)患者的二线用药。消化道有功能患者使用时不予支付。
31	复方氨基酸注射液(18AA-V-SF)	用于营养不良, 低蛋白血症及外科手术前后。
32	复方氨基酸注射液(14AA-SF)	用于改善手术前后病人营养状态, 亦用于蛋白质消化和吸收障碍, 蛋白质摄取量不足或消耗过多等所致的轻度营养不良。
33	中长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(36%)注射液	需经营养风险筛查, 明确具有营养风险, 且不能经饮食或“肠内营养剂”补充足够营养的住院患者方予支付。
34	结构脂肪乳(20%)/氨基酸(16)/葡萄糖(13%)注射液	需经营养风险筛查, 明确具有营养风险, 且不能经饮食或“肠内营养剂”补充足够营养的住院患者方予支付。
35	小儿多种维生素注射液(13)	限与肠外营养药物配合使用时支付, 单独使用不予支付。
36	艾考糊精腹膜透析液	
37	门冬氨酸钾镁木糖醇注射液	限洋地黄中毒引起的心律失常患者。

38	拉那利尤单抗注射液	限12岁及以上患者预防遗传性血管性水肿(HAE)发作。
39	非奈利酮片	限2型糖尿病相关的慢性肾脏病成人患者。
40	比索洛尔氨氯地平片	
41	美阿沙坦钾片	
42	非诺贝酸片	
43	阿布昔替尼片	限其他系统治疗(如激素或生物制剂)应答不佳或不适宜上述治疗的难治性、中重度特应性皮炎成人患
44	克霉唑阴道膨胀栓	用于念珠菌性外阴阴道病。
45	注射用甲苯磺酸奥马环	
46	苹果酸奈诺沙星胶囊	限二线用药。
47	苹果酸奈诺沙星氯化钠注射液	为减少耐药菌的产生，保证奈诺沙星及其他抗菌药物的有效性，本品只用于治疗已证明或高度怀疑由敏感细菌引起的感染。在选择或修改抗菌药物治疗方案时，应考虑细菌培养和药敏试验的结果。如果没有这些试验的数据做参考，则应根据当地流行病学和病原菌敏感性进行经验性治疗。 在治疗前应进行细菌培养和药敏试验以分离并鉴定感染病原菌，确定其对本品的敏感性。在获得以上检验结果之前可以先使用本品进行治疗，得到检验结果之后再选择适当的治疗方法。 在此类中的其他药物相同，使用本品进行治疗时，在治疗期间应定期进行细菌培养和药敏试验以掌握病原菌是否对抗菌药物持续敏感，并在细菌出现耐药性后能够及时发现。 本品可用于治疗对奈诺沙星呈现敏感的肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌、流感嗜血杆菌、副流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌以及肺炎支原体、肺炎衣原体和嗜肺军团菌所致的成人(≥ 18岁)社区获得性肺炎。 在使用本品时可依据患者病情严重程度及耐受性选用注射剂或口服制剂,也可选用治疗初期予以注射剂静脉输注,病情趋缓解后继以口服给药的序贯疗法。
48	注射用头孢唑林钠/氯化钠注射液	
49	注射用头孢美唑钠/氯化钠注射液	
50	注射用头孢呋辛钠/氯化钠注射液	
51	注射用头孢他啶/5%葡萄糖注射液	

52	注射用头孢他啶/氯化钠注射液	
53	小儿法罗培南钠颗粒	限头孢菌素耐药或重症感染儿童患者。
54	头孢托仑匹酯颗粒	限儿童患者。
55	盐酸头孢卡品酯颗粒	
56	吗啉硝唑氯化钠注射液	限二线用药。
57	注射用磷酸左奥硝唑酯二钠	为减少耐药菌的产生，保证磷酸左奥硝唑酯二钠、左奥硝唑、奥硝唑及其他抗菌药物的有效性，磷酸左奥硝唑酯二钠只用于治疗或预防已证明或高度怀疑由敏感细菌引起的感染。在选择或修改抗菌药物治疗方案时，应考虑细菌培养和药敏试验结果。如果没有这些试验的数据做参考，则应当根据当地流行病学和病原菌敏感性进行经验性治疗。 在治疗前应进行细菌培养和药敏试验以分离并鉴定感染病原菌，确定其对该抗菌药物的敏感性，在获得以上药敏结果之前可以先使用该抗菌药物进行治疗，得到药敏结果后再选择进行针对病原菌的治疗。 在治疗期间应定期进行细菌培养和药敏试验以掌握病原菌是否对抗菌药物持续敏感，并在细菌出现耐药性后能够及时发现。 本品仅适用于不宜口服给药的患者。 本品适应症为： 1.本品适用于治疗肠道和肝脏严重的阿米巴病；2.本品适用于治疗奥硝唑敏感厌氧菌引起的手术后感染；3.本品适用于预防外科手术导致的敏感厌氧菌感染。
58	康替唑胺片	本品适用于治疗由对本品敏感的金黄色葡萄球菌(甲氧西林敏感和耐药的菌株)、化脓性链球菌或无乳链球菌引起的复杂性皮肤和软组织感染。 为减少细菌耐药的发生，确保康替唑胺及其他抗菌药物的疗效，本品应仅用于治疗已确诊或高度怀疑由敏感菌引起的感染。本品不适用于治疗革兰阴性菌感染。如确诊或怀疑合并有革兰阴性菌感染，建议联合应用抗革兰阴性菌药物进行治疗。 在选择或调整抗菌药物治疗方案时，应考虑进行细菌培养和药敏试验以分离并鉴定感染病原菌，确定其对本品的敏感性。如果没有这些试验的药敏数据做参考，则应根据当地细菌耐药性和抗菌药物敏感性等流行病学情况进行经验性治疗。在获得以上药敏结果之前可以先使用本品进行治疗，获得药敏结果后再选择进行针对性的病原治疗。
59	泊沙康唑口服混悬液	限以下情况方可支付：1.预防移植后(干细胞及实体器官移植)及恶性肿瘤患者有重度粒细胞缺乏的侵袭性曲霉菌和念球菌感染；2.伊曲康唑或氟康唑难治性口咽念珠菌病；3.接合菌纲类感染。

60	注射用硫酸艾沙康唑	限侵袭性曲霉病或侵袭性毛霉病的成人患者。
61	对氨基水杨酸肠溶颗粒	
62	恩替卡韦颗粒	限乙型肝炎。
63	多拉米替片	限艾滋病。
64	阿兹夫定片	
65	盐酸阿比多尔颗粒	限流感重症高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗。
66	法维拉韦片(又称:法匹拉韦片)	限流感重症高危人群及重症患者的抗流感病毒治疗。
67	玛巴洛沙韦片	本品适用于12周岁及以上单纯性甲型和乙型流感患者，包括既往健康的患者以及存在流感并发症高风险的患者。
68	来特莫韦片	
69	来特莫韦注射液	
70	醋酸戈舍瑞林缓释植入	
71	米诺膦酸片	
72	普瑞巴林缓释片	
73	水合氯醛灌肠剂	限儿童。
74	盐酸曲唑酮缓释片	
75	盐酸美金刚口溶膜	
76	依达拉奉右莰醇注射用浓溶液	限新发的急性缺血性脑卒中患者在发作48小时内开始使用，支付不超过14天。
77	丁苯酞软胶囊	限新发的急性缺血性脑卒中患者在发作72小时内开始使用，支付不超过20天。
78	丁苯酞氯化钠注射液	限新发的急性缺血性脑卒中患者在发作48小时内开始使用，支付不超过14天。
79	苯环喹溴铵鼻喷雾剂	本品适用于改善变应性鼻炎引起的流涕、鼻塞、鼻痒和喷嚏症状。
80	盐酸丙卡特罗粉雾剂	
81	倍氯福格吸入气雾剂	限慢性阻塞性肺病。
82	茚达格莫吸入粉雾剂(II)	限未能充分控制的成年哮喘患者。
83	茚达特罗莫米松吸入粉雾剂(II)	

84	茚达特罗莫米松吸入粉雾剂(III)	
85	美泊利珠单抗注射液	
86	福多司坦口服溶液	
87	布林佐胺噻吗洛尔滴眼	限二线用药。
88	布林佐胺溴莫尼定滴眼	限二线用药。
89	环孢素滴眼液(II)	本品可促进干眼症患者的泪液分泌，适用于与角结膜干燥症相关的眼部炎症所导致的泪液生成减少的
90	环孢素滴眼液(III)	限4岁及以上儿童和青少年的严重性春季角结膜炎。
91	牛黄清感胶囊	
92	柴芩清宁胶囊	
93	疏清颗粒	
94	银翘清热片	
95	清胃止痛微丸	
96	熊胆舒肝利胆胶囊	
97	冬凌草滴丸	限放疗后急性咽炎的轻症患者。
98	金银花口服液	
99	热炎宁合剂	
100	蓝芩口服液	
101	清肺排毒颗粒	
102	痰热清胶囊	
103	鸡骨草胶囊	
104	利胆止痛胶囊	
105	五味苦参肠溶胶囊	
106	小儿荆杏止咳颗粒	
107	连花清咳片	
108	金花清感颗粒	疏风宣肺，清热解毒。用于单纯型流行性感冒轻症，中医辨证属风热犯肺证者，症见发热，头痛，全身酸痛，咽痛，咳嗽，恶风或恶寒，鼻塞流涕，舌质红，舌苔薄黄，脉数。在新型冠状病毒肺炎的常规治疗中，可用于轻型、普通型引起的发热、咳嗽、乏力。

109	化湿败毒颗粒	化湿解毒，宣肺泄热。用于湿毒侵肺所致的疫病，症见发热、咳嗽、乏力、胸闷、恶心、肌肉酸痛、咽干咽痛、食欲减退、口中粘腻不爽等。
110	宣肺败毒颗粒	宣肺化湿，清热透邪，泻肺解毒。用于湿毒郁肺所致的疫病。症见发热，咳嗽，咽部不适，喘促气短，乏力，纳呆，大便不畅；舌质暗红，苔黄腻或黄燥，脉滑数或弦滑。
111	麻芩消咳颗粒	
112	射麻口服液	
113	小儿牛黄清心散	限高热神昏的急救、抢救时使用。
114	缓痛止泻软胶囊	
115	甘海胃康胶囊	
116	百令胶囊	限器官移植抗排异、肾功能衰竭及肺纤维化。
117	参乌益肾片	限慢性肾衰竭患者。
118	芪黄颗粒	
119	桑枝总生物碱片	
120	通脉降糖胶囊	
121	参龙宁心胶囊	限冠心病和成年人恢复期病毒性心肌炎出现的轻度或中度室性过早搏动见上述证候者。
122	芪蛭益肾胶囊	
123	益肾养心安神片	
124	八味芪龙颗粒	限中风病中经络(轻中度脑梗塞)恢复期患者。
125	杜蛭丸	限中风病中经络恢复期患者。
126	脑心安胶囊	限中重度脑梗塞、冠心病心绞痛患者。
127	芪丹通络颗粒	
128	芪芎通络胶囊	限中风病中经络(轻中度脑梗塞)恢复期患者。
129	蒺藜皂苷胶囊	限中风病中经络(轻中度脑梗死)恢复期患者。
130	蛭蛇通络胶囊	益气活血，息风通络。用于中风病中经络(轻中度脑梗塞)恢复期气虚血瘀证。症见半身不遂，偏身麻木，口舌歪斜，舌强语蹇，自汗、气短乏力，脉沉细涩或弦。
131	西红花总苷片	限化疗产生心脏毒性引起的心绞痛患者。
132	丹灯通脑软胶囊	
133	解郁除烦胶囊	
134	七蕊胃舒胶囊	

135	芍麻止痉颗粒	
136	川芎清脑颗粒	
137	降脂通络软胶囊	活血行气，降脂祛浊。用于高脂血症属血瘀气滞证者，症见胸胁胀痛、心前区刺痛、胸闷、舌尖边有瘀点或瘀斑、脉弦或涩。
138	复方黄黛片	限初治的急性早幼粒细胞白血病。
139	食道平散	限中晚期食道癌所致食道狭窄梗阻的患者。
140	参一胶囊	限原发性肺癌、肝癌化疗期间使用。
141	五虎口服液	
142	筋骨止痛凝胶	
143	玄七健骨片	
144	关黄母颗粒	补益肝肾，滋阴降火。用于女性更年期综合征(绝经前后诸证)中医辨证属肝肾阴虚证，症见烘热汗出，头晕，耳鸣，腰膝酸软或足跟痛，少寐多梦，急躁易怒等。
145	坤心宁颗粒	
146	安儿宁颗粒	
147	红花如意丸	
148	如意珍宝片	
149	注射用福沙匹坦双葡甲	限放化疗且吞咽困难的患者。
150	硫酸镁钠钾口服用浓溶	
151	复合磷酸氢钾注射液	
152	复方氨基酸(15AA-II)/葡萄糖(10%)电解质注射液	需经营养风险筛查，明确具有营养风险，且不能经饮食或“肠内营养剂”补充足够营养的住院患者方予支付。
153	碳酸氢钠林格注射液	
154	氨基酸(15)腹膜透析液	
155	托伐普坦片	
156	注射用多黏菌素E甲磺酸	
157	泊沙康唑肠溶片	限13岁和13岁以上重度免疫缺陷患者。
158	泊沙康唑注射液	限18岁和18岁以上重度免疫缺陷患者。
159	枸橼酸托法替布缓释片	
160	普瑞巴林口服溶液	

161	拉考沙胺注射液	
162	奥氮平口溶膜	
163	盐酸安非他酮缓释片(II)	
164	舒更葡糖钠注射液	
165	利多卡因凝胶贴膏	限带状疱疹患者。