

## 地黄

Dihuang

REHMANNIAE RADIX

本品为玄参科植物地黄 *Rehmannia glutinosa* Libosch. 的新鲜或干燥块根。秋季采挖，除去芦头、须根及泥沙，鲜用；或将地黄缓缓烘焙至约八成干。前者习称“鲜地黄”，后者习称“生地黄”。

【药材收载标准】《中国药典》2020年版一部

## 地黄炭

Dihuangtan

本品为地黄的炮制加工品。

【炮制】取地黄片，照清炒法（《中国药典》通则 0213）炒至焦黑色，松泡鼓起。

【性状】本品为不规则的块片或碎块，表面焦黑色，内部焦黑色至棕褐色，有蜂窝状裂隙，质松脆，气焦香，苦味，微甜。

【鉴别】本品粉末焦黑色。木栓细胞淡棕色。薄壁细胞皱缩成不规则形，内含类圆形细胞核。分泌细胞内含橙红色油滴状物。具缘纹孔及网纹导管，直径约至 92 μm。

【检查】水分 不得过 10.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 8.0%（《中国药典》通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 3.0%（《中国药典》通则 2302）。

【浸出物】照水溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的冷浸法测定，不得少于 50.0%。

【性味与归经】甘，寒。归心、肝、肾经。

【功能与主治】凉血，止血。用于咯血、衄血、便血、尿血、崩漏。

【用法与用量】10~15g。

【贮藏】置通风干燥处。

## 地黄

Dihuang

REHMANNIAE RADIX

本品为玄参科植物地黄 *Rehmannia glutinosa* Libosch. 的新鲜或干燥块根。秋季采挖，除去芦头、须根及泥沙，鲜用；或将地黄缓缓烘焙至约八成干。前者习称“鲜地黄”，后者习称“生地黄”。

【药材收载标准】《中国药典》2020年版一部

## 熟地黄炭

Shudihuangtan

本品为地黄的炮制加工品。

【炮制】取熟地黄片，照清炒法（《中国药典》通则 0213）用武火炒至发泡鼓起，表面炭黑色，内部焦黑色。

【性状】本品为不规则的块片或碎块，外表面炭黑色，有光泽，黏性大。切面乌黑色，质柔软而带韧性。气微，味甜。

【鉴别】本品粉末焦黑色。木栓细胞淡棕色。薄壁细胞皱缩成不规则形，内含类圆形细胞核。分泌细胞内含橙红色油滴状物。具缘纹孔导管及网纹导管，直径约至 92 μm。

【检查】水分 不得过 10.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 8.0%（《中国药典》通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 3.0%（《中国药典》通则 2302）。

【浸出物】照水溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的冷浸法测定，不得少于 50.0%。

【性味与归经】甘，微温。归肝、肾经。

【功能与主治】补血，止血。用于崩漏或虚损性出血。

【用法与用量】9~15g。

【贮藏】置通风干燥处。

## 花椒

Huajiao

ZANTHOXYLI PERICARPIUM

本品为芸香科植物青椒 *Zanthoxylum schinifolium* Sieb. et Zucc. 或花椒 *Zanthoxylum bungeanum* Maxim. 的干燥成熟果皮。秋季采收成熟果实，晒干，除去种子和杂质。

【药材收载标准】《中国药典》2020年版一部

## 花椒炭

Huajiaotan

本品为花椒的炮制加工品。

【炮制】取净花椒，照清炒法（《中国药典》通则 0213）炒至表面焦黑色或焦褐色，取出放凉。

【性状】形同花椒。外表面焦黑色或焦褐色，内表面焦褐色。

【检查】水分 不得过 10.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于 12.0%。

【性味与归经】辛，温。归脾、胃、肾经。

【功能与主治】温中止痛。用于脘腹冷痛，呕吐泄泻，虫积腹痛。

【用法与用量】3~6g。

【贮藏】置通风干燥处。

## 茄根

Qiegen

SOLANI RADIX ET RHIZOMA

本品为茄科植物茄 *Solanum melongena* L. 的干燥根及根茎。秋季挖取根及根茎，除去须根及杂质，或洗净，切片，晒干。

【药材收载标准】《广东省中药材标准》第三册（2019年版）

## 茄根

Qiegen

本品为茄根的炮制加工品。

【炮制】 除去杂质；或除去杂质，洗净，润透，切片，干燥。

【性状】 本品呈不规则类圆形厚片。外表皮灰黄色至棕灰色，光滑。切面黄白色，髓部松软或中空。质硬。气微，味淡。

【鉴别】 本品粉末黄白色。含晶细胞众多，充满草酸钙砂晶。韧皮纤维多断碎，直径40~57 μm，壁厚，一边壁可见波状弯曲，胞腔大，有时可见含有草酸钙小方晶。具缘纹孔导管，直径17~90 μm。

【检查】 水分 不得过13.0%（《中国药典》通则0832第二法）。

总灰分 不得过7.0%（《中国药典》通则2302）。

酸不溶性灰分 不得过2.0%（《中国药典》通则2302）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》通则2201）项下的热浸法测定，用稀乙醇作溶剂，不得少于6.0%。

【性味与归经】 甘、辛，平。归胃、大肠经。

【功能与主治】 清热利湿，祛风止咳，收敛止血。用于水肿，久咳，老年人慢性气管炎，久痢，白带，遗精，尿血，便血，风湿性关节炎。

【用法与用量】 9~18g。外用适量。

【贮藏】 置通风干燥处。

## 粳米（大米）

Jingmi (Dami)

ORYZAE SEMEN

本品为禾本科植物稻 *Oryza sativa* L. 的干燥的种仁。秋季采收，将全株割下，打下果实。除去果壳及种皮，筛去米糠。

【药材收载标准】《山东省中药材标准》2023 年版

## 炒粳米（炒大米）

Chaojingmi (Chaodami)

本品为粳米（大米）的炮制加工品。

【炮制】取净大米，照清炒法（《中国药典》通则 0213）用文火炒至表面棕褐色至棕黑色，断面棕色至棕褐色，具焦香气。

【性状】本品呈扁圆形，形状、大小近似大米粒。表面棕褐色至棕黑色，具焦斑，断面棕色至棕褐色。略有焦香气，味微甘。

【鉴别】取本品粉末 0.1g，加水 50ml，水浴加热 5 分钟，冷却后向试液中加入碘液 1 滴，摇匀，溶液呈蓝紫色。

【检查】水分 不得过 10.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 2.0%（《中国药典》通则 2302）。

【浸出物】照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，用稀乙醇作溶剂，不得少于 30.0%。

【性味与归经】甘，平。归脾、胃经。

【功能与主治】温中益气。用于补气和胃，长肌肉，壮筋骨，益肠胃。

【用法与用量】9~15g。

【贮藏】置干燥处，防蛀。

## 粳米皮（米皮糠）

Jingmipi (Mipikang)

ORYZAE SATIVAE PERICARPIUM

本品为禾本科植物稻 *Oryza sativa* L. 的颖果经加工而脱下的果皮，夏秋二季水稻成熟收割后，于碾制谷粒时收集，干燥。

**【药材收载标准】** 《浙江省中药材标准》（2017年版）第一册

## 粳米皮（米皮糠）

Jingmipi (Mipikang)

本品为粳米皮（米糠皮）的炮制加工品。

**【炮制】** 除去杂质。

**【性状】** 本品呈大小不一的碎块或粉末，淡黄色至黄色，较完整者外面可见纵向细棱条；内面颜色较淡，光滑。偶夹有白色半透明的种仁。气微，味淡。

**【检查】水分** 不得过 16.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

**总灰分** 不得过 10.0%（《中国药典》通则 2302）。

**【性味与归经】** 甘，平。归肺、大肠经。

**【功能与主治】** 健脾胃。用于脚气、浮肿、泄泻。

**【用法与用量】** 10~30g。

**【贮藏】** 置干燥处。

## 两头尖

Liangtoujian

ANEMONES RADDEANAE RHIZOMA

本品为毛茛科植物多被银莲花 *Anemone raddeana* Regel 的干燥根茎。夏季采挖，除去须根，洗净，干燥。

【药材收载标准】《中国药典》2020 年版一部

## 醋两头尖

Culiangtoujian

本品为两头尖的炮制加工品。

【炮制】取净两头尖，照醋炙法（《中国药典》通则 0213）用文火炒干。每 100kg 两头尖，用米醋 15kg。

【性状】本品呈类长纺锤形。表面棕黑色，断面棕色或棕红色。略有醋酸气。

【鉴别】（1）本品粉末灰褐色至棕褐色。淀粉粒众多，单粒类圆形或椭圆形，直径 2~11 μm，脐点点状或短缝状，层纹不明显；复粒由 2~4 分粒组成。表皮细胞红棕色、黄色或亮黄色，外壁木栓化增厚，常呈脊状或瘤状突入细胞内。网纹导管、螺纹导管或梯纹导管多见，直径 10~33 μm，少有具缘纹孔导管。

（2）取本品粉末约 5g，置索氏提取器中，加甲醇适量，加热回流提取 3 小时，取甲醇液回收溶剂至干，残渣加水 10ml 溶解，用乙醚振摇提取 2 次（20ml、10ml），弃去乙醚液。水液用水饱和的正丁醇振摇提取 5 次（20ml、20ml、15ml、15ml、15ml），合并正丁醇液，减压回收溶剂至干。残渣加甲醇 10ml 使溶解，滤过，取续滤液，作为供试品溶液。取竹节香附素 A 对照品，加甲醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》通则 0502）试验，吸取供试品溶液和上述对照品溶液各 2 μl，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-甲醇-水（7:3:1）的下层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 10% 硫酸乙醇溶液，在 105℃ 加热 5 分钟。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 水分 不得过 12.0%（《中国药典》通则 0832 第二法）。

总灰分 不得过 6.0%（《中国药典》通则 2302）。

酸不溶性灰分 不得过 2.0%（《中国药典》通则 2302）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》通则 2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于 12.0%。

【性味与归经】 辛，热；有毒。归脾经。

【功能与主治】 祛风湿，消痈肿。用于风寒湿痹，四肢拘挛，骨节疼痛，痈肿溃烂。

【用法与用量】 1~3g。外用适量。

【注意】 孕妇禁用。

【贮藏】 置阴凉干燥处。



## 糯米

Nuomi

ORYZAE SATIVAE SEMEN

本品为禾本科植物糯稻 *Oryza sativa* L. var. *glutinosa* Matsum. 的干燥成熟种仁。秋季果实成熟时采收，取其种仁。

**【药材收载标准】** 《吉林省中药材标准》第二册（2019年版）

## 炒糯米

Chaonuomi

本品为糯米的炮制加工品。

**【炮制】** 取净糯米，照清炒法（《中国药典》通则 0213）用文火炒至表面棕褐色至棕黑色，断面棕色至棕褐色，具焦香气。

**【性状】** 本品呈矩圆形或长椭圆形，表面棕褐色至棕黑色，断面棕色至棕褐色，具焦香气。

**【检查】 水分** 不得过 10.0%（《中国药典》四部通则 0832 第二法）。

**总灰分** 不得过 2.0%（《中国药典》四部通则 2302）。

**【性味与归经】** 甘，温。归脾、胃、肺经。

**【功能与主治】** 补中益气。用于消渴溲多，自汗，泄泻。

**【用法与用量】** 30~60g。

**【贮藏】** 置通风干燥处。

**【贮藏】** 密封。

## 五灵脂

Wulingzhi

TROGOPTERI FAECES

本品为鼯鼠科动物复齿鼯鼠 *Trogopterus xanthipes* Milne - Edwards 的干燥粪便。全年均可采收，除去杂质，晒干。根据外形的不同常分为灵脂块（糖灵脂）及灵脂米（散灵脂）。

【药材收载标准】《陕西省药材标准》2015年版

## 醋五灵脂

Cuwulingzhi

本品为五灵脂的炮制加工品。

【炮制】取净五灵脂，加入醋拌润后，照醋炙法（《中国药典》通则 0213）用文火炒干，取出，放凉。

每 100kg 五灵脂，用醋 12.5kg。

【性状】本品呈不规则的块状或颗粒状，大小不一。表面灰褐色或黑褐色，常可见淡黄色的纤维残痕。体轻，质松，易折断，断面黄褐色或棕褐色，纤维性。微有醋酸气。

【性味与归经】咸、甘，温。归肝经。

【功能与主治】活血，化瘀，止痛。用于胸胁、脘腹刺痛，痛经，经闭，产后血瘀疼痛，跌扑肿痛，蛇虫咬伤。

【用法与用量】3~9g。外用适量。

【注意】孕妇慎用；不宜与人参同用。

【贮藏】置干燥处。

## 猪肾

Zhushen

SUIS REN

本品为猪科动物猪 *Sus scrofa domestica* Brisson 的新鲜肾脏。猪宰杀后，剖腹，取出肾脏，洗净，鲜用或冷藏。

【药材收载标准】《广东省中药材标准》2011 年版

## 猪肾

Zhushen

本品为猪肾的炮制加工品。

【炮制】取猪肾，剖开，除去白色筋膜和腺腺，洗净。

【性状】本品表面具膜质层，光滑，细密，呈黄棕色、红棕色至棕褐色，鲜品可见血迹斑痕。内凹一侧的中间部位可见肾门。剖面偶有白色筋膜和腺腺。气微，略有尿腺气味。

【性味与归经】咸，平。归肾经。

【功能与主治】补肾益阴，利尿。用于肾虚腰痛，遗精盗汗，耳鸣耳聋，产后虚羸，身面浮肿。

【用法与用量】15~150g。

【贮藏】冷藏。