

附件 1 陈皮等 67 个品种修订内容征求意见稿

序号	炮制品名	修改前	修改后
1	陈皮丝 土炒陈皮 蒸陈皮	无黄曲霉毒素检查项。	黄曲霉毒素 照真菌毒素测定法（《中国药典》2020 年版四部通则 2351）测定。 取本品粉末（过二号筛）约 5g，精密称定，加入氯化钠 3g，照黄曲霉毒素测定法项下供试品的制备方法测定，计算，记得。 本品每 1000g 含黄曲霉毒素 B₁ 不得过 5μg，黄曲霉毒素 G₂、黄曲霉毒素 G₁、黄曲霉毒素 B₂ 和黄曲霉毒素 B₁ 的总量不得过 10μg。
	麸炒陈皮	【功能与主治】 理气健脾，燥湿化痰。用于胸脘胀满，食少吐泻，咳嗽痰多。麸炒陈皮增强理气健脾的作用。	【功能与主治】 理气健脾，燥湿化痰。用于胸脘胀满，食少吐泻，咳嗽痰多。麸炒陈皮增强理气健脾的作用。土炒陈皮增强健脾消食作用。蒸陈皮可缓和其燥性。
	土炒陈皮	【功能与主治】 理气健脾，燥湿化痰。用于脘腹胀满，食少吐泻，咳嗽痰多。土炒陈皮增强健脾消食作用。	
	蒸陈皮	【功能与主治】 理气健脾，燥湿化痰。用于脘腹胀满，食少吐泻，咳嗽痰多。蒸陈皮可缓和其药性。	
	广陈皮个 陈皮丝	【功能与主治】 理气健脾，燥湿化痰。用于脘腹胀满，食少吐泻，咳嗽痰多。	
2	炒诃子	【性状】 …气微，味酸涩后甜。	【性状】 …种子狭长纺锤形，长约 1cm，直径 0.2~0.4cm，种皮黄棕色，子叶 2，白色，相互重叠卷旋。气微，味酸涩后甜。
	炒诃子 诃子炭	【功能与主治】 涩肠敛肺，降火力咽。用于久泻久痢，便血脱肛，肺虚咳喘，久嗽不止，咽痛音哑。	【功能与主治】 涩肠止泻，敛肺止咳，降火力咽。用于久泻久痢，便血脱肛，肺虚咳喘，久嗽不止，咽痛音哑。煨诃子增强涩肠止泻作用。
	煨诃子	【功能与主治】 涩肠止泻，敛肺止咳，降火力咽。用于久泻久痢，便血脱肛，肺虚喘咳，久嗽不止，咽痛音哑。煨诃子增强涩肠止泻作用。	
3	石菖蒲瓜子片	【鉴别】 （2）取本品粉末 0.2g…另取石菖蒲对照药材 0.2g…吸取上述两种溶液各 2μl…	【鉴别】 （2）取本品粉末 1g…另取石菖蒲对照药材 2g…吸取上述两种溶液各 2~4μl…

4	朱茯苓	【检查】 水分 不得过 18.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 0832 第二法） 【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》2020 年版四部通则 2201）项下的热浸法测定，用稀乙醇作溶剂，不得少于 2.5%。	【检查】 水分项、 【浸出物】 项删除。
5	肉桂丝	【炮制】 肉桂段 取原药材，除去杂质，洗净，略浸，润透，未去净粗皮的刮去粗皮，切段，阴干或低温干燥。 【性状】 本品呈段状… 【炮制】 肉桂丝 取原药材，除去杂质，用清水喷洒，再用湿布遮盖，润透，刮去粗皮，切丝，阴干。 【性状】 本品呈丝状…	肉桂段与肉桂丝合并为肉桂丝。 【炮制】 肉桂丝 取原药材，除去杂质，用清水喷洒，润透，刮去粗皮，切丝或段，阴干或低温干燥。 【性状】 本品呈丝或段状…
6	三七个	【鉴别】 （2）…另取人参皂苷 Rb ₁ 对照品、人参皂苷 Re 对照品、人参皂苷 Rg ₁ 对照品及三七皂苷 R ₁ 对照品…	【鉴别】 （2）…另取人参皂苷 Rb ₁ 对照品、人参皂苷 Rg ₁ 对照品及三七皂苷 R ₁ 对照品…
	三七个 三七厚片 三七粉（冻干）	【功能与主治】 散瘀止血，消肿定痛。用于咯血，吐血，衄血，便血，崩漏，外伤出血，胸腹刺痛，跌扑肿痛。	【功能与主治】 散瘀止血，消肿定痛。用于咯血，吐血，衄血，便血，崩漏，外伤出血，胸腹刺痛，跌扑肿痛。三七粉（熟）补血和血，多用于贫血，失血虚弱，月经不调，产后恶血不尽。
	三七粉（熟）	【功能与主治】 散瘀止血，消肿定痛，补血和血。用于咯血，吐血，衄血，便血，崩漏，外伤出血，胸腹刺痛，跌扑肿痛。	
7	三制白附片	【炮制】 漂白附子 …入宽水中煮至横切无白心，干燥至七成干…	【炮制】 三制白附片 …入宽水中煮至内无白心，捞出白附子，干燥至七成干…
8	朱砂拌灯心	【浸出物】 取本品 0.5g，照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》2020 年版四部通则 2201）项下的热浸法测定，用稀乙醇作溶剂，不得少于 5.0%。	【浸出物】 项删除。
	青黛拌灯心	【浸出物】 同朱砂拌灯心。	【浸出物】 取本品 0.5g，照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》2020 年版四部通则 2201）项下的热浸法测定，用稀乙醇作溶剂，不得少于 5.0%。
9	炒蜂房	【性状】 …外表面深黄色。腹面有的可见整齐的六角形房孔…	【性状】 …外表面灰黄色或灰褐色。腹面有多数整齐的六角形房孔…

10	制白芍	无【鉴别】（2）项、【检查】总灰分项、【浸出物】项、【含量测定】项。	【鉴别】（2）取本品粉末 0.5g，加乙醇 10ml，振摇 5 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加乙醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取芍药苷对照品，加乙醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2020 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 10μl，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-乙酸乙酯-甲醇-甲酸（40:5:10:0.2）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 5%香草醛硫酸溶液，加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同的蓝紫色斑点。 【检查】 总灰分 不得过 4.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 2302）。 【浸出物】 照水溶性浸出物测定法（《中国药典》2020 年版四部通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 20.5%。 【含量测定】 照高效液相色谱法（《中国药典》2020 年版四部通则 0512）测定。 色谱条件与系统适用性试验 色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-0.1%磷酸溶液（14:86）为流动相；检测波长为 230nm。理论板数按芍药苷峰计算应不低于 2000。 对照品溶液的制备 取芍药苷对照品适量，精密称定，加甲醇制成每 1ml 含芍药苷 60μg 的溶液，即得。 供试品溶液的制备 取本品中粉约 0.1g，精密称定，置 50ml 量瓶中，加稀乙醇 35ml，超声处理（功率 240W，频率 45kHz）30 分钟，放冷，加稀乙醇至刻度，摇匀，滤过，取续滤液，即得。 测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各 10μl，注入液相色谱仪，测定，即得。 本品按干燥品计算，含芍药苷（C₂₃H₂₈O₁₁）不得少于 1.2%。
	制白芍	【功能与主治】 平肝止痛，养血调经，敛阴止汗。用于头痛眩晕，胁痛，腹痛，四肢挛痛，血虚萎黄，月经不调，自汗，盗汗。制白芍增强活血作用。	
	蜜糠炒白芍	【功能与主治】 平肝止痛，养血调经，敛阴止汗。用于头痛眩晕，胁痛，腹痛，四肢挛痛，血虚萎黄，月经不调，自汗，盗汗。酒润蜜糠炒后酸收寒凉之性缓和。	【功能与主治】 养血调经，敛阴止汗，柔肝止痛，平抑肝阳。用于血虚萎黄，月经不调，自汗，盗汗，胁痛，腹痛，四肢挛痛，头痛眩晕。制白芍增强活血作用。酒润蜜糠炒后缓和其酸寒之性。炒炭后增强止血功能，用于血证。

	白芍炭	【功能与主治】 养血调经，敛阴止汗，柔肝止痛，平抑肝阳。用于血虚萎黄，月经不调，自汗，盗汗，胁痛，腹痛，四肢挛痛，头痛眩晕。炒炭后增强止血功能，用于血证。	
11	烫蕲蛇	无 【鉴别】 项	【鉴别】 聚合酶链式反应法。 模板 DNA 提取 取本品 0.5g，置乳钵中，加液氮适量，充分研磨使成粉末，取 0.1g，置 1.5ml 离心管中，加入消化液 275μl[细胞核裂解液 200μl，0.5mol/L 乙二胺四醋酸二钠溶液 50μl，蛋白酶 K（20mg/ml）20μl，RNA 酶溶液 5μl]，在 55℃水浴保温 1 小时，加入裂解缓冲液 250μl，混匀，加到 DNA 纯化柱中，离心（转速为每分钟 10000 转）3 分钟；弃去过滤液，加入洗脱液 800μl[5mol/L 醋酸钾溶液 26μl，1mol/L Tris-盐酸溶液（pH7.5）18μl，0.5mol/L 乙二胺四醋酸二钠溶液（pH8.0）3μl，无水乙醇 480μl，灭菌双蒸水 273μl]，离心（转速为每分钟 10000 转）1 分钟；弃去过滤液，用上述洗脱液反复洗脱 3 次，每次离心（转速为每分钟 10000 转）1 分钟；弃去过滤液，再离心 2 分钟，将 DNA 纯化柱转移入另一离心管中，加入无菌双蒸水 100μl，室温放置 2 分钟后，离心（转速为每分钟 10000 转）2 分钟，取上清液，作为供试品溶液，置-20℃保存备用。另取蕲蛇对照药材 0.5g，同法制成对照药材模板 DNA 溶液。也可用等效商品化 DNA 提取试剂盒提取 DNA。 PCR 反应 鉴别引物： 5'GGCAATTCACCTACACAGCCAACATCAACT3'和 5'CCATAGTCAGGTGGTTAGTGATAC3'。PCR 反应体系：在 200μl 离心管中进行，反应总体积为 25μl，反应体系包括 10×PCR 缓冲液 2.5μl，dNTP（2.5mmol/L）2μl，鉴别引物（10μmol/L）各 0.5μl，高保真 TaqDNA 聚合酶（5U/μl）0.2μl，模板 0.5μl，无菌双蒸水 18.8μl。将离心管置 PCR 仪，PCR 反应参数：95℃预变性 5 分钟，循环反应 30 次（95℃30 秒，63℃45 秒），延伸（72℃）5 分钟。 电泳检测 照琼脂糖凝胶电泳法方法 2（《中国药典》2020 年版通则 0541），胶浓度为 1%，胶中加入核酸凝胶染色剂 GelRed；供试品与对照药材 PCR 反应溶液的上样量分别为 8μl，DNA 分子量标记上样量为 2μl（0.5μg/μl）。电泳结束后，取凝胶片在凝胶成像仪上或紫外透射仪上检视。供试品凝胶电泳图谱中，在与对照药材凝胶电泳图谱相应的位置上，在 300~400bp 应有单一 DNA 条带。

12	炒荷叶炭	【炮制】 炒荷叶炭 …用武火炒至炭黑色… 【性状】 …表面棕褐色或黑褐色…	【炮制】 炒荷叶炭 …用武火炒至黑褐色… 【性状】 …表面黑褐色…
13	毛冬青	【性状】 …切面皮部棕黄色，木部黄白色… 【鉴别】 (1) 本品粉末黄白色…	【性状】 …切面皮部薄，木部发达，黄白色或淡黄棕色… 【鉴别】 (1) 本品粉末黄白色至灰黄色…
14	煮天南星	【炮制】 煮天南星 … 每 100kg 天南星，用甘草 5kg、皂角 2.5kg、白矾适量。	【炮制】 煮天南星 … 每 100kg 天南星，用甘草 5kg、皂角 2.5kg、白矾 5kg、生姜 20kg。
15	酒龙胆	【鉴别】 (2) 取本品粉末(过四号筛)约 0.5g，精密称定，精密加入甲醇 20ml，称定重量，加热回流 15 分钟，放冷，再称定重量，用甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，滤液备用，精密量取续滤液 2ml，置 10ml 量瓶中，加甲醇至刻度，摇匀，作为供试品溶液。…对照品溶液 1 μ l…	【鉴别】 (2) 取本品粉末 0.5g，加入甲醇 20ml，加热回流 15 分钟，滤过，滤液作为供试品溶液。…对照品溶液 2 μ l…
16	山慈菇片	【性状】 本品略呈圆锥形或不规则圆形薄片。表面黄白色或黄棕色，有细皱，上端尖，底部凹陷而抽缩，中部有 2~3 条微突起的环节，“冰球子”为 1~2 条环节。质坚硬，断面角质，稍有空心。薄片厚约 0.2cm，切面灰白色或淡黄色，角质样，半透明。气微，味淡。 【鉴别】 本品横切面：毛慈菇 最外层为一层扁平的表皮细胞，其内有 2~3 列细胞，壁稍厚，浅黄色，再向内为大的类圆形薄壁细胞，含黏液质，并含有淀粉粒。近表皮处的薄壁细胞中含有草酸钙针晶束，长 70~150 μ m。维管束散在，外韧型。	【性状】 本品略呈圆锥形或不规则圆形薄片。切面灰白色或淡黄色，角质样，半透明。气微，味淡。 【鉴别】 项删除。
17	煨白果	【炮制】 取原药材，除去杂质，照煨法（《中国药典》2020 年版四部通则 0213），煨至具香气，取出，打破去壳。	【炮制】 取原药材，除去杂质，用湿草纸裹好，置灰火中，煨至具香气，取出，打破去壳。
18	姜川乌	【性状】 本品为不规则或长三角形的片。…	【性状】 本品为不规则或长三角形的薄片。…
	甘草皂角制川乌	【性状】 …外表面黑褐色，切面灰白色至黄褐色…	【性状】 …外表皮黑褐色，切面黑褐色或黄褐色…
19	炒棕榈炭	【鉴别】 (1) …周围细胞含草酸钙方晶，形成晶纤维。	【鉴别】 (1) …周围细胞含硅质块。

20	煨葛根	【炮制】 …照煨法（《中国药典》2020 年版四部通则 0213）煨至面皮呈焦黄色或纸呈黑色，去面皮或纸，放凉。	【炮制】 …用 3 层湿纸包好，在灰火中煨至纸呈黑色，去纸，放凉。
21	酒金钱白花蛇	【炮制】 酒金钱白花蛇 取金钱白花蛇体或金钱白花蛇段… 【性状】 形如金钱白花蛇体或金钱白花蛇段…	【炮制】 酒金钱白花蛇 取原药材、金钱白花蛇体或金钱白花蛇段… 【性状】 本品形如金钱白花蛇（体、段）…
22	朱麦冬	【检查】 水分 不得过 18.0%（《中国药典》2020 年版四部通则 0832 第二法）。 【浸出物】 照水溶性浸出物测定法（《中国药典》2020 年版四部通则 2201）项下的冷浸法测定，不得少于 60.0%。	【检查】 水分项、【浸出物】项删除。
23	牛鞭	【炮制】 …将其切成 0.5~1.0cm 斜片，干燥。	【炮制】 …将其切成斜厚片，干燥。
24	麸炒芡实	【性状】 本品呈类球形，直径 5~8mm。表面有棕红色内种皮，微具焦斑，一端黄白色，约占全体 1/3，有凹点状的种脐痕，除去内种皮显白色。质较硬，断面白色，粉性。气微，味淡。	【性状】 本品呈类球形，或多为碎粒，完整者直径 5~8mm。表面棕红色，一端微黄色，略具焦斑。质较硬，断面白色，粉性。气微，味淡。
25	炒乳香	【鉴别】 （2）索马里乳香 取〔含量测定〕项下挥发油适量，加无水乙醇制成每 1ml 含 2.5mg 的溶液，作为供试品溶液…	【鉴别】 （2）索马里乳香 取本品 20g，照挥发油测定法（《中国药典》2020 年版四部通则 2204 甲法）提取挥发油适量，加无水乙醇制成每 1ml 含 2.5mg 的溶液，作为供试品溶液…
26	酒桑寄生	【性状】 …表面深黄色，具细纵纹，…	【性状】 …切面深黄色，外表面红褐色或灰褐色，具细纵纹，…
27	桑枝	【来源】 …春末夏初采收，去叶；或晒干；或趁鲜切片，晒干。	【来源】 …春末夏初采收，去叶，晒干，或趁鲜切片，晒干。
	桑枝瓜子片	【炮制】 桑枝片（瓜子片） 取原药材未切片者，除去杂质，干品浸 4~6 天，润透或鲜品洗净，刮去皮，切斜薄片，干燥。	【炮制】 桑枝瓜子片 取原药材未切片者，除去杂质，浸 4~6 天，润透，切斜薄片，干燥。
	酒炒桑枝	【炮制】 酒炒桑枝 …用酒喷洒拌匀，待药透汁尽，用麦麸炒至微黄色。 【性状】 …外表皮灰黄色或黄褐色，有点状皮孔。切面木部黄色或深黄色，射线放射状，髓部黄白色…	【炮制】 酒炒桑枝 …照酒润麸炒法（附录Ⅱ）用麦麸炒至微黄色。 【性状】 …外表皮灰棕色或棕褐色。切面皮部较薄，木部黄色或深黄色，射线放射状，髓部黄白色…

28	白英	【性状】 …叶片皱缩、破碎，完整者展平后呈戟形、长卵形或琴形，先端尖，基部心形…	【性状】 …叶片皱缩、破碎，完整者展平后呈戟形、长卵形或琴形，长 3~7cm，宽 1.5~3.5cm，先端尖，基部心形…
29	地耳草	【性状】 …叶皱缩、破碎，完整者展平后呈卵形或卵圆形，全缘，具腺点，基出脉 3~5 条…	【性状】 …叶皱缩、破碎，完整者展平后呈卵形或卵圆形，长 0.4~1.6cm，宽 0.2~0.8cm，全缘，具腺点，基出脉 3~5 条…
30	华佩兰	【性状】 …叶片多皱缩、破碎，完整者展平后呈宽卵形，顶端急尖，基部近圆形，边缘有粗锯齿…	【性状】 …叶片多皱缩、破碎，完整者展平后呈宽卵形，长 3~11cm，宽 2~6cm，顶端急尖，基部近圆形，边缘有粗锯齿…
31	黄鳢藤	【性状】 …表面黄棕色至棕褐色，光滑，具条形或不规则的斑纹和类圆形凸起的枝痕；质坚硬。叶片多皱缩、破碎，上表面深绿色，下表面灰白色；完整叶片展平后呈卵形、卵状椭圆形或椭圆形，顶端短渐尖，基部圆形或近心形，全缘…	【性状】 …周边黄棕色至棕褐色，光滑，具条形或不规则的斑纹和类圆形凸起的枝痕；质坚硬。叶片多皱缩、破碎，上表面深绿色，下表面灰白色；完整叶片展平后呈卵形、卵状椭圆形或椭圆形，长 4~7cm，宽 2.5~3.5cm，顶端短渐尖，基部圆形或近心形，全缘…
32	分心木	【炮制】 取原药材，除去核壳及杂质。	【炮制】 取原药材，除去核壳及杂质。用时破碎。
33	景天三七	【性状】 …叶片皱缩，展平后呈长披针形至倒披针形，灰绿色或暗棕色，边缘上部有锯齿，下部全缘…	【性状】 …叶片皱缩，展平后呈长披针形至倒披针形，长 3~8cm，宽 1~2cm，灰绿色或暗棕色，边缘上部有锯齿，下部全缘…
34	萝藦	【性状】 …藤茎细长圆柱形，表面黄绿色或淡黄色，有纵向扭曲细棱，节稍膨大，具对生叶痕；质脆，易折断，折断时一侧皮部常粘连呈纤维状，断面淡黄白色，中空，木部有不规则排列小管孔。叶皱缩、破碎，完整叶片展平后呈卵状心形，全缘，先端渐尖或钝尖，基部心形。气微，味淡。	【性状】 …藤茎细长圆柱形，直径 1~5mm，表面黄绿色或淡黄色，有纵向扭曲细棱，节稍膨大，具对生叶痕；质脆，易折断，折断时一侧皮部常粘连呈纤维状，断面淡黄白色，中空，木部有不规则排列小管孔。叶皱缩、破碎，完整叶片展平后呈卵状心形，长 4~11cm，宽 2.5~9cm，全缘，先端渐尖或钝尖，基部心形；叶柄长 1.5~5cm。气微，味淡。
35	牛鞭	【炮制】 取原药材，用 30~50℃水浸泡约 30 分钟，迅速膨胀软化，将其切成 0.5~1.0cm 斜片，干燥。	【炮制】 取原药材，用 30~50℃水浸泡约 30 分钟，迅速膨胀软化，将其切成斜厚片，干燥。
36	鼠曲草	【性状】 …茎灰白色，密被灰白色绵毛，质较柔软。叶皱缩卷曲，叶片展平后呈条状匙形或倒披针形，全缘，两面密被灰白色绵毛…	【性状】 …茎灰白色，密被灰白色绵毛，质较柔软。叶皱缩卷曲，完整者叶片展平后呈条状匙形或倒披针形，长 2~6cm，宽 0.3~1cm，全缘，两面密被灰白色绵毛…
37	猪殃殃	【性状】 …茎方柱形，表面灰绿色或绿褐色，多分枝，在四棱上有倒生小刺…	【性状】 …茎方柱形，直径约 0.1cm，表面灰绿色或绿褐色，多分枝，在四棱上有倒生小刺…

38	竹花	【来源】 本品为肉座菌科真菌竹黄 <i>Shiraia bambusicola</i> P. Henn. 的干燥子实体，寄生于禾本科刺竹属 <i>Bambusa</i> 或刚竹属 <i>Phyllostachys</i> 植物枝梢上的干燥子实体。春末采收，晒干。	【来源】 本品为肉座菌科真菌竹黄 <i>Shiraia bambusicola</i> P. Henn. 寄生于禾本科刺竹属 <i>Bambusa</i> 或刚竹属 <i>Phyllostachys</i> 植物枝梢上的干燥子实体。春末采收，晒干。
39	白石英	【炮制】 取原药材，取除去杂质，洗净，干燥，砸碎。	【炮制】 取原药材，除去杂质，洗净，干燥，砸碎。
40	煅鹅管石	【炮制】 取净鹅管石，照明煅法（《中国药典》2020 年版四部通则 0213）煅至灰白色、逸出臭气，取出，放凉，砸碎。	【炮制】 取净鹅管石，照明煅法（《中国药典》2020 年版四部通则 0213）煅至松脆，取出，放凉，砸碎。
41	狗脊贯众	【性状】 本品为不规则形厚片或碎块。表面黄白色。边缘红棕色至黑褐色，可见短粗的叶柄基和棕红色鳞片。气微，味淡，微涩。	【性状】 本品为不规则形厚片或碎块。切面棕黄色至暗棕色，有黄白色筋脉点。边缘红棕色至黑褐色，可见短粗的叶柄基和棕红色鳞片。气微，味淡，微涩。
42	麸炒巴戟天	【功能与主治】 补肾阳，强筋骨，祛风湿。用于阳痿遗精，宫冷不孕，月经不调，少腹冷痛，风湿痹痛，筋骨痿软。麸炒巴戟天引药入肾，增强其温肾助阳、强筋骨、祛风湿作用。	【功能与主治】 补肾阳，强筋骨，祛风湿。用于阳痿遗精，宫冷不孕，月经不调，少腹冷痛，风湿痹痛，筋骨痿软。麸炒巴戟天、爇巴戟天引药入肾，增强其温肾助阳、强筋骨、祛风湿作用。
	爇巴戟天	【功能与主治】 补肾阳，强筋骨，祛风湿。用于阳痿遗精，宫冷不孕，月经不调，少腹冷痛，风湿痹痛，筋骨痿软。	
43	漂苍术 焦苍术 糠炒苍术	【功能与主治】 燥湿健脾，祛风散寒，明目。用于脘腹胀满，泄泻，水肿，脚气痿痹，风湿痹痛，风寒感冒，夜盲。苍术漂后能缓和其燥性；糠炒和炒焦后可增强健脾的功能。	【功能与主治】 燥湿健脾，祛风散寒，明目。用于脘腹胀满，泄泻，水肿，脚气痿痹，风湿痹痛，风寒感冒，夜盲。苍术漂后能缓和其燥性；糠炒和炒焦后可增强健脾的功能。土炒缓和其燥性，增强健脾止泻功能。
	土炒苍术	【功能与主治】 燥湿健脾，祛风散寒，明目。用于脘腹胀满，泄泻，水肿，脚气痿痹，风湿痹痛，风寒感冒，夜盲。土炒缓和其燥性，增强健脾止泻功能。	
44	硫黄制水银	【性状】 本品为银灰黄色细粉。质重。遇热易挥发。	【性状】 水银 本品为银白色、具金属光泽、极易流动不透明的液体，在平面上易分裂成小球。质重。遇热易挥发。 硫黄制水银 本品为银灰黄色细粉。

45	麸炒北柴胡 麸炒南柴胡 鳖血北柴胡 鳖血南柴胡	【功能与主治】 和解表里，疏肝，升阳。用于感冒发热，寒热往来，胸胁胀痛，月经不调；子宫脱垂，脱肛。加醋麸炒后引药入肝，增强其散郁作用。鳖血制后多用于虚热，胁下痞痛。	【功能与主治】 疏散退热、疏肝解郁，升举阳气。用于感冒发热，寒热往来，胸胁胀痛，月经不调；子宫脱垂，脱肛。加醋麸炒后引药入肝，增强其散郁作用。鳖血制后多用于虚热，胁下痞痛。酒北柴胡增强疏散之功。
	酒北柴胡	【功能与主治】 疏散退热，疏肝解郁，升举阳气。用于感冒发热，寒热往来，胸胁胀痛，月经不调，子宫脱垂，脱肛。酒北柴胡增强疏散之功。	
46	川芎蝴蝶片 酒川芎	【功能与主治】 活血行气，祛风止痛。用于月经不调，经闭痛经，癥瘕腹痛，胸胁刺痛，跌扑肿痛，头痛，风湿痹痛。酒川芎增强活血行气、祛风止痛的功效。	【功能与主治】 活血行气，祛风止痛。用于月经不调，经闭痛经，癥瘕腹痛，胸痹心痛，胸胁刺痛，跌扑肿痛，头痛，风湿痹痛。酒川芎增强活血行气、祛风止痛的功效。蒸川芎增强活血行气，祛风止痛的功效。
	蒸川芎	【功能与主治】 活血行气，祛风止痛。用于胸痹心痛，胸胁刺痛，跌扑肿痛，月经不调，经闭痛经，癥瘕腹痛，头痛，风湿痹痛。蒸川芎增强活血行气，祛风止痛的功效。	
47	党参段 炙党参	【功能与主治】 补中益气，健脾益肺。用于脾肺虚弱，气短心悸，食少便溏，虚喘咳嗽，内热消渴。炙党参增强其补中益气、润肺止咳作用，用于润肺止咳。	【功能与主治】 补中益气，健脾益肺，养血生津。用于脾肺气虚，食少倦怠，咳嗽虚喘，气血不足，面色萎黄，心悸气短，津伤口渴，内热消渴。炙党参增强其补中益气、润肺止咳作用。制党参增强其补中益气作用。
	制党参	【功能与主治】 健脾益肺，养血生津。用于脾肺气虚，食少倦怠，咳嗽虚喘，气血不足，面色萎黄，心悸气短，津伤口渴，内热消渴。制党参增强其补中益气作用。	
48	姜杜仲	【功能与主治】 补肝肾，强筋骨，安胎。用于肾虚腰痛，筋骨无力，妊娠漏血，胎动不安；高血压。姜杜仲能补中强志。	【功能与主治】 补肝肾，强筋骨，安胎。用于肾虚腰痛，筋骨无力，妊娠漏血，胎动不安；高血压。砂炒杜仲增强补肝肾、强筋骨的作用。姜杜仲能补中强志。
	砂炒杜仲	【功能与主治】 补肝肾，强筋骨，安胎。用于肾虚腰痛，筋骨无力，妊娠漏血，胎动不安；高血压。砂炒杜仲增强补肝肾、强筋骨的作用。	

49	建昌茯苓（贺茯苓）	【功能与主治】 利水渗湿，健脾，宁心。用于脾虚泻停，水肿尿少，痰饮眩悸，食少，便溏泄泻，心神不安，惊悸失眠。	【功能与主治】 利水渗湿，健脾，宁心。用于水肿尿少，痰饮眩悸，脾虚食少，便溏泄泻，心神不安，惊悸失眠。茯神增强宁心安神、利水作用。朱茯苓增强宁心安神作用。
	茯神 朱茯苓	【功能与主治】 利水渗湿，健脾宁心。用于脾虚泻停，水肿尿少，痰饮眩悸，脾虚食少，便溏泄泻，心神不安，惊悸失眠。茯神增强宁心安神、利水作用。朱茯苓增强宁心安神作用。	
50	甘草柳叶片 甘草梢 炒甘草	【功能与主治】 补脾益气，清热解毒，祛痰止咳，缓急止痛，调和诸药。用于脾胃虚弱，倦怠乏力，心悸气短，咳嗽痰多，脘腹、四肢挛急疼痛，痈肿疮毒，缓解药物毒性、烈性。炒甘草健脾益气。甘草梢清热解毒，用于尿痛淋浊。	【功能与主治】 补脾益气，清热解毒，祛痰止咳，缓急止痛，调和诸药。用于脾胃虚弱，倦怠乏力，心悸气短，咳嗽痰多，脘腹、四肢挛急疼痛，痈肿疮毒，缓解药物毒性、烈性。炒甘草健脾益气。甘草梢清热解毒，用于尿痛淋浊。蜜炙甘草补脾和胃，益气复脉，用于脾胃虚弱，倦怠乏力，心动悸，脉结代。
	蜜炙甘草	【功能与主治】 补脾和胃，益气复脉。用于脾胃虚弱，倦怠乏力，心动悸，脉结代。	
51	炆黄精	【功能与主治】 补气养阴，健脾，润肺，益肾。用于脾胃气虚，体倦乏力，口干食少；肺虚燥咳；精血不足，内热消渴。炆黄精能使药材味厚气香，增强补脾益肾的功效，并可去其麻舌等副作用。	【功能与主治】 补气养阴，健脾，润肺，益肾。用于脾胃气虚，体倦乏力，口干食少，肺虚燥咳，精血不足，内热消渴。炆黄精能使药材味厚气香，增强补脾益肾的功效，并可去其麻舌等副作用。
	蒸黄精	【功能与主治】 补气养阴，健脾，润肺，益肾。用于脾胃气虚，体倦乏力，口干食少，肺虚燥咳，精血不足，内热消渴。	
52	炒莲子	【功能与主治】 补脾止泻，益肾涩精，养心安神。用于脾虚久泻，遗精带下，心悸失眠。炒莲子增强健脾收涩的作用。	【功能与主治】 补脾止泻，止带，益肾涩精，养心安神。用于脾虚泄泻，带下，遗精，心悸失眠。炒莲子增强健脾收涩的作用。
53	酒洗木香	【功能与主治】 行气止痛，健脾消食。用于胸胁胀痛，泻痢后重，食积不消，不思饮食。	【功能与主治】 行气止痛，健脾消食。用于胸胁、脘腹胀痛，泻痢后重，食积不消，不思饮食。酒制可增强行气止痛之功效。
	酒木香	【功能与主治】 行气止痛，健脾消食。用于胸胁、脘腹胀痛，泻痢后重，食积不消，不思饮食。酒制可增强行气止痛之功效。	

54	制牛膝	【功能与主治】 补肝肾，强筋骨，逐瘀通经，引血下行。用于腰膝酸痛，筋骨无力，经闭癥瘕，肝阳眩晕。	【功能与主治】 补肝肾，强筋骨，利尿通淋，逐瘀通经，引血下行。用于经闭，痛经，腰膝酸痛，筋骨无力，淋证，水肿，头痛，眩晕，牙痛，口疮，吐血，衄血。盐牛膝可增强补肝肾的作用。
	盐牛膝	【功能与主治】 补肝肾，强筋骨，利尿通淋，逐瘀通经，引血下行。用于经闭，痛经，腰膝酸痛，筋骨无力，淋证，水肿，头痛，眩晕，牙痛，口疮，吐血，衄血。盐牛膝可增强补肝肾的作用。	
55	小秦艽段	【功能与主治】 祛风湿，清湿热，止痹痛。用于风湿痹痛，筋脉拘挛，骨节酸痛，日晡潮热，小儿疳积发热。	【功能与主治】 祛风湿，清湿热，止痹痛。用于风湿痹痛，筋脉拘挛，骨节酸痛，日晡潮热，小儿疳积发热。酒秦艽增强祛寒通经活络的作用。
	酒秦艽	【功能与主治】 祛风湿，清湿热，止痹痛，退虚热。用于风湿痹痛，筋脉拘挛，骨节酸痛，日晡潮热，小儿疳积发热。酒炒增强祛寒通经活络的作用。	
56	清炒薏苡仁 炒薏苡仁	【功能与主治】 健脾渗湿，除痹止泻，清热排脓。用于水肿，脚气，小便不利，湿痹拘挛，脾虚泄泻，肺痈，肠痈；扁平疣。	【功能与主治】 健脾渗湿，除痹止泻，清热排脓。用于水肿，脚气，小便不利，湿痹拘挛，脾虚泄泻，肺痈，肠痈；赘疣、癌肿。
	法薏苡仁	【功能与主治】 脾虚泄泻；湿停水肿、脚气，小便不利；热毒湿蕴之肺痈、肠痈、扁平疣。	
57	水半夏	【功能与主治】 燥湿，化痰。用于痰湿所致咳嗽痰多及支气管炎。	【功能与主治】 燥湿，化痰，止咳。用于咳嗽痰多，支气管炎。
58	法水半夏	【功能与主治】 燥湿化痰，止咳。用于咳嗽痰多，支气管炎。	【功能与主治】 燥湿，化痰，止咳。用于咳嗽痰多，支气管炎。
59	姜水半夏	【功能与主治】 燥湿，化痰。用于痰湿所致咳嗽痰多及支气管炎。	【功能与主治】 燥湿，化痰，止咳。用于咳嗽痰多，支气管炎。
60	熊胆粉（冻干）	【功能与主治】 用于惊风抽搐，咽喉肿痛，外治目赤肿痛。	【功能与主治】 清热，平肝，明目。用于惊风抽搐，咽喉肿痛，外治目赤肿痛。
61	寻骨风	无【注意】项。	【注意】 本品含马兜铃酸，可引起肾脏损害等不良反应；儿童及老年人慎用；孕妇、婴幼儿及肾功能不全者禁用。
62	梔子花	无【贮藏】项。	【贮藏】 置通风干燥处。
63	枳椇子	【炮制】 取药材，除去杂质。用时捣碎。 【用法与用量】 4.5～9g。	【炮制】 取药材，除去杂质。 【用法与用量】 4.5～9g。用时捣碎。

64	蒸地黄	【功能与主治】 滋阴补血，益精填髓。用于肝肾阴虚，腰膝酸软，骨蒸潮热，盗汗遗精，内热消渴，血虚萎黄，心悸怔忡，月经不调，崩漏下血，眩晕，耳鸣，须发早白。	【功能与主治】 滋阴补血，益精填髓。用于肝肾阴虚，腰膝酸软，骨蒸潮热，盗汗遗精，内热消渴，血虚萎黄，心悸怔忡，月经不调，崩漏下血，眩晕，耳鸣，须发早白。蒸、炆后减缓其滋腻之性。
	炆地黄	【功能与主治】 补血滋阴，益精填髓。用于血虚萎黄，心悸怔忡，月经不调，崩漏下血，肝肾阴虚，腰膝酸软，骨蒸潮热，盗汗遗精，内热消渴，眩晕，耳鸣，须发早白。	
65	米炒蜈蚣	【功能与主治】 息风镇痉，通络止痛，攻毒散结。用于肝风内动，痉挛抽搐，小儿惊风，中风口喎，半身不遂，破伤风，风湿顽痹，偏正头痛，疮疡，瘰癧，蛇虫咬伤。	【功能与主治】 息风镇痉，攻毒散结，通络止痛。用于肝风内动，小儿惊风，抽搐痉挛，中风口喎，半身不遂，破伤风，风湿顽痹，疮疡，瘰癧，毒蛇咬伤。
	蜈蚣段 制蜈蚣	【功能与主治】 息风镇痉，攻毒散结，通络止痛。用于小儿惊风，抽搐痉挛，中风口喎，半身不遂，破伤风，风湿顽痹，疮疡，瘰癧，毒蛇咬伤。	
66	夏天无（片） 醋夏天无	【功能与主治】 活血通络，行气止痛。用于中风偏瘫，跌扑损伤，风湿性关节炎，坐骨神经痛。	【功能与主治】 活血止痛，舒筋活络，祛风除湿。用于中风偏瘫，头痛，跌扑损伤，风湿痹痛，腰腿疼痛。
67	麸炒泽泻	【功能与主治】 利小便，清湿热，但性平和。用于小便不利，水肿胀满，泄泻尿少，痰饮眩晕，热淋涩痛，高血脂。	【功能与主治】 利小便，清湿热。用于小便不利，水肿胀满，泄泻尿少，痰饮眩晕，热淋涩痛；高脂血症。炒泽泻增强利尿作用。
	炒泽泻	【功能与主治】 利小便，清湿热。用于小便不利，水肿胀满，泄泻尿少，痰饮眩晕，热淋涩痛；高血脂。炒泽泻增强利尿作用。	