

茯苓配方颗粒

Fuling Peifangkeli

【来源】 本品多孔菌科真菌茯苓 *Poria cocos* (Schw.) Wolf 的干燥菌核经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】 取茯苓饮片 20000g, 加水煎煮, 滤过, 滤液浓缩成清膏(干浸膏出膏率为2%~4%), 加入辅料适量, 干燥(或干燥, 粉碎), 再加入辅料适量, 混匀, 制粒, 制成1000g, 即得。

【性状】 本品为灰黄色至黄棕色的颗粒; 气微, 味淡。

【鉴别】 取本品1g, 研细, 加甲醇20ml, 超声处理30分钟, 滤过, 滤液蒸干, 残渣加水20ml超声使溶解, 加乙酸乙酯振摇提取2次, 每次20ml, 合并乙酸乙酯液, 蒸干, 残渣加甲醇1ml使溶解, 作为供试品溶液。另取茯苓酸A对照品, 加甲醇制成每1ml含1mg的溶液, 作为对照品溶液。照薄层色谱法(中国药典2020年版通则0502)试验, 吸取上述两种溶液各5μl, 分别点于同一硅胶G薄层板上, 以三氯甲烷-乙酸乙酯-甲酸(8:1.5:0.2)为展开剂, 展开, 取出, 晾干, 喷以10%硫酸乙醇溶液, 在105℃加热至斑点显色清晰, 置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中, 在与对照品色谱相应的位置上, 显相同颜色的荧光斑点。

【特征图谱】 三萜类 照高效液相色谱法(中国药典2020年版通则0512)测定。
色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂(柱长为150mm, 内径为2.1mm, 粒径为1.8μm); 以甲醇-乙腈(1:4)为流动相A, 以0.1%冰醋酸溶液为流动相B, 按下表中的规定进行梯度洗脱; 流速为每分钟0.4ml, 柱温为30℃; 检测波长为242nm。理论板数按猪苓酸C峰计算应不低于5000。

时间(分钟)	流动相A(%)	流动相B(%)
0~9	63	37
9~16	63→90	37→10
16~20	90→100	10→0


参照物溶液的制备 取茯苓对照药材1g, 加水50ml, 加热回流1小时, 放冷, 滤过, 滤液蒸干, 残渣加甲醇25ml, 超声处理(功率250W, 频率40kHz)30分钟, 放冷, 滤过, 滤液蒸干, 残渣加甲醇溶解并定容至2ml, 摆匀, 滤过, 取续滤液, 作为对照药材参照物溶液。另取茯苓酸B对照品、茯苓酸A对照品、猪苓酸C对照品、去氢依布里酸对照品适量,

精密称定，加甲醇制成每 1ml 各含 10 μg 的溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备 取本品适量，研细，取约 0.5g，置具塞锥形瓶中，加甲醇 25ml，超声处理（功率 250W，频率 40kHz）30 分钟，放冷，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇溶解并定容至 2ml，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取参照物溶液与供试品溶液各 2 μl ，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现 8 个特征峰，并应与对照药材参照物色谱中的 8 个特征峰的保留时间相对应，其中峰 1、峰 3~4 应分别与相应的对照品参照物峰的保留时间相对应。与猪苓酸 C 对照品参照物峰相对应的峰为 S 峰，计算峰 2、峰 5~8 与 S 峰的相对保留时间，其相对保留时间应在规定值的±10% 范围之内，规定值为：0.65（峰 2）、1.09（峰 5）、1.12（峰 6）、1.36（峰 7）、1.52（峰 8）。与去氢依布里酸对照品参照物峰的保留时间相对应的位置上，出现的色谱峰与 S 峰的相对峰面积不得大于 0.18。



峰 1：茯苓酸 B；峰 2：去氢土莫酸；峰 3：茯苓酸 A；峰 4 (S)：猪苓酸 C；

峰 6：3-表去氢土莫酸；峰 7：去氢茯苓酸；峰 8：松苓新酸

色谱柱：ZORBAX SB C18；2.1mm×150mm，1.8 μm

核苷类 照高效液相色谱法（中国药典 2020 年版通则 0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 同〔含量测定〕腺苷项。


参照物溶液的制备 取茯苓对照药材 2g，加 10% 甲醇 25ml 涡旋 1 分钟，再加 10% 甲醇 25ml，加热回流 3 小时，放冷，滤过，滤液蒸干，残渣用 10% 甲醇溶解并定容至 2ml，摇匀，滤过，取续滤液，作为对照药材参照物溶液。另取尿苷对照品、腺苷对照品适量，精密称定，

加 10% 甲醇制成每 1ml 各含 5 μ g 的混合溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备 同（含量测定）腺苷项。

测定法 分别精密吸取参照物溶液与供试品溶液各 10 μ l，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现 7 个特征峰，并应与对照药材参照物色谱中的 7 个特征峰的保留时间相对应，其中峰 3、峰 7 应分别与相应的对照品参照物峰的保留时间相对应。与尿苷对照品参照物峰相对应的峰为 S 峰，计算峰 1~2、峰 4~6 与 S 峰的相对保留时间，其相对保留时间均应在规定值的±10% 范围之内，规定值为：0.31（峰 1）、0.63（峰 2）、1.20（峰 4）、1.50（峰 5）、1.81（峰 6）。



【检查】 应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典 2020 年版通则 0104）。

【浸出物】 取本品研细，取约 2g，精密称定，精密加入乙醇 100ml，照醇溶性浸出物测定法（中国药典 2020 年版通则 2201）项下的热浸法测定，不得少于 24.0%。

【含量测定】 茜草酸 B、茜草酸 A 照高效液相色谱法（中国药典 2020 年版通则 0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为 150mm，内径为 2.1mm，粒径为 2.2 μ m）；以甲醇-乙腈（4:1）为流动相 A，以 0.1% 甲酸为流动相 B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟 0.30ml，柱温为 30℃；检测波长为 242nm。

理论板数按茯苓酸 B 峰计算应不低于 5000。

时间 (分钟)	流动相 A (%)	流动相 B (%)
0~15	73→75	27→25
15~20	75→83	25→17
20~23	83→99	17→1
23~26	99	1

对照品溶液的制备 取茯苓酸 B 对照品、茯苓酸 A 对照品适量，精密称定，加甲醇制成每 1ml 各含 10μg 的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品适量，研细，取约 0.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入 70%乙醇 25ml，称定重量，超声处理（功率 250W，频率 40kHz）30 分钟，放冷，再称定重量，用 70%乙醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各 2μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每 1g 含茯苓酸 B ($C_{30}H_{44}O_5$) 应为 0.20mg~0.80mg，茯苓酸 A ($C_{31}H_{46}O_5$) 应为 0.15mg~0.75mg。

腺苷 照高效液相色谱法（中国药典 2020 年版通则 0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为 250mm，内径为 4.6mm，粒径为 5μm）；以甲醇为流动相 A，以 3mmol/L 磷酸二氢钾溶液为流动相 B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟 1.2ml，柱温为 25℃；检测波长为 260nm。理论板数按腺苷峰计算应不低于 5000。

时间 (分钟)	流动相 A (%)	流动相 B (%)
0~10	0	100
10~15	0→4	100→96
15~28	4→6	96→94
28~40	6→30	94→70
40~43	30→50	70→50

对照品溶液的制备 取腺苷对照品适量，精密称定，加 10%甲醇制成每 1ml 含 10μg 的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品适量，研细，取约 0.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入 10%甲醇 25ml，称定重量，超声处理（功率 300W，频率 40kHz）30 分钟，放冷，再称定重量，用 10%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各 10μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每 1g 含腺苷 (C₁₀H₁₃N₅O₄) 应为 0.17mg~0.60mg。

【规格】 每 1g 配方颗粒相当于饮片 20g

【贮藏】 密封。

以示標