附件：明胶药用辅料标准草案公示稿（第二次）

明 胶

Mingjiao

Gelatin

本品为动物结缔组织中胶原蛋白经酸、碱、酶、热等一种或几种方法适度水解并纯化后得到的蛋白质。本品分为凝冻型和非凝冻型。

【性状】凝冻型明胶为浅黄色至黄棕色、透明或半透明微带光泽的薄片、颗粒或粉末。

非凝冻型明胶为白色至浅黄色的粉末。

【鉴别】(1)取本品 0.5g，置于玻璃试管中，加水 10ml，放置 10 分钟，60℃水浴 15 分钟，使之完全溶解后，在 2~8℃放置 6 小时。非凝冻型明胶：倾斜试管其内容物应立即流出；凝冻型明胶：倾斜试管其内容物则不能流出。

(2)取本品 20mg，加水 2ml，在 55℃水浴中使溶解，加 12.5%硫酸铜溶液 0.05ml，混匀，再加 2mol/L 氢氧化钠溶液 0.5ml，溶液即显蓝紫色。

(3)取本品 40mg，置顶空瓶中，加 3mol/L 硫酸溶液 2.5ml，压盖，于 150℃放置 1 小时，放冷，加 3mol/L 氢氧化钠溶液 5ml，混匀，加入 1.41%氯胺 T 溶液（临用新配）2ml，混匀，室温静置 20 分钟，加入显色剂（取对二甲氨基苯甲醛 10.0g，加 60%高氯酸 35ml，缓缓加入异丙醇 65ml，混匀，临用新配）2ml，混匀，放置 60℃水浴 15 分钟，溶液应显红色至紫红色。

【检查】凝冻强度（仅限凝冻型明胶） 照凝胶强度测定法（通则 0634 第一法）试验。取本品两份各 7.50g，分别置样品瓶 A 中，加水 105g，用橡胶塞密封，在室温下放置 1~4 小时，使供试品充分吸水膨胀，在 65℃±2℃的水浴中搅拌加热 15 分钟使溶散均匀，取样品瓶置磁力搅拌器上，打开瓶塞，加磁力搅拌子，再盖上橡胶塞，磁力搅拌 5 分钟，使溶液分散均匀，并使凝结在样品瓶内壁的水混合到溶液中，制成 6.67%的供试胶液。在室温条件下放置，使瓶内的胶液温度降至约 30℃后；再将样品瓶放入已调节水平的恒温水浴箱中，在 10℃±0.1℃中保温 16~18 小时后，迅速取出样品瓶，擦干外壁水珠，打开样品瓶的橡胶塞，采用直径为 12.7mm 的探头，以每秒 0.5mm 的下行速度，读取探头下压至凝胶表面下凹 4mm 所产生的读数即得。凝冻强度应在标示值的±20%以内，两份供试品测量值的绝对差值不得过 10Bloom g。

酸碱度 取本品 1.0g，加水 99.0g，加盖，放置 1~4 小时后，在 65℃±2℃的水浴中加热 15 分钟，充分搅拌使供试品溶散均匀，放冷至 35℃，依法测定（通则 0631），pH 值应为 3.8~7.6。

透光率 取本品 7.5g，加水 105g，加盖，放置 1~4 小时，在 65℃±2℃的水浴中加热 15 分钟，充分搅拌使供试品溶散均匀，制成 6.67%的溶液，冷却至 45℃，照紫外-可见分光光度法（通则 0401），分别在 450nm 和 620nm 的波长处测定透光率，不得低于 50%(450nm)和 70%(620nm)。

电导率 取本品 1.0g，加水 99.0g，加盖，放置 1~4 小时后，在 65℃±2℃的水浴中加热 15 分钟，充分搅拌使供试品溶散均匀，制成 1.0%的溶液，作为供试品溶液。

另取水 100ml 作为空白溶液。

将供试品溶液与空白溶液置 $30^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ 的水浴中保温 1 小时后，依法测定（通则 0681），先用空白溶液冲洗电极 3 次后，测定空白溶液的电导率，其电导率值应不得过 $5.0\mu\text{S}/\text{cm}$ 。取出电极，再用供试品溶液冲洗电极 3 次后，测定供试品溶液的电导率，不得过 $1\text{mS}/\text{cm}$ 。

亚硫酸盐 在烧瓶（A）中加入 150 ml 水，并在整个系统中通入二氧化碳气体（纯度不低于 99%），持续 15min，流速为 $100\text{ml}/\text{min}$ 。在 3%过氧化氢溶液 10 ml 中加入 1g/l 溴酚蓝-乙醇溶液 0.15ml，用 $0.01\text{mol}/\text{l}$ 氢氧化钠标准滴定溶液滴定直至出现蓝紫色，不能滴过，并将此溶液加入到试管中（D）。在不影响二氧化碳气流的情况下取下分液漏斗（B），往烧瓶中加入本品 25.0g 和水 100ml。关闭分液漏斗阀，向漏斗中倒入 80ml 的 $2\text{mol}/\text{l}$ 稀盐酸，打开分液漏斗阀，让盐酸溶液流入烧瓶中。在最后几毫升盐酸溶液完全流入烧瓶之前，关闭漏斗阀，确保没有二氧化硫逸出。煮沸 1h。打开分液漏斗活塞，停止通入二氧化碳气体，并停止加热和冷凝水。在试管中加入少量水，并将试管内溶液移至 200ml 的广口锥形烧瓶中，然后将其在 $60^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$ 水浴中加热 15min，冷却。加入溴酚蓝-乙醇溶液 0.1ml，然后用氢氧化钠标准溶液滴定，直至颜色由黄色变为蓝紫色（消耗体积为 V_1 ）。进行一次空白滴定（消耗体积为 V_0 ）。亚硫酸盐测定装置见下图。

按下式计算试样中亚硫酸盐的含量：

$$w = 64.060 \times 10^{-3} \times 0.5 \times (V_1 - V_0) \times \frac{c}{m} \times 100\%$$

式中 w 为亚硫酸盐的含量的质量分数，%

V_1 为消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积，ml；

V_0 为空白消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积, ml;

c 为氢氧化钠标准滴定溶液的实际浓度, mol/l;

m 为试样的质量, g;

64.060 为二氧化硫 (SO_2) 的摩尔质量的数值, g/mol;

10^{-3} 为换算系数;

0.5 为换算系数。

计算结果取整数。取平行测定结果的算术平均值为测定结果。含亚硫酸盐不得超过 0.005%。

过氧化物 取本品 10g, 置 250ml 具塞烧瓶中, 加水 140ml, 放置 2 小时, 在 50℃ 的水浴中加热迅速溶解, 立即冷却, 加硫酸溶液 (1→5) 6ml, 碘化钾 0.2g, 1% 淀粉溶液 2ml 与 0.5% 钼酸铵溶液 1ml, 密塞, 摇匀, 置暗处放置 10 分钟, 溶液不得显蓝色。另取水 140ml, 同法操作, 溶液不得显蓝色。

干燥失重 取本品, 在 105℃ 干燥 15 小时, 减失重量不得过 15.0% (通则 0831)。

炽灼残渣 本品 1.0g, 依法检查 (通则 0841), 遗留残渣不得过 2.0%。

铬 取本品 0.5g, 精密称定, 置聚四氟乙烯消解罐内, 加硝酸 5~10ml, 混匀, 100℃ 预消解 2 小时后, 盖好内盖, 旋紧外套, 置适宜的微波消解炉内, 进行消解。消解完全后, 取消解内罐置电热板上缓缓加热至红棕色蒸气挥尽并近干, 用硝酸溶液 (3→100) 转入 50ml 聚四氟乙烯量瓶中, 并稀释至刻度, 摇匀, 作为供试品溶液。

同法制备空白溶液。

另取铬单元素标准溶液, 用硝酸溶液 (3→100) 稀释制成每 1ml 中含铬 1.0 μg 的铬标准贮备液, 临用时, 分别精密量取适量, 用硝酸溶液 (3→100) 制成每 1ml 含铬 0~80ng 的对照品溶液。

取供试品溶液与对照品溶液, 以石墨炉为原子化器, 照原子吸收分光光度法 (通则 0406 第一法), 在 357.9nm 的波长处测定, 计算。含铬不得过百万分之二。

铁 供试品溶液取“铬”项下; 精密量取铁单元素标准溶液适量, 分别用硝酸溶液 (3→100) 定量稀释制成每 1ml 中含 Fe 元素 0.5 μg 、1 μg 、1.5 μg 、2 μg 、3 μg 的系列对照品溶液。照原子吸收分光光度法 (通则 0406 第一法), 在 248.3nm 的波长处分别测定, 计算。含铁不得过 0.003%。

锌 供试品溶液取“铬”项下; 精密量取锌单元素标准溶液适量, 分别用硝酸溶液 (3→100) 定量稀释制成每 1ml 中含 Zn 元素 0.5 μg 、1 μg 、1.5 μg 、2 μg 、3 μg 的系列对照品溶液。照原子吸收分光光度法 (通则 0406 第一法), 在 213.9nm 的波长处分别测定, 计算。含锌不得过 0.003%。

微生物限度 取本品 10g, 加入 pH7.0 无菌氯化钠-蛋白胨缓冲液至 100ml, 在 2~8℃ 溶胀 1~2 小时, 然后在 42℃ $\pm$ 2℃ 水浴溶解 15 分钟, 混匀制成 1: 10 供试液, 依法进行需氧菌总数、霉菌和酵母菌总数、大肠埃希菌检查 (通则 1105 和通则 1106)。

取本品 10g, 加入胰酪大豆胨液体培养基至 100ml, 在 2~8℃ 溶胀约 1~2 小时, 然后在 42℃ $\pm$ 2℃ 水浴溶解 15 分钟, 混匀, 依法进行沙门菌检查 (通则 1106)。

每 1g 供试品中需氧菌总数不得过 10^3cfu ，霉菌和酵母菌总数不得过 10^2cfu ，不得检出大肠埃希菌；每 10g 供试品中不得检出沙门菌。

细菌内毒素（供注射用） 取本品 0.15g，先加内毒素检查用水 3ml，封口，室温放置 30 分钟后，置于 $80^\circ\text{C}\pm 2^\circ\text{C}$ 水浴中约 10 分钟，然后旋涡混合器中旋混 3 分钟，充分溶解后用内毒素检查用水稀释至所需浓度，依法检查（通则 1143），每 1g 样品中含内毒素的量应小于标示值。

【类别】 助悬剂、成膜剂、黏合剂等。

【贮藏】 密封，在干燥处保存。

【标示】 ①应标明使用的抑菌剂名称或灭菌方式。②应标明凝冻型明胶或非凝冻型明胶；凝冻型明胶还应标明本品的凝冻强度，非凝冻型明胶应标明本品的分子量。③应标明运动黏度（按所附测定方法之一测定）。④供注射用明胶应标明本品每 g 中含内毒素的量应小于的标示值。

黏度测定法 1 取本品 4.50~9.00g，置已称定重量的烧杯中，加温水 20~40ml，置 60°C 水浴中搅拌使溶化；取出烧杯，擦干外壁，加水使胶液总重量达到下列计算式的重量（含干燥品 15%），在 $40^\circ\text{C}\pm 0.1^\circ\text{C}$ 时，照黏度测定法（通则 0633 第一法，毛细管内径为 2.0mm）测定。每次测定值与平均值的差值不得超过平均值的 $\pm 1.0\%$ 。

$$\text{胶液总重量 (g)} = \frac{(1 - \text{干燥失重}) \times \text{称样量 (g)} \times 100}{15.0}$$

黏度测定法 2 取本品 7.5g，置锥型瓶中，加水 105g，加盖，室温放置 1~4 小时，在 $65^\circ\text{C}\pm 2^\circ\text{C}$ 的水浴中加热 15 分钟，充分搅拌使供试品溶散均匀制成 6.67% 的胶液，冷却至 61°C ；开启恒温器，使流过黏度计夹套中水的温度为 $60^\circ\text{C}\pm 0.1^\circ\text{C}$ ，用手指顶住黏度计毛细管末端，同时避免空气和泡沫进入，迅速将胶液倒入黏度计里，直到超过上刻度线 2~3cm。将温度计插入黏度计内，当温度稳定在 $60^\circ\text{C}\pm 0.1^\circ\text{C}$ 时，将手指移开毛细管末端，用秒表准确记录液面自上刻度线下降至下刻度线的流出时间，精确到 0.1 秒。黏度计毛细管尺寸见下图（单位为 mm）。

按下式计算黏度：

$$\eta=1.005At - \frac{1.005B}{t}$$

式中 η 为供试品的勃氏黏度, mPa·s;

1.005 为 6.67%明胶溶液在 60℃时的密度, g/ml;

t 为流过时间, s;

A , B 为黏度计常数, 通过校正测定。

计算结果精确到小数点后一位。重复测定两次结果的绝对差值不得过 0.1mPa·s。

注: 非凝冻型明胶在冷水或热水中溶解。

凝冻型明胶在水中久浸即吸水膨胀并软化, 重量可增加 5~10 倍; 在热水中易溶, 在稀醋酸中溶解, 在热 50%甘油中溶解, 在热的 90%甘油中略溶, 在乙醇或乙醚中不溶。

起草单位: 北京化工大学

联系电话: 010-64438266

复核单位: 广东省药品检验所

积极参与单位: 罗赛洛(温州)明胶有限公司、福建省福宁浦生物科技有限公司、嘉利达(平
阳)明胶有限公司、罗赛洛(广东)明胶有限公司、包头东宝生物技术股份有限公司、四川瑞宝生
物科技股份有限公司、普邦明胶(黑龙江)有限公司

明胶药用辅料标准草案起草说明

一、来源与制法

参考美国、日本和欧洲药典, 和实际样品拟定。

二、性状

参考欧洲药典, 和实际样品拟定。

三、鉴别(1)、鉴别(2)

参考美国、日本和欧洲药典, 和实际样品拟定。

四、鉴别(3)

参考日本药典、美国药典、欧洲药典, 和实际样品拟定。经验证该方法可以同时应用于凝
冻型明胶和非凝冻型明胶的鉴别。

五、凝胶强度(仅限凝冻型明胶)

参考中国药典四部胶囊用明胶、美国、日本和欧洲药典拟定。

六、酸碱度

参考美国、日本和欧洲药典拟定。

七、透光率

参考中国药典四部胶囊用明胶的透光率检查法。明胶的透光率与杂质有关, 透光率除了在
胶囊壳中有应用, 还在赋形剂等方面也有要求, 故拟定该项目的检查。

八、电导率、亚硫酸盐

参考美国、日本和欧洲药典拟定。

九、过氧化物、干燥失重、炽灼残渣、铬

参考中国药典四部胶囊用明胶拟定。

十、铁、锌

参考美国、日本和欧洲药典拟定。

十一、微生物限度

参考中国药典四部胶囊用明胶、美国、日本和欧洲药典拟定。

十二、细菌内毒素（供注射用）

根据药典委药用辅料细菌内毒素及热原检查法设定思路进行拟定。

十三、类别、贮藏、标示

标示参考美国药典和中国药典四部胶囊用明胶，且与草案中细菌内毒素项目相对应，贮藏参考中国药典四部胶囊用明胶和日本药典，类别参考美国药典并根据所收集样品实际情况拟定。

十四、黏度测定法

参考中国药典四部胶囊用明胶拟定。其中黏度测试法 1 优化了前处理步骤，调整了称样量的范围，对应的公式中还结合干燥失重的数据作为系数使结果更加准确。

十五、注

参考美国和日本药典和所收集样品的实际测定结果拟定。