

编号：浙 PF20240015

醋乳香（埃塞俄比亚乳香）配方颗粒

Curuxiang(Aisai'ebiyaruxiang) Peifangkeli

【来源】 本品为橄榄科植物乳香树*Boswellia carterii* Birdw.及同属植物*Boswellia bhaw-dajiana* Birdw.树皮渗出的树脂（埃塞俄比亚乳香）经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】 取醋乳香（埃塞俄比亚乳香）饮片1300g，加水煎煮，收集挥发油适量（以 β -环糊精包合，备用），滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为41%~65%），加入挥发油包合物，加辅料适量，干燥（或干燥，粉碎），再加入辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，即得。

【性状】 本品为浅灰黄色至灰褐色的颗粒；具特异香气，味微苦。

【鉴别】 取本品0.5g，研细，加乙醇20ml，超声处理20分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加乙醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取乳香（埃塞俄比亚乳香）对照药材0.5g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版通则0502）试验，吸取上述两种溶液各2~5 μ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以石油醚（60~90 $^{\circ}$ C）-乙酸乙酯（17：2）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以5%香草醛硫酸溶液，在105 $^{\circ}$ C加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【特征图谱】 照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈为流动相A，以0.05%磷酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；柱温为30 $^{\circ}$ C；检

测波长0~18分钟为210nm, 18~28分钟为250nm, 28分钟以后为210nm。理论板数按11-羰基-β-乙酰乳香酸峰计算应不低于3000。


时间 (分钟)	流动相A (%)	流动相B (%)
0~18	75→80	25→20
18~28	80→82	20→18
28~35	82→98	18→2
35~50	98	2

参照物溶液的制备 取乳香(埃塞俄比亚乳香)对照药材0.2g, 加甲醇50ml, 超声处理(功率250W, 频率40kHz) 30分钟, 放冷, 滤过, 取续滤液, 作为对照药材参照物溶液。另取11-羰基-β-乙酰乳香酸对照品、α-乳香酸对照品适量, 精密称定, 加甲醇制成每1ml含11-羰基-β-乙酰乳香酸0.12mg、α-乳香酸20μg的混合溶液, 作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备 同[含量测定]项。

测定法 分别精密吸取参照物溶液与供试品溶液各10μl, 注入液相色谱仪, 测定, 即得。

供试品色谱中应呈现5个特征峰, 并应与对照药材参照物色谱中的5个特征峰保留时间相对应, 其中2个峰应分别与相应对照品参照物峰相对应。与11-羰基-β-乙酰乳香酸参照物峰相对应的峰为S1峰, 计算峰1与S1峰的相对保留时间, 与α-乳香酸参照物峰相对应的峰为S2峰, 计算峰3、峰5与S2峰的相对保留时间, 其相对保留时间应在规定值的±10%范围之内。规定值为: 0.64(峰1)、0.96(峰3)、1.25(峰5)。



对照特征图谱

峰2 (S1): 11-羰基-β-乙酰乳香酸; 峰4 (S2): α-乳香酸

参考色谱柱: Xbridge C18 (4.6mm × 250mm, 5μm)

【检查】 应符合颗粒剂项下有关的各项规定 (中国药典2020年版通则0104)。

【浸出物】 取本品适量, 研细, 取约2g, 精密称定, 精密加入乙醇100ml, 照醇溶性浸出物测定法(中国药典2020年版通则2201)项下的热浸法测定, 不得少于20.0%。

【含量测定】 挥发油 照挥发油测定法 (中国药典2020年版通则2204) 测定。

本品含挥发油应为0.40%~3.40% (ml/g)。

11-羰基-β-乙酰乳香酸 照高效液相色谱法 (中国药典2020年版通则0512) 测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂; 以甲醇-0.05%磷酸溶液 (83: 17) 为流动相; 检测波长为250nm。理论板数按11-羰基-β-乙酰乳香酸峰计算应不低于3000。

对照品溶液的制备 取11-羰基-β-乙酰乳香酸对照品适量, 精密称定, 加甲醇制成每1ml含80μg的溶液, 即得。

供试品溶液的制备 取本品适量，研细，取约0.2g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入甲醇50ml，称定重量，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10 μ l，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g含11-羧基- β -乙酰乳香酸（ $C_{32}H_{48}O_5$ ）应为13.0mg~40.0mg。

【规格】 每1g配方颗粒相当于饮片1.3g

【贮藏】 密封。